VON SPITZBERGEN ZUR SAHARA: STATIONEN EINES NATURFORSCHERS IN...

Charles Martins

Digitized by Google

Digitized by Google

Von Spitzbergen zur Sahara.

Stationen eines Naturforschers

in

Spitzbergen, Lappland, Schottland, der Schweiz, Frankreich, Italien, dem Orient, Aegypten und Algerien.

Von

Charles Martins,

Professor der Naturgeschichte an der medizinischen Fakultät zu Montpellier, Direktor des Botanischen Gartens daselbst, korrespondirendem Mitgliede des Instituts von Frankreich und der Geologischen Gesellschaft zu London.

Autorisirte und unter Mitwirkung des Verfassers übertragene Ausgabe für Deutschland.

Mit Vorwort

von

Carl Vogt.

Aus dem Französischen von A. Bartels.

Erster Band.

Jena,

Hermann Costenoble.

1868.

Digitized by Google

BAYERISCHE
STAATS-
BIBLIOTHEK
MUENCHEN

Digitized by Google

Dem Andenken

meines Freundes

Auguste Bravais,

Schiffslieutenant,

Professor der Physik an der polytechnischen Schule, Mitglied des Instituts von Frankreich und der Akademie der Wissenschaften zu München,

gewidmet.

Digitized by Google

Vorrede.

„Ich habe jetzt das Werk vor mir," sagte ich vor einem Jahre in der Kölnischen Zeitung bei Besprechung der französischen Ausgabe dieses Buches, „und kann mich nicht enthalten es dem deutschen Publikum auf das wärmste zu empfehlen. Nur dem unseligen Kriege kann ich es wohl zuschreiben, wenn das vortreffliche Buch noch nicht in unsere Sprache übertragen ist. Es wird so viel Schund aus allen Sprachen der Welt übersetzt, während die trefflichsten Werke oft umsonst des Finders harren. So sehr Martins auch Franzose ist in Gesinnung und Richtung, so sehr ist er auf der andern Seite mit deutschem Geiste genährt und durch seine unter den Gelehrten seines Landes seltene Kenntniß der Kultursprachen befähigt, auch den Arbeiten und Richtungen der übrigen Länder Rechnung zu tragen. Martins war vielleicht der Erste, welcher die Franzosen mit den naturwissenschaftlichen Arbeiten Goethe's bekannt machte und sie den Dichter von dieser Seite kennen lehrte; er ist keiner jener Monographisten, welche durch Zählen von Federn und Abklatschen von Zähnen die Wissenschaft erschöpft zu haben glauben — seine Forschungen, Reisen und Abenteuer erstrecken sich über einen Raum, den nur wenige Forscher durchmessen zu

Digitized by Google

haben ſich rühmen können, über 50 Breitegrade, von den aus dem Eismeere hervorragenden Felſenkämmen Spitzbergens bis zu den glühenden Sandebenen der Sahara, und der Styl, in welchem dieſe Gegenden nicht nur beſchrieben, ſondern alle zur phyſiſchen Geographie gehörenden Fragen erörtert und die höchſten Probleme der Wiſſenſchaft beſprochen werden, iſt eben ſo klar und verſtändlich wie angenehm und unterhaltend."

Heute bin ich ſtolz darauf, daß dieſe meine Worte den Verleger Herrn Coſtenoble beſtimmten, das Martins'ſche Werk in einer Ueberſetzung dem größern deutſchen Publikum zugänglich zu machen, und ich darf zuverſichtlich hoffen, daß es diejenige Aufnahme finden werde, die es verdient. Wenn Martins die Botanik zwar als Hauptfach gewählt hat und ſeinem botaniſchen Garten in Montpellier ſo trefflich vorſteht als irgend einer ſeiner berühmten Vorgänger, ſo hat er doch den unſchätzbaren Vortheil vor vielen Andern, daß ihm andere Seiten der Wiſſenſchaft nicht minder zugänglich ſind. Sein Freund Bravais, mit dem er die meiſten ſeiner frühern Fahrten ausführte, war nach dem Zeugniſſe Aller, die ihn zu beurtheilen verſtanden, ein wahres Genie in dem Gebiete der mathematiſchen Phyſik, die er in Paris an der polytechniſchen Schule ſo lange mit Auszeichnung lehrte, bis ſein eminenter Geiſt unter der Laſt der Anſtrengung, die er ihm auferlegte, zuſammenbrach. Bei dieſem gleichalterigen, mit den übrigen Naturwiſſenſchaften ebenfalls vertrauten Freunde befand ſich Martins in einer trefflichen Schule, um die Anwendung der ſtrengen phyſikaliſchen Methoden auf allgemeinere Fragen der Botanik, Geologie und Zoologie in ihrem wahren Werthe würdigen zu lernen und ſich an den Gebrauch dieſer Methoden zu gewöhnen, die ſo häufig die Geduld der in Unterſuchungen anderer Art aufgewachſenen Naturforſcher herausfordern. Es iſt in der That damit eine eigene Sache! Wenn wir andern Naturforſcher, Zoologen,

Digitized by Google

Botaniker, Geologen uns mit irgend einer Forſchung beſchäftigen, ſo ſtehen wir beſtändig greifbaren Reſultaten gegenüber, deren Summe freilich vermehrt und deren Einzelheiten mit einander verglichen werden müſſen, um zu einem endlichen Schluſſe zu gelangen, die aber dennoch in ihrer Vereinzelung ſchon einen gewiſſen Einblick geſtatten und meiſt auch dann als Bauſteine benutzt werden können, wenn die Reihe der Unterſuchungen durch irgend einen Zufall unterbrochen wird. Anders in jenen Gebieten, welche ſich mit der Phyſik der Erde im Ganzen, mit der Meteorologie, der Vertheilung der Temperaturen und Klimate, dem Erdmagnetismus u. ſ. w. beſchäftigen. Hier ſagt uns die vereinzelte Beobachtung meiſt gar nichts, ſie gewinnt ihren Werth nur als Glied einer langen Reihe von Beobachtungen, die mit äußerſter Sorgfalt und Pünktlichkeit durchgeführt werden müſſen, und die ſo innig mit einander zuſammenhängen, daß eine augenblickliche Vernachläſſigung oder eine unentdeckt gebliebene Fehlerquelle den unwiederbringlichen Verluſt der mühevollen Arbeit von Jahren nach ſich ziehen kann. Es gehört eine eigene Selbſtüberwindung dazu, vor ſolchen Unterſuchungen nicht zurückzuſchrecken, und eine große Selbſtverleugnung, ſie durchzuführen — und wahrlich nur Wenige machen ſich einen Begriff von der Zeit und der Arbeit, geiſtiger wie körperlicher, die aufgewendet werden, und von der Sklaverei, der man ſich freiwillig unterwerfen muß, um zu einem ſo winzigen Reſultate, wie z. B. der Beſtimmung des mittlern Barometerſtandes oder der mittlern Jahrestemperatur eines Ortes zu gelangen. Ich habe oft, es ſei hiermit offen geſtanden, entweder gelächelt oder ſelbſt mich empört, wenn ich hörte, daß gewiſſe Klaſſen ſich vorzugsweiſe Arbeiter nannten und ſich einreden ließen, es ſtänden ihnen als privilegirte Faulenzer andere Glieder der Geſellſchaft gegenüber, deren Arbeit am Schreibtiſche, im Laboratorium und in der freien Natur ganz gewiß,

Digitized by Google

ſelbſt dann, wenn man ſie nur nach der Quantität der täglich aufgewendeten Stunden berechnen wollte, dennoch weit ſchwerer wiegt als diejenige, welche der gewöhnliche Arbeiter liefert.

Doch ich wende mich von dieſem Gegenſtande zu dem vorliegenden Buche zurück. Es ſoll, ſo tief auch der Verfaſſer in die verſchiedenen Zweige der Wiſſenſchaft eingedrungen ſein mag, dennoch ein populäres ſein, d. h. wiſſenſchaftliche Befunde, namentlich auf Reiſen in verſchiedenen Weltgegenden geſammelt, in allgemein verſtändlicher Weiſe vortragen. Richtig aufgefaßt, iſt dies Ziel gewiß das edelſte, welches ſich ein Schriftſteller ſtecken kann, und mögen es auch einzelne in Formeln Befangene einen Dilettantismus nennen, ſo iſt derſelbe doch gerechtfertigt, wenn er darauf hinausgeht, Irrthümer zu zerſtören, Kenntniſſe zu verbreiten und dadurch zu dem allgemeinen Fortſchritte beizutragen. Es giebt hierzu nur zwei Wege: das lebendige Wort, welches nur einem kleinern Kreiſe zugänglich iſt, aber dafür deſto lebhafter zündet und anregt, und die Preſſe, die weiter, aber auch langſamer und dauernder wirkt.

Sowie aber auch hier ein Unterſchied ſich kundgiebt, indem Jeder, der hören kann, auch verſteht, während demjenigen, welcher nicht leſen gelernt hat, das gedruckte Buch mit ſieben Siegeln verſchloſſen bleibt, ſo giebt es auch Unterſchiede in der ſogenannten allgemeinen Verſtändlichkeit eines Buches. Jeder Verfaſſer ſetzt einen gewiſſen Bildungsſtand, eine gewiſſe Summe von Kenntniſſen voraus, welche zum Verſtändniß ſeiner Arbeit nothwendig mitgebracht werden müſſen. So iſt es auch hier. Wer das Martins'ſche Buch leſen und verſtehen will, der muß wenigſtens wiſſen, was ein Thermometer oder ein Barometer, was eine Bouſſole oder ein Mikroſkop ſind; er muß einen allgemeinen Begriff von den Methoden haben, welche angewendet werden, um in den exakten Naturwiſſenſchaften zu Reſultaten, Thatſachen und Schlußfolgerungen zu gelangen. Dieſe

Digitized by Google

allgemeine Grundlage aber bringt Jeder mit ſich, der auch nur durch eine Sekundarſchule durchgegangen iſt, und wer ſie beſitzt, der möge mit Vertrauen an die Leſung dieſes Werkes gehen, das in anmuthiger Form und tadelloſer Darſtellung ſeine Kenntniſſe bereichern, ſeine Anſchauungen erweitern und vielleicht ſelbſt ihn zu Gebieten führen wird, die ihm bisher unbekannt blieben.

Genf, den 25. September 1867.

C. Vogt.

Digitized by Google

Digitized by Google

BAYERISCHE
STAATS-
BIBLIOTHEK
MUENCHEN

Vorwort des Verfaſſers.

Die Wiſſenſchaft war anfangs in Tempeln vermauert, dann in Klöſtern vergraben, endlich in Akademien verzäunt; es iſt Zeit, daß ſie ſich nach außen verbreite und alle Glieder des geſellſchaftlichen Körpers durchdringe, es iſt Zeit, daß die poſitiven Reſultate und errungenen Thatſachen zur Kenntniß derer gelangen, die ſie intereſſiren, kurz es iſt Zeit, daß die Wiſſenſchaft ins Volk dringe. Sicherlich können gewiſſe Wahrheiten nie volksthümlich werden, das Verſtändniß derſelben erfordert durchaus die vorgängigen Studien und lange Vertrautheit des Gelehrten von Fach, doch giebt es viele, welche für alle Welt verſtändlich ſind, vorausgeſetzt, daß ſie klar entwickelt werden, nachdem ſie zuvor wiſſenſchaftlich begründet worden. So giebt es zwei Kategorien von Gelehrten; ſolche, die durch ihre unermüdeten Nachforſchungen, ihre geiſtreichen Experimente oder tiefen Gedanken die Wiſſenſchaft fördern, und ſolche, die ſie verbreiten. Mehre hervorragende Geiſter haben das eine wie das andere zu leiſten vermocht, es genügt, an Buffon, Cuvier, Laplace, Humboldt, Arago, Liebig, Schleiden, Schacht, Deſor, Vogt und Quatrefages zu erinnern. Alle dieſe Männer haben zum Fortſchritt der Wiſſenſchaft beigetragen und ſie zugleich

Digitized by Google

allgemein verſtändlich zu machen gewußt. Das Anſehen ihres Namens war Bürge für die Wahrheit ihrer Behauptungen, und, Dank der Klarheit und Eleganz ihrer Darſtellung, iſt das Publikum mit Kenntniſſen vertraut geworden, die ihm fremd geblieben ſein würden, wenn ſie ſich nicht der Mühe unterzogen hätten, ſie demſelben zu überliefern. Dank ihnen hat ſich das allgemeine Niveau der öffentlichen Bildung gehoben, der Wettſtreit iſt angeregt, Talente ſind zum Vorſchein gekommen, und die Induſtrie, eine Tochter der Wiſſenſchaft, hat ſich mit unerhörter Schnelligkeit entwickelt. Nicht ſo würde es geweſen ſein, wenn dieſe Männer ſtets nur die techniſche Sprache der wiſſenſchaftlichen Abhandlungen und Aufſätze geredet hätten, die nur den Eingeweihten verſtändlich iſt. Das friedliche Heer der Arbeiter würde ſich nicht durch eine Menge Freiwilliger rekrutirt haben, und doch iſt das Feld der Wiſſenſchaft ſo ungeheuer groß, daß der Arbeiter auf demſelben nie zu viel ſein können. „Die Dilettanten," ſagt Goethe, „ſind die nützlichen Verbündeten der Gelehrten, und Jeder kann in ſeinem Kreiſe zum gemeinſamen Werke beitragen. Eine einzige Bedingung genügt dazu: das aufrichtige Verlangen, die Wahrheit zu finden."

Um die Wiſſenſchaft volksthümlich zu machen, muß man ſie ſelbſt gründlich innehaben. Man kann Andern nicht die Schwierigkeiten der Einführung in dieſelbe erſparen, als wenn man ſie zuvor ſelbſt überwunden hat. Eine oberflächliche Kenntniß der Sache genügt nicht. Wer nicht ſelbſt einige Steine dem Gebäude hinzugefügt hat, kann unmöglich die Struktur deſſelben verſtehen und den Plan deſſelben erläutern. Meine Aufgabe iſt leichter. Ich habe nicht einen einzelnen Zweig der menſchlichen Wiſſenſchaften im Ganzen darzuſtellen, ſondern das vorliegende Werk beſteht nur aus einzelnen Bruchſtücken, wiſſenſchaftlichen Schilderungen angeſichts der Natur mit dem

Digitized by Google

festen Vorsatze hingeworfen, sie so, wie sie ist, wiederzugeben. Ich habe es gethan, ohne das Geringste dem Wunsche aufzuopfern, den Leser zu unterhalten, stets habe ich danach getrachtet, ihn zu belehren. Alle von mir behandelten Gegenstände sind erst wissenschaftlich bearbeitet worden, sie haben den Stoff zu einer Anzahl von Aufsätzen geliefert, die in besondern Sammlungen veröffentlicht wurden, als: Annales des sciences naturelles, Annales de chimie et de physique, Bibliothèque universelle de Genève, Bulletin de la Societé géologique de France, Mémoires de l'Académie des sciences de Montpellier u. s. w. Mehre dieser Bruchstücke sind selbst nichts weiter, als die einfache Uebertragung in gewöhnliche Sprache von rein wissenschaftlichen Abhandlungen. Besonders mögen erwähnt werden die Abschnitte über die vormaligen und jetzigen Gletscher von Spitzbergen, der Alpen und der Pyrenäen, die Analyse der Kälte auf den Hochgebirgen und die Pflanzen-Topographie des Mont Ventoux in der Provence. Auch bin ich bereit, für dieses Werk die ganze Verantwortlichkeit zu übernehmen, welche dem Gelehrten bei den ernstesten Arbeiten obliegt. Keine Behauptung ist leichthin gewagt. Alle meine Beschreibungen sind haarscharf und genau. Die Ergebnisse, bei denen ich anlange, sind durch Beobachtung und durch Erfahrung gewonnen, wobei Methoden eingeschlagen und Instrumente benutzt wurden, wie sie die heutige Wissenschaft fordert. Meine Irrthümer sind unwillkürliche, ich habe nichts verabsäumt, sie zu vermeiden.

Auf unterschiedlichen Reisen prüften andere und schärfere Augen, als die meinigen, die Wahrheit meiner Beobachtungen. Mit Auguste Bravais, zu früh den Wissenschaften entrissen,*) habe ich den Vortheil genossen, Spitzbergen zu besuchen, Lapp-

*) Siehe seine akademische Lobrede, gesprochen von Herrn Elie de Beaumont in der Generalversammlung des Instituts vom 6. Febr. 1865.

Digitized by Google

land, Schweden und Deutschland zu bereisen und den Mont Blanc zu besteigen. De Candolle Vater und Requien haben mich bei meinen Studien über die Pflanzentopographie des Mont Ventoux geleitet, und mit meinen Freunden Eduard Desor und Arnold Escher von der Linth habe ich Algerien durchstreift und bin in die Sahara vorgedrungen. Der Leser darf diesen Skizzen also Vertrauen schenken, das Publikum hat ihnen seine Gunst bereits in einem Maße erwiesen, das seinen stets wachsenden Antheil an den physikalischen und Naturwissenschaften bezeugt. In der That, alle diese Stücke mit Ausnahme desjenigen über die Crau sind allmälig in verschiedenen litterarischen Sammelwerken erschienen, als: Revue indépendante, Bibliothèque universelle de Genève, Revue des deux mondes, l'Illustration, Magasin pittoresque, l'Album de Combe Varin und le Tour du monde. Vorliegendes Werk hat mir Gelegenheit geboten, diese Arbeiten in Einklang mit dem gegenwärtigen Stande der Wissenschaft zu setzen und, so zu sagen, eine zweite durchgesehene und verbesserte Auflage derselben zu liefern.

Anscheinend ohne Verbindung unter einander, gehören diese Bruchstücke doch sämmtlich in einen ganz genau bestimmten Zweig des menschlichen Wissens: die physische Geographie im weitesten Sinne des Worts. Unter den zahlreichen Seiten dieser unermeßlichen Wissenschaft sind es einige, die in dieser Sammlung vorwiegen. Zuvörderst die Pflanzengeographie oder die Kunde von den Gesetzen der Pflanzenvertheilung auf der Oberfläche der Erde. Diese Gesetze knüpfen sich an die der Meteorologie, der physischen Geographie und der Geologie, welche abwechselnd citirt und angewandt werden. Nächst der Pflanzengeographie sind die Gletscher seit fünfundzwanzig Jahren der Gegenstand meiner Studien und Reisen gewesen und zwar hat mich eben so sehr die Frage über ihre ehemalige Ausdehnung, wie die gegenwärtigen Erscheinungen derselben beschäftigt. Ich

Digitized by Google

habe dieſe Frage entſtehen und wachſen ſehen, ich habe Theil genommen an den oft heißen Kämpfen, welche ſie hervorgerufen, ich habe ihre anſcheinenden Niederlagen für den Augenblick getheilt und ſie endlich mehr in Folge der innern Macht der Wahrheit, als in Folge der Diskuſſionen, zu denen ſie Veranlaſſung gegeben, triumphiren ſehen. Daraus folgt, daß jede Wahrheit, und wenn ſie in den Augen derer, welche ſie ausſprechen, noch ſo einleuchtend iſt, doch, bevor ſie allgemeine Zuſtimmung erlangt, eines Elementes nicht entbehren kann, welches der Ungeduld ihrer Verkündiger eine ſchwere Probe auferlegt. Dieſes Element iſt die Zeit. Möge dieſer Gedanke diejenigen tröſten und ſtärken, welche den Fortſchritt, in welcher Richtung es ſei, mit allen Kräften fördern. Die Zeit iſt jener langſame, aber unwiderſtehliche Arbeiter, deſſen Mitwirkung allein den Sieg zu ſichern vermag, ſie iſt es, welche den Irrthum unvermerkt unterhöhlt, indem ſie die feſteſten Stützen deſſelben: blinden Glauben, hartnäckigen Schlendrian, das Anſehen der Vergangenheit und die der menſchlichen Natur angeborene Trägheit des Geiſtes untergräbt. Sind dieſe Grundlagen erſt einmal zerſtört, ſo ſtürzt das Truggebäude zuſammen, und die Wahrheit erſcheint vor Aller Augen ſo hell und leuchtend, daß ſelbſt ihre Widerſacher nicht zugeben wollen, ſie je verkannt zu haben.

Ich hoffe, daß die Freunde der Naturwiſſenſchaften mir willig auf meinen Stationen von Spitzbergen zur Sahara folgen werden; ſie umfaſſen einen Erdbogen von fünfzig Breitegraden, vom 80. bis zum 30. Grade nämlich, von der Nordſpitze von Spitzbergen bis zu den Pyramiden Aegyptens. Die bunteſten Bilder werden am Leſer vorüberziehen. Möchten ſie ihm wenigſtens durch ihre Abwechslung gefallen und ihn an den Bewegungen Theil nehmen oder einen Blick in die Gemälde thun laſſen, welche mich in meiner Jugend entzückt und im

Digitized by Google

reifern Alter erfreut haben! Die Erinnerung daran wird mir die Laſt des Alters erleichtern, welches den Reiſenden zum Stillſtande verurtheilt, ein vorzeitiges Bild von dem nahen Ende jener Reiſe, welche wir Alle auf Erden zu vollbringen haben: der Lebensreiſe.

Montpellier, Botaniſcher Garten, 25. September 1865.

Ch. Martins.

Digitized by Google

Sachregiſter.

Seite

Widmung V
Vorrede von Profeſſor C. Vogt VII
Vorwort des Verfaſſers XIII

Einleitung.

Die Pflanzengeographie und ihre neueſten Fortſchritte 1
1. Die erſten Arbeiten der Pflanzengeographie 3
2. Pflanzenſtatiſtik. — Verſchiedene Einflüſſe, welche die Vertheilung der Pflanzen auf der Erdoberfläche beſtimmen 19
3. Naturaliſation und Akklimatiſation der Pflanzen. — Erſcheinen der Arten auf dem Erdboden 45

Spitzbergen.

Bild eines Inſelmeers zur Eiszeit 65
Entdeckung und Erforſchung von Spitzbergen 66
Klima von Spitzbergen 80
Phyſiſche und geologiſche Beſchaffenheit von Spitzbergen 87
Flora von Spitzbergen 94
Phanerogamen von Spitzbergen 98
Phanerogamen des Faulhorngipfels 103
Phanerogamengewächſe vom Jardin des Mer de Glace de Chamouni 108
Phanerogamen der Grands Mulets 112
Phanerogamen aus der Umgebung der Vincenthütte auf dem Monte Roſa 113
Phanerogamen vom Gipfelpunkt des St. Theodul-Paſſes . . . 114
Fauna von Spitzbergen. — Säugethiere 116
Vögel 127
Fiſche und wirbelloſe Thiere 132

Das Nordkap von Lappland 139

Digitized by Google

Seite

Ein wissenschaftlicher Winteraufenthalt in Lappland 146
Alte Meerspiegellinien 151
Aufstellung der Instrumente 156
Ebbe und Fluth des Meeres 158
Astronomie. Sternschnuppen 158
Meteorologische Reihe 163
Temperatur 164
Atmosphärischer Druck 171
Nordlichter 174
Erdmagnetismus 182
Schädelmessungen 184
Schlüsse und Hoffnungen 187

Reise in Lappland vom Eismeer bis zum Bottnischen Meerbusen . 190
Pflanzen aus der Umgegend von Karesuando 209

Pflanzenbesiedelung der brittischen, der Shetland- und Färöerinseln, sowie Islands 222

Zwanzigste Versammlung der brittischen Gesellschaft zu Edinburg im August 1850 239

Die Alpengletscher und ihre ehemalige Ausdehnung in den Ebenen der Schweiz und Italiens 257
Jetzige Gletscher 261
Von den jetzigen Gletschern geglättete und gereifelte Felsen . . . 267
Moränen und erratische Blöcke der jetzigen Gletscher 270
Von den jetzigen Gletschern gestreifte Kiesel 273
Ehemalige Ausdehnung der Montblanc-Gletscher von Chamouni bis Genf 276
Klima der Eiszeit 293

Zwei wissenschaftliche Besteigungen des Montblanc 298
Besteigung von Saussure 302
Besteigung von Bravais, Martins und Lepileur 311
Wissenschaftliche Resultate 338

Digitized by Google

Einleitung.

Die Pflanzengeographie und ihre neueſten Fortſchritte.

Die heutige Botanik iſt eine komplicirte Wiſſenſchaft, in ihrem Beginn war ſie es nicht. Die Pflanzen, welche ſich der Beobachtung darboten, nennen und beſchreiben, diejenigen, welche die Alten gekannt hatten, wieder auffinden und ſo allmälig das Verzeichniß der Pflanzenarten, welche auf der Oberfläche der Erde wachſen, vervollſtändigen, das war die ungeheure, aber einförmige Aufgabe, welcher ſich die Botaniker des Mittelalters und der Renaiſſance unterzogen. Zu Anfang des 17. Jahrhunderts entdeckte man, daß die Pflanze ein lebendes Weſen wie das Thier ſei, man unternahm das Studium ihrer Funktionen. Die Pflanzenphyſiologie entſtand und gewann Platz neben der beſchreibenden Botanik. Als man das Spiel einiger Organe zu erkennen anfing, ſtudirte man ſie zugleich mit mehr Sorgfalt, man ſuchte in den inneren Bau einzudringen. Die Pflanzenanatomie, eine Tochter Grew's und Malpighi's, erhellte die Phyſiologie und bildete mit ihr einen beſtimmten Zweig der Wiſſenſchaft, welche die Pflanzen als organiſche und lebende Weſen betrachtet. Alle denkenden Geiſter wurden durch den engen Zuſammenhang dieſes Zweiges mit

Digitized by Google

der Thierphysiologie überrascht und verkündeten die künftigen Anwendungen, welche die rationelle Landwirthschaft davon erwarten könnte.

Während die Botanik sich entwickelte, blieben die übrigen Wissenschaften keineswegs stillstehen. Unerschrockene Reisende durchwanderten die am wenigsten erforschten Theile des Erdballs, vergrößerten das Gebiet der physischen Geographie, und unser eigener Kontinent ward einer eingehenderen Prüfung unterworfen. Die Meteorologen lernten die verschiedenen Klimate charakterisiren, sie bestimmten die äußersten Wärme- und Kältepunkte, die Richtung der herrschenden Winde und die Vertheilung des Regens in den vier Jahreszeiten. Die Geologen entwarfen Karten, auf denen jede Gebirgsart mit einer besondern Farbe bezeichnet ist. Die Landwirthe sonderten die verschiedenen Bodenarten. Man bestimmte die Höhe der Gebirge, die Mächtigkeit, Länge und Richtung ihrer Ketten, die Ausdehnung und Neigung der Hochebenen; man berechnete die Abnahme der Lufttemperatur, welche sich abkühlt, je mehr man sich über den Meeresspiegel erhebt. Aus der Verbindung dieser vier Wissenschaften, der Botanik, der Meteorologie, der physischen Geographie und der Geologie, entstand eine neue Wissenschaft, die Pflanzengeographie.

Die Alten beschränkten sich darauf, festzustellen, daß diese oder jene Art in verschiedenen Ländern zugleich vorkomme, während andere Arten sich nur in bestimmten Bezirken vorfinden. Die Pflanzengeographie studirt die Gesetze der Pflanzenvertheilung auf der Erdoberfläche, sie sucht zu ergründen, warum gewisse Arten kosmopolitisch sind, während andere unwiderruflich auf einen gewissen Raum beschränkt zu sein scheinen, sie erforscht, worin die von der Atmosphäre, der Erhebung über die Ebenen, der Nähe oder Ferne des Meeres, der physischen oder chemischen Bodenbeschaffenheit abhängigen Ursachen bestehen mögen, welche der Vegetation einer jeden

Digitized by Google

Gegend ihren eigenthümlichen und unauslöschlichen Charakter aufdrucken. Die höchsten Fragen der Naturgeschichte in Betracht ziehend, stellt sie die Beziehungen der gegenwärtigen Flora unseres Planeten zu den erloschenen Floren der verschiedenen geologischen Epochen fest, sie trachtet den Prozeß der Schöpfung zu errathen und zu erkennen, ob die unzähligen Individuen einer und derselben Art ursprünglich von einem einzigen auf einem bestimmten Punkte der Erde entstandenen Individuum abstammen, oder ob es nicht vielmehr für eine und dieselbe Art verschiedene Schöpfungsmittelpunkte giebt, von wo aus eine jede Pflanze sich ringsumher ausbreitete, bis mit ihrem Dasein unverträgliche Umstände ihren Wanderungen ein Ziel setzten. Diese Bemerkungen werden, hoffe ich genügen, das philosophische Interesse dieser Art von Untersuchungen darzuthun. Ein Theil des Schleiers ist bereits gelüftet, und die Pflanzengeographie läßt einigermaßen die Gesetze erkennen, welche beim Erscheinen der Pflanzen auf dem Erdballe obgewaltet haben.

1. Die ersten Arbeiten in der Pflanzengeographie.

Es würde schwer halten zu sagen, welcher Autor es ist, dem wir die ersten Begriffe der Pflanzengeographie zu verdanken haben; man findet sie zerstreut bei allen denen, welche, nachdem sie eine Art beschrieben, die Länder aufzählten, worin sie natürlich wächst; allein diese vereinzelten Bemerkungen bilden wohl einzelne Bausteine der Wissenschaft, aber kein zusammenhängendes Ganze. Linné, dessen Genie alle der Naturgeschichte vorbehaltenen Eroberungen geahnt hat, legte auch den ersten Grund zur Pflanzengeographie und begriff, daß sie eines Tages einen der anziehendsten Zweige derselben bilden würde. In einem Vortrage über das Anwachsen der Erde zeigt er, wie der bewohnbare Boden langsam aus dem Schooße des Meeres emportauchte und sich mit Pflanzen bedeckte, deren Samen nach allen Rich-

Digitized by Google

tungen von verschiedenen Kräften, als Winden, Flüssen, Thieren, ja vom Menschen selbst, zerstreut und verbreitet werden. In einer andern Abhandlung beweist er, daß viele Pflanzen bestimmte Standörter einnehmen, indem die einen in fließenden Gewässern, die andern in Sümpfen, noch andere am Meeresstrande wachsen. Es giebt solche, die sich nur auf dürrem Sandboden gefallen, solche, welche Schutt und Geröll vorziehen, andere, welche mit ihren Wurzeln in Steinritzen eindringen und zum Reiz der Ruinen beitragen, indem sie dieselben mit Blumen schmücken, wieder andere, die an senkrechten Felswänden emporklimmen, während die meisten ein fettes und fruchtbares Erdreich lieben, wo sie zu vollständiger Entwickelung gelangen können. Endlich lieferte Linné in einer unter seinem Vorsitz von einem seiner Zöglinge vertheidigten These Beispiele von Pflanzenkolonien, die sich in weiter Entfernung von ihrem ursprünglichen Vaterlande gebildet hatten. Persönliche Eindrücke verbanden sich mit diesen wissenschaftlichen Untersuchungen und deuteten auf die malerische Seite der neuen Wissenschaft hin. Während seiner Reise in Lappland wurde die jugendliche Einbildungskraft Linné's *) durch die zunehmende Verarmung der Pflanzendecke angeregt, welche zusehends erstarb, je mehr er nach Norden vordrang. Selbst die Bäume Schwedens, seines kalten Vaterlandes, verließen ihn nacheinander am Abhange der lappländischen Alpen, wo nur Kiefern und Birken der Strenge der Winter und der Unzulänglichkeit der Sommer Widerstand leisten. Im Geiste verglich er die üppige Vegetation der Tropen mit den unscheinbaren Gewächsen, welche ihn umgaben, und in dem ihm eigenen klaren und poetischen Style schließt er die Prolegomena seiner Flora lapponica mit den Worten: „Das Palmengeschlecht herrscht auf den heißesten Theilen des Erdballs, die Tropenzonen werden

*) Im Jahre 1732; er war damals fünfundzwanzig Jahre alt.

Digitized by Google

von Stauden und Sträuchern bewohnt, ein reicher Pflanzengürtel umgiebt die Gestade von Südeuropa, Scharen grüner Gräser überziehen Holland und Dänemark, zahlreiche Moosgeschlechter sind in Schweden zu Hause, die fahlen Algen aber und weißen Flechten kommen nur im kalten Lappland, dem entlegensten aller bewohnbaren Erdstriche, fort. Die letzten aller Pflanzen bedecken den letzten aller Erdstriche."

Die Veränderung und Verarmung, welche Linné beobachtete, indem er von Süden nach Norden zog, hatte Tournefort schon bemerkt, als er die Abhänge des Ararat in Asien bestieg. Am Fuße des Gebirges traf er die Pflanzen Armeniens an, höher hinauf die von Italien, noch höher die aus der Umgegend von Paris, darüber die von Schweden, und endlich in der Nähe des ewigen Schnees die von Lappland. Buffon, Zeitgenosse und Nebenbuhler Linné's, charakterisirte, alle diese zerstreuten Züge zusammenfassend, die Pflanzengeographie in wenigen Worten so: „Die Pflanzen, welche die Erde bedecken," sagte er, „und noch inniger als das grasende Thier ihr angehören, hängen auch noch mehr als dieses von der Natur des Klimas ab. Jedes Land, jeder Temperaturgrad hat seine besondern Arten. Am Fuße der Alpen findet man die Pflanzen Frankreichs und Italiens, auf ihrem Gipfel pflückt man die der nordischen Länder. Diesen selben Pflanzen des Nordens begegnet man auf den eisigen Gipfeln der Gebirge Afrikas. Auf der Südseite der Berge, welche die Mongolei von Kaschmir trennen, bewundert man alle Pflanzen Indiens und ist überrascht, auf der andern Seite nur europäische Pflanzen zu finden. In den extremen Klimaten gewinnt man auch die Arzneipflanzen, die wohlriechenden Kräuter, die Gifte und all' die Gewächse, deren Eigenschaften extreme sind. Das gemäßigte Klima dagegen erzeugt nur gemäßigte Gegenstände. Die zartesten Kräuter, die gesundesten Gemüse, die lieblichsten Früchte, die

Digitized by Google

ruhigsten Thiere, die gebildetsten Menschen sind das Erbtheil dieses glücklichen Klimas."

Es ist klar, daß Linné und Buffon die Pflanzengeographie vorausgeahnt und bestimmt hatten. Ein bescheidener Abbé, dessen Name zu wenig bekannt ist, sollte die erste Anwendung derselben auf ein besonderes Land machen. In seiner Histoire naturelle de la France méridionale, 1782 erschienen, widmet der Abbé Giraud-Soulavie die Hälfte eines ganzen Bandes der Topographie der Pflanzen, welche der Gegend zwischen dem Mittelländischen Meere und dem Kamm der Sevennen oder des Vivarais angehören, dessen Gipfelpunkt, der Mont-Mezenc, sich 1754 Meter über das Meer erhebt. Für ihn war die Pflanzengeographie eine aus Anschauung entstandene Offenbarung. Eine gebildete Mutter, die seine schwächliche Gesundheit durch die belebende Luft dieser Berge, an deren Fuße er geboren war, kräftigen wollte, zeigte ihm die Reihenfolge der Zonen, welche sie Arm in Arm mit ihm durchwanderte. Dieser mütterliche Unterricht hatte sich seinem Geiste eingeprägt, und er machte ihn zum Gegenstande eines der interessantesten Theile seines Werkes. Nachdem er bewiesen hat, daß das Klima, je höher man sich erhebt, desto strenger wird, unterscheidet Soulavie fünf übereinandergelegene und je durch die Orange, die Olive, den Weinstock und Maulbeerbaum, die Kastanien, die Fichten und Alpenkräuter charakterisirte Pflanzenzonen. Betroffen von dem vorherrschenden Einfluß des Klimas verkennt er doch nicht den des Bodens und hebt ihn hervor, indem er vergleichende Untersuchungen zwischen der Vegetation der granitischen, kalkigen und vulkanischen Gesteine, welche das Gerippe der Gebirge des Vivarais bilden, anstellt.

Einige Jahre nach Erscheinen des Werkes von Giraud-Soulavie ward Frankreich von einem anscheinend verschiedenen, in Wirklichkeit aber von der Wissenschaft, womit wir uns be-

Digitized by Google

schäftigen, abhängigen Gesichtspunkte aus studirt. Ein englischer Landwirth, Arthur Young, welcher der so ehrenwerthen Klasse der gentlemen farmers angehörte, hatte die drei Königreiche zu wiederholten Malen bereist und ein Gemälde ihres Kulturzustandes entworfen. Um den Werth der Ackerbaumethoden seines Landes zu beurtheilen, mangelte ihm ein vergleichender Maßstab, er beschloß also, Frankreich zu besuchen. Vier Sommer, von 1787 bis 1790, wurden dieser Reise gewidmet. Nicht von einer Lokomotive auf Eisenbahnen, deren Möglichkeit die kühnste Einbildungskraft damals noch nicht geahnt hätte, fortgerissen, ja nicht einmal in den schwerfälligen Postwagen oder den harmlosen Miethskutschen der damaligen Zeit vollbrachte Young seine landwirthschaftliche Pilgerfahrt. Diese Beförderungsmittel erschienen ihm noch zu schnell. Young bereiste Frankreich zu Pferde, immer von derselben Stute getragen, sich von den Heerstraßen fern haltend, bei einem Meierhofe Halt machend, um die Ackerbaumethoden und landwirthschaftlichen Geräthe, die Zugpferde und Heerden in Augenschein zu nehmen, absteigend, um sich mit den Arbeitern, welche er auf den Feldern fand, zu unterhalten und sich nach Kosten- und Verkaufspreis der Bodenprodukte zu erkundigen. War seine Wißbegierde befriedigt, so stieg er wieder zu Pferde und sann auf dem Wege über das, was er gesehen und das, was er weiter sah, nach. Nachdenken reifte so langsam die Ergebnisse der Beobachtung und führte ihn zu Schlüssen, deren Richtigkeit die Folgezeit bestätigt hat. Zu gleicher Zeit versäumte Young nicht, die Gelehrten, Schriftsteller und gebildeten Landedelleute, welche in der Provinz wohnten, zu besuchen. Ist es zu verwundern, daß er Frankreich, nachdem er es mit einem von unsern Vorurtheilen freien Geiste und mit einem Maßstabe, wie der Englands, studirt hatte, besser beurtheilte als die Franzosen, und daselbst Entdeckungen machte, die uns selbst eben so neu wie

Digitized by Google

allen übrigen Völkern waren? Young hat zuerst die so verschiedenen Klimate unterschieden, welche Frankreich seiner geographischen Lage und der Bildung seines Bodens verdankt. Was Giraud-Soulavie so glücklich für das Languedoc vollbrachte, hat Young für das ganze Königreich geleistet. Er zuerst hat die Kulturgrenzen bemerkt, welche man durchschreitet, indem man von Norden nach Süden und von Süden nach Norden reist, nämlich die der Olive, des Feigenbaums, des Mais und des Weinstocks. Er zuerst entwarf eine Karte der verschiedenen urbaren Bodenarten Frankreichs, er ist demnach zugleich Schöpfer der Ackerbau-Geologie und Geographie, also der Pflanzengeographie der kultivirten Gewächse. Trotz der in der ganzen Welt durch die großen Ereignisse des Jahres 1789 hervorgerufenen Bewegung machte die Reise Arthur Young's doch tiefen Eindruck und ist ein vollendetes Vorbild landwirthschaftlicher Erforschung eines großen Landes geblieben.

Führen wir nach Arthur Young und Giraud-Soulavie noch Benedict de Saussure und Louis Ramond an. Die Reisen, welche der Erste in die Alpen, der Zweite in die Pyrenäen gemacht haben, sind, obgleich speziell der Geologie gewidmet, doch voll von Bemerkungen über die Pflanzentopographie dieser Gebirge; überall zeigen und würdigen sie den Einfluß der Höhe, der Lage, des Schutzes sowie der Natur des Bodens auf den Pflanzenwuchs. Ramond bereitete sich so auf sein Mémoire sur la végétation au sommet du pic du Midi vor, worin er zuerst die vollständige Flora eines 2877 Meter über dem Meeresspiegel erhabenen Gipfels zu schildern suchte. Die Schriften Saussure's und Ramond's über die höchsten Gebirge unsers Kontinents schließen würdig die Reihe der Versuche, welche im 18. Jahrhundert die Erhebung der Pflanzengeographie zu einer Wissenschaft vorbereiteten.

Zu Anfang des 19. Jahrhunderts stoßen wir zuerst auf

Digitized by Google

den Namen des berühmteſten Vertreters dieſes Zweiges der phyſikaliſchen und Naturwiſſenſchaften, Alexander von Humboldt. Der Glanz und die Bedeutung ſeiner Arbeiten ſind ſelbſt derartig, daß er gewöhnlich als Schöpfer deſſelben betrachtet wird. Humboldt iſt es auch in der That, der die engen Grenzen Europas überſchritt und die geſammte Welt in das Bereich unſerer Wiſſenſchaft zog. Dank ſeinen umfaſſenden Kenntniſſen, hat dieſer große Reiſende die Pflanzengeographie mit der Meteorologie, mit der phyſiſchen Geographie und mit der Geologie zu verbinden gewußt, die hinfort ihre unzertrennlichen Gefährten geworden ſind. Nach der Rückkehr von ſeiner Forſchungsreiſe in die Aequinoctialgegenden, noch voll von den Kontraſten, welche er zwiſchen der Vegetation der alten und der neuen Welt beobachtet hatte, giebt er ſeine Ideen zu einer Phyſiognomik der Gewächſe heraus. Maleriſch jene Formen beſchreibend, welche der Landſchafter auf die Leinwand zu bannen ſucht, und welche dem Ausſehen der verſchiedenen Erdtheile einen ſo mannichfaltigen Charakter verleihen, führt Humboldt ſie auf einige Haupttypen zurück. Er zeigt, daß es das Vorherrſchen dieſer oder jener vegetabiliſchen Form iſt, welche uns ſofort eine beſtimmte Gegend erkennen läßt. Kiefern und Fichten verſetzen uns nach dem Norden oder auf die Hochgebirge Europas, Eichen oder Buchen in die gemäßigte Zone, die Olivenbäume nach dem Süden, die Palmen nach den Wendekreiſen. Das Kap der guten Hoffnung iſt das Vaterland der Haidekräuter, Mexiko das der Orchideen. In dieſem reizenden Werke enthüllt Humboldt die geheime Verwandtſchaft, welche die Botanik mit der Malerei und Poeſie verknüpft, denn der Boden, die Erd- und Gebirgsarten ſind überall dieſelben, die Vegetation aber iſt der wechſelnde Schmuck der Erde. Wenn der Geologe den Fuß auf die Küſten der neuen Welt ſetzt, ſo erkennt er die Gebirge der alten wieder,

Digitized by Google

dem Botaniker aber ist Alles fremd, der Schmuck der Erde ist nicht mehr derselbe, es ist eine andere Schöpfung, ganz verschieden von der Europas, Afrikas oder Asiens.

Diesem poetischen Versuche ließ Humboldt einen andern ernsterer Art folgen, worin er die wissenschaftlichen Grundlagen zu einer Pflanzengeographie legte. Und damit sie Niemandem entgehen, schreibt er in lateinischer Sprache, der einzigen allgemein verständlichen der gelehrten Welt. Nachdem er die Gesammtzahl der auf der Erdoberfläche verbreiteten Gewächse geschätzt hat, zeigt er die Vertheilung der vier natürlichen, von den Klassifikatoren in der Aequatorialzone, den gemäßigten Ländern und den nördlichen Regionen aufgestellten Gruppen; dies ist die Pflanzen-Arithmetik oder Statistik. Darauf handelt Humboldt von den gesellig wachsenden Pflanzen, sodann von denen, welche dem alten und neuen Kontinent gemeinsam sind, endlich untersucht er den Einfluß des Klimas auf die Vertheilung derselben. Er zuerst zeigt deutlich, daß die gleich weit vom Aequator entfernten und in gleicher Höhe über dem Meeresspiegel liegenden Punkte nichtsdestoweniger verschiedenartige Klimate haben können, während Gegenden, die unter weit von einander entfernten Parallelkreisen liegen, gleichartige Klimate besitzen. So hat Boston, auf der Ostküste Amerikas unter demselben Breitengrade wie Perpignan, eine mittlere Jahrestemperatur von 8°,9, während die von Perpignan 15°,0 beträgt. Baltimore liegt unter demselben Parallelkreise wie Cagliari auf Sardinien; seine mittlere Jahrestemperatur beträgt 11°,6, die Cagliaris 16°,3. Humboldt zeigt, wie sehr die Vegetation von diesen Unterschieden abhängt und wie viele anscheinende Anomalien die nothwendige Folge davon sind. Die geschlängelten Kurven, welche den Erdball umziehen, wenn man sämmtliche Punkte, die eine gleiche mittlere Temperatur besitzen, durch Linien mit einander verbindet, sind von ihm mit dem

Digitized by Google

Namen Isothermen bezeichnet worden. So setzt die Isotherme von Paris (48° 50′ n. Br.) bei Portsmouth, welches unter 50° 48′ n. Br. liegt, nach England, und bei Erasmus-Hall, welches nur 40° 38′ vom Aequator entfernt liegt, nach den Vereinigten Staaten über. Die Karten der Monatsisothermen, jüngst erst von Dove entworfen und Humboldt als Ergänzung seines Werkes gewidmet, zeigen noch besser, wie sehr die Vegetation durch diese ungleichmäßige Vertheilung der Wärme über den Erdball beeinflußt werden muß. Nehmen wir die extremen Monate: der Monat Juli ist eben so heiß zu Halifax in Amerika (49° 39′ n. Br.) wie zu London (51° 31′ n. Br.), zu Berlin (52° 31′ n. Br.) zu St. Petersburg (59° 56′ n. Br.) und auf der Ostküste Asiens unter dem 40sten Grade. Auch trifft man dieselbe Temperatur im Juli auf Punkten an, deren Entfernung vom Aequator um 20 Breitegrade oder 500 Stunden von einander abweicht. Andererseits ist der Monat Januar zu Halifax (49° 30′ n. Br.) eben so kalt wie am Nordkap (71° 10′ n. Br.), zu Christiania (59° 55′ n. Br.), zu Asow im südlichen Rußland (47° n. Br.), sowie zu Peking in China (39° 54′ n. Br.). Durchschnittlich spürt man also während des Monats Januar eine eben so rauhe Kälte zu Peking, im südlichen Theile von Centralasien gelegen, wie am Nordkap, dem entlegensten Vorgebirge von Lappland. Diese beiden Punkte liegen 31 Breitegrade, oder 775 Stunden an einem Erdmeridian gerechnet, auseinander. Obige Zahlen genügen, um die Wichtigkeit dieser Angaben für die Pflanzengeographie zu zeigen. Die unglaubliche Verschiedenheit der Klimate, die einen extrem, durch glühende Sommer und strenge Winter charakterisirt, die andern gleichmäßig mit gelinden Wintern und darauf folgenden Sommern ohne Hitze, die Zwischenjahreszeiten, Frühjahr und Herbst, verschwindend oder in die andern hinübergreifend, das so verschiedene Auftreten des Regens, abwechselnde Dürre oder Feuch-

Digitized by Google

tigkeit, alle dieſe Elemente, auf tauſendfache Weiſe verändert und verbunden, ſcheinen dem Schoße der Erde die mannichfaltige Vegetation, womit ſie bunt geſchmückt iſt, entlockt zu haben. So erweitert und verſchärft Humboldt zugleich die klimatologiſchen Geſetze, welche Arthur Young halb und halb erkannte. Die Vegetationsleiter, von Giraud-Soulavie am Abhange der beſcheidenen Sevennen verfolgt, dehnt er über den Chimboraſſo, den Kaukaſus, die Pyrenäen, die Schweizer- und Lappland-Alpen aus, indem er die Geſetze der Temperaturabnahme der Höhe gemäß ſteile Abhänge, iſolirte Gipfel oder ſanft ablaufende Vorberge der großen Gebirgsmaſſive entlang beſtimmt.

Als Humboldt ſein Werk ſchrieb, hatte er noch nicht die nördlichen Gegenden Europas beſucht; zwei ſeiner Zeitgenoſſen aber erforſchten ſie in ſeinem Sinne. Der erſte iſt Georg Wahlenberg. Ein Landsmann und Schüler Linné's, beſucht er das nördliche Schweden, Norwegen und Lappland in den erſten Jahren des gegenwärtigen Jahrhunderts, dann, begierig, die Flora des Nordens von Europa mit derjenigen der Schweizer Alpen zu vergleichen, durchſtreift er nach allen Richtungen die Gruppe von Gebirgen, welche den Vierwaldſtätterſee umgeben, ſowie die des Kantons Appenzell. Je höher er an ihren Abhängen emporſteigt, deſto mehr Pflanzen ſeines Vaterlandes trifft er an, und an der Grenze des ewigen Schnees begrüßt er gerührt die beſcheidenen, aber reizenden Blümchen, welche er am Ufer des Eismeeres gepflückt hatte. Nicht zufrieden mit dieſem Vergleich, will er noch die Karpathen ſehen. An den Grenzen Aſiens gelegen, bietet ihm dieſes Gebirge eine ähnliche, doch nicht gleiche Vegetation mit derjenigen der Alpen und der Polargegenden dar. Den Norden Europas, welchen Linné und Wahlenberg als Botaniker beſchrieben hatten, erforſchte ein Freund und Landsmann Humboldt's, Leopold von Buch, als Geologe und als

Digitized by Google

Meteorologe. Seine Reise, im Jahre 1806 unternommen, ist ein wissenschaftliches und litterarisches Meisterwerk zugleich. Man kann nicht besser beobachten, als es Buch gethan hat, und es möchte schwer halten, anziehender die großartigen und düstern Bilder der nordischen Natur wiederzugeben.

Nachdem einmal durch die Schriften Linné's, Humboldt's, Leopold's von Buch und Wahlenberg's den Gelehrten der Anstoß gegeben war, drang die Pflanzengeographie allmälig in Arbeiten ein, die bis dahin nicht die mindeste Spur davon aufzuweisen gehabt hatten. Die Schriftsteller der Flora eines Landes suchten das Pflanzengebiet in der Gegend, deren Arten sie beschrieben, zu charakterisiren, sie bemerkten die Höhe, bis zu welcher sich gewisse Alpenpflanzen erheben, unterschieden die Standörter der übrigen und zeigten genauer die geographischen Grenzen einer jeden von ihnen an. De Candolle lieferte in seiner Flore française und in seinem Mémoire sur la géographie des plantes de la France considérées dans leurs rapports avec la hauteur vortreffliche Muster dieser Art. Einige Jahre später faßte er im Dictionnaire des sciences naturelles in dem Artikel über die géographie botanique den Stand unserer Kenntnisse über diesen Gegenstand zusammen. So entwarf er das Programm eines Werkes, womit sein Sohn fünfundzwanzig Jahre später die Wissenschaft beschenken sollte. Bald darauf gab ein dänischer Gelehrter, Schouw, eine vollständige Abhandlung über Pflanzengeographie heraus, worin die Grenzen der wildwachsenden und kultivirten Pflanzen sorgfältig gezogen und mit den Isothermlinien, von denen die Rede gewesen, in Verbindung gesetzt wurden.

Während der ganzen Dauer der Republik und des Kaiserreichs blieben die Meere den Kontinentalvölkern Europas verschlossen. Reisen waren schwierig und gefährlich, die Unfälle des Krieges kamen zu denen der Schifffahrt hinzu. Nur mit

Digitized by Google

unendlicher Mühe hatten die französischen Gelehrten der ägyptischen Expedition vermocht, ihre Manuscripte und Sammlungen zu retten. Einzelne Reisende, wie Leschenault de la Tour, Dupetit-Thouars, Broussonnet, Michaux, Bory de Saint-Vincent kehrten erst, nachdem sie tausend und aber tausend Unfälle erlitten, nach Frankreich zurück. Der Friede von 1815 erschloß die Welt den Naturforschern. Die großen Nationen ordneten Erdumsegelungen an. Botaniker, die daran Theil nahmen, sahen die Kontraste der Vegetation an sich vorüberziehen, deren Schilderung sie in den Reisewerken Lord Anson's, Cook's und Bougainville's entzückt hatte. Auf den Kanarischen Inseln Gehölze von Lorbeer- und Orangenbäumen, von Euphorbien und Opuntien mit sonderbaren Formen, in Brasilien die üppigste Vegetation der Welt, Palmen, Bananen, Baumfarne, am Kap Horn einige krüppelhafte vom Winde gekrümmte Stauden und grüne Rasenplätze, an die des nördlichen Europa erinnernd, auf den Inseln der Südsee Kokospalmen von sandigen in's Meer verlaufenden Gestaden emporstrebend, in Australien eine seltsame Vegetation, so verschieden von der der ganzen übrigen Welt, daß sie den geologischen Epochen, welche dem Erscheinen des Menschen auf der Erde vorangegangen, anzugehören scheint, in Indien die riesigen Feigenbäume, prachtvollen Blüthen und breiten Blätter, am Kap der guten Hoffnung Haidekräuter, Zamien, Proteen, Stauden mit harten und weißlichen Blättern, das waren die botanischen Eindrücke, welche selbst die schnellsten Erdumsegelungen in der Vorstellung der Reisenden zurückließen.

Zu gleicher Zeit gaben sich die Botaniker Mühe, sämmtliche Pflanzen, welche in einem Lande wachsen, zu sammeln, sie brachten die Produkte desselben mit heim, denen dann, von Stubengelehrten beschrieben, in dem unermeßlichen Inventar der Natur ihre Stelle angewiesen wurde. So ward, um nur

Digitized by Google

einige Beiſpiele anzuführen, Japan, das im vorigen Jahrhundert von Kämpfer und Thunberg beſucht worden war, ſieben Jahre lang von Siebold erforſcht, der Blumenzüchter Fortune wußte ſich in China Zutritt zu verſchaffen und botaniſirte zwiſchen den Rabatten der Mandarinen, von denen er uns ſo viel Zierpflanzen mitgebracht hat, Bunge drang in die Mongolei ein. Das aſiatiſche und europäiſche Rußland, durch Pallas' Reiſen veranſchaulicht, ward in allen ſeinen Theilen von Ledebur, von von Baer, Erman, Dübois de Montpéreur und Hommaire de Hell beſucht.

Im Mittelalter war der Orient der große Markt Venedigs, das Land des Goldes und der Edelſteine, das Kalifornien der damaligen Zeit, welches alle Glücksritter anzog. Rauwolf, Belon, Burbaum und Tournefort waren die Erſten, welche nur Blumen halber dahin gingen. In neuerer Zeit haben Michaud Perſien, Aucher-Eloy, Tchihatchef und Graf Jaubert Kleinaſien beſucht. Griechenland iſt durch Sibthorp und Bory de Saint Vincent, Arabien durch Forskal, Syrien durch Labillardière erforſcht worden. Indien, dieſe Wiege der Religion und der europäiſchen Völkerſtämme, den Holländern nur obenhin bekannt, ward von Leſchenault de la Tour, Roxburgh, Wight, Jacquemont, Blume, Royle, Griffith, Perrottet und in ganz neueſter Zeit von Hooker dem Sohne durchwandert.

Afrika, dieſes verderbliche Land, das Grab ſo vieler Reiſenden, iſt allmälig erſchloſſen worden. Die franzöſiſchen Heere haben im Jahre 1800 durch die zeitweilige Eroberung Aegyptens, im Jahre 1830 durch die dauernde Beſitzergreifung Algeriens, den Weg dahin eröffnet. Desfontaines, Vahl, Poiret, Schousboe, Broussonnet hatten dieſe damals den Türken unterworfenen Gegenden bereits durchſtreift. Delile hat die Flora Aegyptens, das ſeit ihm von Ehrenberg und Bové beſucht wurde, zuſammengeſtellt. Bruce, Caillaud, Schimper, d'Abbadie, Leſèvre und

Digitized by Google

Dillon ſind in Nubien und Abyſſinien eingedrungen. Adanſon, Paliſot de Beauvois, Oudney, Denham und Clapperton, Leprieur, Perrottet und Chriſtian Smith haben die Weſtküſte Afrikas bekannt gemacht, Sparmann und Burchell das Kap der guten Hoffnung; Leopold von Buch, Bowditch, Webb und Berthollet haben ein vollſtändiges Gemälde der Pflanzenwelt von Madeira und der Gruppe der Kanariſchen Inſeln entworfen.

Nordamerika, von Kalm, Purſh, Michaux, Vater und Sohn, Nuttal, dem Prinzen zu Neuwied und Douglas beſucht, bedarf keiner Unterſtützung von Seiten europäiſcher Botaniker mehr. Jeder Staat beſitzt ſein eigenes wiſſenſchaftliches Perſonal und giebt das vollſtändige Bild ſeiner Natur- und Ackerbau-Produkte heraus.

Südamerika, das Eldorado der Botanik, im vorigen Jahrhundert von Marcgraf, Piſon, Pater Feuillée, La Condamine, Joſeph de Juſſieu, Löfling, Mutis und Aublet enthüllt, hat noch nicht die Hälfte ſeiner Reichthümer ausgeliefert. Doch haben Auguſte de Saint-Hilaire, von Martius, Pohl, Lund und Gardner uns die Vegetation Braſiliens, Galeotti die Merikos, Pöppig und Claude Gay die Chilis und Perus, Richard und Leprieur die Pflanzen des franzöſiſchen Guyana, Schomburgh die des engliſchen Guyana, Linden die Kolumbiens kennen gelehrt. Herr Ramon de la Sagra, von verſchiedenen Mitarbeitern unterſtützt, hat uns eine vollſtändige Beſchreibung der Inſel Kuba gegeben. Die Antillen, im vorigen Jahrhundert von Sloane, Plümier, Jacquin und Swartz in Augenſchein genommen, ſind neuerdings von Tüſſac, Poiteau und Turpin beſucht worden. Dumont d'Urville und Gaudichaud haben Kunde von der antarktiſchen Flora des Feuerlandes und der Malvineninſeln gegeben, eiſiger Striche, welche auf der ſüdlichen Erdhälfte das Gegenſtück zu Lappland und den benachbarten Inſeln des Nordpols bilden. Endlich hat Dalton Hooker die Pflanzen der äußerſten Südländer, welche

Digitized by Google

von James Roß entdeckt wurden, und die ein unübersteiglicher Eiswall vielleicht aufs neue lange Zeit der Wißbegierde der Reisenden entziehen wird, gesammelt und beschrieben.

Alle diese Naturforscher haben die Pflanzengeographie befördert, die einen unmittelbar durch die Beschreibungen und Schilderungen, die sie von der Vegetation der von ihnen bereisten Länder entwarfen, die andern, indem sie getrocknete oder lebende Pflanzen, Früchte, Samen und Zeichnungen mit nach Hause brachten, Materialien, die nach ihrer Rückkehr von ihnen selbst oder von europäischen Gelehrten bearbeitet wurden.

Während diese unermüdlichen Vorkämpfer der Wissenschaft tausend Gefahren, tausend Widerwärtigkeiten und Beschwerden trotzten, um ferne und unbekannte Gegenden zu erforschen, war Europa der Schauplatz einer andern Art von Untersuchungen, die allerdings weniger glänzend, doch nicht minder gewinnreich für die Wissenschaft waren. Botaniker ließen sich angelegen sein, die Vegetation eines Landes, einer Insel, einer Provinz, ja selbst der Umgegend einer Stadt gründlich kennen zu lernen. Sie bemühten sich, sämmtliche Pflanzen, welche daselbst wild wachsen, zu sammeln, dabei die Standpunkte, wo sie sich finden, ihre Ausdehnung nach Norden, Süden, Westen oder Osten bemerkend; sie unterschieden die einheimischen Pflanzen von den eingeführten, die dem Lande eigenthümlichen Arten von denen, welche ihnen mit andern entfernten oder angrenzenden Gegenden gemein sind. Die Pflanzenzonen, welche sich an den Abhängen der Gebirge Schottlands oder Skandinaviens, der Alpen, Pyrenäen, Apenninen, des Aetna, der Sierra Nevada von Spanien über einander lagern, wurden sorgfältig mit Hülfe des Barometers bestimmt. Bis über die Grenzen des ewigen Schnees hinaus verfolgte man die letzten Spuren der schwindenden Vegetation. Auf der andern Seite brachten Franklin, Roß

und Parry von den Polarländern die bescheidenen Blumen mit, welche ein zweimonatlicher eben so kalter Sommer wie der Winter von Paris ist, auf den äußersten Eilanden von Spitzbergen und hinten in der Baffinsbai zur Entfaltung bringt. Die Botaniker sahen voll Staunen und Verwunderung gewisse Arten, welche gleichmäßig die Wärme fürchten, am Strande des Eismeeres und an der Grenze des ewigen Schnees, in den Alpen, den Pyrenäen, dem Kaukasus und der Sierra Nevada fortkommen.

Der Einfluß des Bodens auf den Pflanzenwuchs, diese Lebensfrage des Ackerbaues, ward von den Botanikern, den Chemikern und den Geologen in Betracht gezogen, sie suchten den Antheil der physischen Beschaffenheit der Erdarten, ihrer Aggregationsweise, ihrer Dichtigkeit, ihrer Durchdringlichkeit zu bestimmen, andere wandten ihr Augenmerk der chemischen Mischung des Bodens zu, welche sie als überwiegend betrachteten. Endlich fanden Philologen und Gelehrte in den ältesten Werken der Hindus, Chinesen und Juden die Namen und zuweilen die Beschreibung der dazumal bekannten Pflanzen wieder, woraus sie das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein dieser Arten in gewissen Gegenden seit den fernsten Zeiten, deren die Geschichte Erwähnung thut, ableiteten.

Diese gehäuften Nachforschungen haben alle die gegenwärtige Pflanzengeographie, mit jener Gesammtheit von Begriffen und Grundsätzen, wie sie Herr Alphonse de Candolle in einem neuern Werke zusammenfaßt, gebildet. Indem wir mit ihm die letzten Arbeiten der Botaniker zergliedern, werden wir die Grenze zu ziehen vermögen, welche die heutige Wissenschaft von den genialen, aber lückenhaften Versuchen der Schöpfer der Pflanzengeographie scheidet. Am Ende dieses Jahrhunderts, wenn die Vegetation der gesammten Welt erst noch besser bekannt, wenn die Geographie, die Meteorologie, die physische

Digitized by Google

Geographie, die Geologie noch weiter vorgeschritten sein werden, wird das Jahr, in dem ich schreibe, seinerseits möglicher Weise als Grenze für den Abschnitt dienen, wo die Wissenschaft des 20sten Jahrhunderts beginnt. Die ersten Anstrengungen der Gründer der Pflanzengeographie, ihre Arbeiten, ihre Reisen werden alsdann dem wissenschaftlichen Publikum unbekannt und nur noch einigen Gelehrten bekannt sein, gerade wie die Grundmauern eines antiken Gebäudes, welche in der Tiefe der Erde verborgen liegen, nur dann und wann von einem für seine Kunst begeisterten Architekten durchwühlt werden, während Jedermann den sichtbaren Theil bewundert, dem sie als Basis dienen, und der ohne sie dem ersten Anstoß von Seiten des Menschen oder der Zeit gewichen sein würde.

2. Pflanzenstatistik. — Verschiedene Einflüsse, welche die Vertheilung der Pflanzen auf der Erdoberfläche bestimmen.

Wie hoch beläuft sich die Gesammtzahl der auf der Oberfläche des Erdballs verbreiteten Arten? Die Antwort ist schwierig. Viele Gegenden sind bis jetzt noch nicht erforscht, andere kaum, und selbst in den am meisten untersuchten Ländern entdeckt man alljährlich neue Pflanzen. Nun läßt sich die Gesammtzahl der vorhandenen Arten wohl nur aus der der bekannten Arten ableiten. Die Schätzungen der Naturforscher sind daher nothwendig in dem Maße abgewichen, als das Verzeichniß des Pflanzenreichthums auf der Erde angewachsen ist. Im Jahre 1753 kannte Linné 6000 Arten, im Jahre 1807 zählte Persoon deren 26,000, im Jahre 1824 gab Steudel die Zahl der Arten auf 50,000 und im Jahre 1844 auf 95,000 an. Wir übertreiben keineswegs, wenn wir behaupten, daß die Bücher und Herbarien gegenwärtig etwa 120,000 enthalten.

Digitized by Google

Von der Zahl der beschriebenen Arten haben die Botaniker nach einander Schlüsse auf die Gesammtzahl der vorhandenen Arten gezogen. Im Jahre 1820 schätzte sie de Candolle auf 110,000 bis 120,000. Sechszehn Jahre später nahm Meyen, ohne der Uebertreibung beschuldigt werden zu können, sie zu wenigstens 200,000 an. Durch geistreiche Berechnung des von einer bestimmten Art auf dem Erdboden eingenommenen Raumes beweist uns Herr Alphonse de Candolle im Jahre 1856, daß diese Zahl nicht gut unter 400,000 bis 500,000 betragen könne, eine Ziffer, die vollkommen im Einklang mit der beständig wachsenden Anzahl neu hinzukommender Pflanzen steht, welche die Reisenden aus allen Theilen der Welt zusammenbringen. Welch ein Feld für die menschliche Wißbegierde, welche Herausforderung aber auch für die hartnäckigste Arbeit, unterstützt von dem glücklichsten Gedächtnisse!

Das Pflanzenreich scheidet sich naturgemäß in zwei große Zweige: phanerogamische Gewächse, d. h. solche, welche sichtbare Blüthen tragen und im Augenblicke der Befruchtung Keimblätter oder Samenläppchen, Kotyledonen genannt, zeigen. Daher der Name kotyledonische Gewächse, welchen Jussieu ihnen beigelegt hat. Sämmtliche Bäume, sämmtliche Stauden und die große Mehrzahl der Kräuterpflanzen gehören diesem Zweige an. Die Farne, Moose, Flechten, Schwämme, alle jene niedrigen blüthenlosen Gewächse, die größtentheils eine unvollkommene Skizze der Natur zu sein scheinen, gehören zum zweiten Zweige. Bei diesen unvollkommenen Gewächsen sind die Blüthen vorhanden, doch versteckt, woher sie den Namen Kryptogamen haben. Sie keimen alle ohne Samenlappen oder Kotyledonen. Daher der Name Akotyledonen, den sie von Jussieu erhalten haben.

Der erste Zweig, der der kotyledonischen Gewächse, zerfällt seinerseits in zwei große Klassen: die dikotyledonischen

Gewächse, welche mit zwei Samenlappen oder Kotyledonen keimen (diese Klasse umfaßt sämmtliche Bäume und Stauden Europas, sowie die Mehrzahl der Kräuterpflanzen sämmtlicher Regionen), sodann die Monokotyledonen, die im Augenblicke, wo sie aus der Erde hervorkommen, nur einen Samenlappen zeigen. Dieser Klasse gehören die Palmen der Tropengegenden, unsere Zwiebelgewächse, wie Lilien und Tulpen, die Gräser, unter anderen die Cerealien und diejenigen Kräuter, welche den Grundstock der Wiesen bilden, endlich die Binsen und Rohrpflanzen unserer Sümpfe und Moräste an.

Diese Klassen zerfallen wieder in Familien, die durch die Vereinigung von Pflanzen gebildet werden, welche in der Bildung ihres Samens, ihrer Frucht und der verschiedenen Theile ihrer Blüthe einander ähnlich sind. Die Familie der Malvaceen besteht aus allen der Malve ähnlichen Pflanzen, wie dem Eibisch, der Zitterrose, der Baumwollenstaude u. s. w. Die Familie spaltet sich in Gattungen oder Vereine von Arten, welche nur noch durch untergeordnete Merkmale von geringerer Bedeutung als diejenigen, welche die Familien unterscheiden, von einander abweichen. So unterscheiden sich bei dem angeführten Beispiele die Arten, welche der Gattung Baumwollenstaude angehören, von denen der Gattung Malve durch den Bau der Frucht und des Samens. Bei der Baumwollenstaude ist der Same von jenen Härchen umgeben, woraus der menschliche Gewerbfleiß so großen Nutzen zieht, der Same der Malve ist davon entblößt. Die Gattung endlich besteht aus Arten, d. h. aus Pflanzen, die sich einander sehr ähnlich sind, so daß ein wenig geübtes Auge sie zuweilen unter ein und demselben Namen mit einander verwechselt, die der Botaniker aber an zuweilen unbedeutenden, immer aber unveränderlichen Merkmalen zu unterscheiden weiß. Die Species selbst umfaßt sämmtliche Individuen, welche unter sich gleich sind, oder sich nur

Digitized by Google

durch Nüancen unterscheiden, welche vom Boden, vom Klima, von der Kultur abhängen, und verschwinden, sobald die Individuen in andere Umstände versetzt, oder entgegengesetzten Einflüssen unterworfen werden.

Möge man mir diese etwas trockenen, aber für das Verständniß dieses Studiums unerläßlichen Definitionen verzeihen. Sollte es mir nicht gelungen sein, mich verständlich zu machen, so wird ein Gleichniß Alles klar machen. Das Pflanzenreich ist eine Armee, die Zweige sind die verschiedenen Korps, woraus sie besteht, die Klassen die Infanterie, die Kavallerie, die Artillerie, das Genie, die Familien die Regimenter, die Gattungen die Bataillone, die Arten die Kompagnien, bestehend aus den Individuen, welche sich sämmtlich an Größe, Uniform und Bewaffnung gleichen.

Wir sagten, daß man im Jahre 1844 95,000 Arten gekannt habe; unter diesen sind 80,000 Phanerogamen oder Kotyledonen, 15,000 Kryptogamen oder Akotyledonen. Unter den Kotyledonen gehören 65,000 den Dikotyledonen, 15,000 den Monokotyledonen an. So ist das Büdget der Erdflora beschaffen, das Zahlenverhältniß der diesen großen Theilen des Pflanzenreiches angehörenden Arten aber schwankt je nach den verschiedenen Zonen des Erdballs. Je mehr man nach Norden vordringt, desto mehr nimmt die Zahl der Kryptogamen, je mehr man sich dem Aequator nähert, die der Phanerogamen zu. In den kalten oder gemäßigten Zonen sind die Kryptogamen niedrige Gewächse, die sich kaum über die Oberfläche des Bodens erheben, in den heißen Gegenden der Tropen scheinen zierliche baumartige Farne, wie Palmen hoch, die Macht der Sonne zu verkünden, welche die Pflanzenformen vergrößert und veredelt.

Das Verhältniß der Monokotyledonen zu den Dikotyledonen ist gleich dem der vorigen von Humboldt festgesetzt worden. Das Verhältniß der Monokotyledonen nimmt in der

Digitized by Google

Richtung vom Aequator zum Pole zu. So ist es in der tropischen Zone wie 1:6 beschaffen, d. h. auf 7 Pflanzen kommt nur Ein Monokotyledon; in der gemäßigten Zone steigt es auf 1:4 und in den kalten Regionen auf 1:3, indem der Botaniker dort Aussicht hat, auf je vier Pflanzen Ein Monokotyledon anzutreffen. Diese Gesetze treffen aber nur im Allgemeinen zu. Betrachtet man besondere Länder, so findet man sie in der einen oder anderen Richtung verändert. Auf Spitzbergen z. B. zähle ich 93 Phanerogamen, nämlich 66 Dikotyledonen und 27 Monokotyledonen, was, wie man sieht, ein Verhältniß bildet wie 3,4:1. Auf der Insel Melville, im Hintergrunde der Baffinsbai, bei einem noch rauheren Klima, gestaltet sich das Verhältniß wie 1:2, d. h. wie das Einfache zum Doppelten; dasselbe ist der Fall auf Island, den Färöerinseln und auf der andern Erdhälfte, auf den Malvinen. Ein physisches Element, die Feuchtigkeit, bewirkt eine Zunahme der relativen Zahl der Monokotyledonen und eine Verminderung der Dikotyledonen.

Wollten wir diesen Gegenstand erschöpfen, so müßten wir untersuchen, in welchem Verhältniß die verschiedenen Familien des Pflanzenreichs, wie Gräser, Schoten- und Doldengewächse zur Gesammtheit der Flora eines Landes stehen, und würden sodann die Vertheilung der Gattungen, ihre bezügliche Zahl, wie auch den Flächenraum, den sie auf dem Erdball einnehmem, untersuchen; diese Untersuchung würde aber speziellere Kenntnisse voraussetzen, als sie sich bei den meisten Lesern finden. Wir gehen daher ohne weiteres zur Analyse der physischen Kräfte über, welche die Vertheilung der Gewächse auf der Oberfläche des Erdballs bestimmen.

Es giebt nichts Mannichfaltigeres und Verwickelteres, als den Einfluß dieser physischen Kräfte, welche sich gegenseitig unterstützen, modifiziren oder aufheben. Die dunkle Wärme wirkt nicht wie die von Licht begleitete Wärme, eine feuchte

Digitized by Google

Wärme bringt Wirkungen hervor, welche denen der trockenen Wärme geradezu entgegengesetzt sind. Prüfen wir also diese verschiedenen Elemente jedes für sich.

Das Wachsthum einer jeden Art entspricht einem bestimmten Abschnitte der thermometrischen Skala. Unter einem gewissen Kältegrade kommt die Pflanze um, ebenso stirbt sie, wenn das Thermometer einen gewissen Wärmegrad übersteigt, sie gedeiht nur innerhalb fester und unwandelbarer Temperaturgrenzen. Diese thermometrische Skala ist bei weitem nicht für alle Pflanzen ein und dieselbe, das Pflanzenreich bietet in dieser Beziehung unendliche Verschiedenheiten dar. Die Lärche, die Zwergbirke halten eine Kälte von 40 Graden unter Null aus, die das Quecksilber zum Gefrieren bringen, während eine große Anzahl von Palmen, tropischen Orchideen oder baumartigen Farnen erliegen, wenn das Thermometer noch 10 Grad über Null anzeigt. Es giebt Pflanzen, welche auf dem Sande der afrikanischen Wüsten wachsen, dessen Hitze oft 60 bis 80 Grad C. erreicht, während nordische oder Alpenpflanzen verwelken, wenn das Thermometer sich mehrere Tage lang auf 10 Grad über Null hält. Doch ist noch ein anderer wichtiger thermometrischer Punkt in Betracht zu ziehen, der nämlich, wo eine jede Art ins Wachsthum zu treten beginnt. Allerdings vermögen Pflanzen eine Kälte von 15 Graden unter Null auszuhalten und geben doch nicht eher Lebenszeichen von sich, als bis das Thermometer 6 darüber zeigt. Welcher Freund der Berge hätte nicht mit Entzücken die Saxifragen und Soldanellen in Blüthe gesehen, benetzt von dem Wasser, das von den ewigen, weithinschimmernden Schneegefilden der Alpen herabrieselt. Dies Wasser nun besitzt eine nur um wenige Zehntel Null übersteigende Temperatur, während die der Luft nicht über 5 oder 6 Grade beträgt. Ich habe die Dattelblume (Soldanella alpina) selbst unter Schneehöhlen, die von allen Seiten fest verschlossen

Digitized by Google

waren, gefunden. In dieſen Höhlungen iſt die Temperatur der Luft wie des Waſſers nothwendig gleich Null, und doch iſt dieſe niedrige Temperatur genügend, die Dattelblume keimen und blühen zu laſſen. Andererſeits ſind die Kokospalmen und die Pflanzen der heißen Zone unempfindlich gegen Temperaturen, die nicht 15 oder 20 Grade erreichen. Jedes Frühjahr haben wir den Beweis für dieſe lange verkannten Wahrheiten vor uns. Wir ſehen die Pflanzen unſerer Gärten nach einander zum Treiben gelangen, ſobald das Thermometer bis zu dem Grade ſteigt, wo die Wärme ſich wirkſam auf ihre Lebenskraft äußert. Jede Art hat alſo ihr beſonderes Thermometer, deſſen Nullpunkt der niedrigſten Temperatur entſpricht, bei der ihr Wachsthum noch möglich iſt. Dieſer Nullpunkt ſteht aber immer über dem unſerer Thermometer, welcher der Temperatur des ſchmelzenden Eiſes entſpricht.

Iſt die Pflanze einmal im Treiben begriffen, welche Wärme iſt alsdann erforderlich, um die Entfaltung der Blumen und das Reifen der Früchte herbeizuführen? Lange glaubte man, daß man zur Löſung dieſer Frage gelangen würde, wenn man die mittlere Wärme des Frühlings, Sommers, Herbſtes oder der zwölf Monate des Jahres in verſchiedenen Ländern mit einander vergliche. Wenn man, hieß es, in den Gärten von Nordfrankreich nicht die Akazie Konſtantinopels, die Aloe Merikos, das Nelumbium oder die Lagerstroemia Indiens bewundert, ſo rührt dies daher, daß die Sommer nicht heiß genug ſind, um die Entfaltung ihrer Blüthen herbeizuführen, welche im Süden Europas niemals ausbleibt. Wenn man den Weinſtock im Weſten Frankreichs und im Norden der Vendée nicht anbaut, ſo rührt dies, meinte man, daher, daß die Temperatur des Sommers und des Monats September zu niedrig iſt, um die Trauben zur Reife zu bringen, denn an den Ufern des Rheins und der Moſel, wo man vortreffliche Sorten ge-

Digitized by Google

winnt, ſind die Winter ſtrenger als in der Bretagne und in der Normandie, dagegen ſind die Sommer daſelbſt viel heißer. Annähernd erklärt die Wärme der Jahreszeiten allerdings den Unterſchied der Vegetation in Gegenden mit entgegengeſetzten Klimaten, dieſe Grundſätze verſagen aber, ſobald man ſie ſtreng auf ein beſonderes Gewächs anwenden will. Nehmen wir z. B. diejenige Getreidepflanze, welche ſich am weiteſten nach Norden erſtreckt, die kultivirte Gerſte. Ehemals glaubte man, daß die Kultur der Gerſte da aufhöre, wo die Sommerwärme nicht hinreiche, das Korn zur Reife zu bringen; aber wenn man ſo urtheilt, findet man, daß die Gerſte noch in Ländern reift, wo die Sommer eine ſehr verſchiedene Temperatur beſitzen, und nicht mehr in andern reift, wo ſie höher als in erſteren ſteigt. So beträgt auf den Färöerinſeln (62° n. Br.), der äußerſten Grenze der Gerſtenkultur unter dem Meridian der britiſchen Inſeln, die mittlere Sommertemperatur 12°1. Zu Alten in Lappland (70° n. Br.) beträgt dies Mittel 10° 0, und zu Jakutsk in Sibirien (62° n. Br.) ſteigt ſie bis zu 16°0. Herr Kupffer hat den Einfluß der Temperaturen und der Regengüſſe des Frühlings und des Herbſtes hervorgehoben, welche das Keimen verzögern oder beſchleunigen, das Reifen des Kornes begünſtigen oder verhindern. Wir ſelbſt haben gezeigt, daß die beſtändige Gegenwart der Sonne über dem Horizont unter dem 70. Breitegrade die geringere Sommerwärme aufwiegt. Außerdem hat man die Tage mit bedecktem und mit heiterm Himmel zuſammen gerechnet, allein trotz all dieſer Betrachtungen gelangt man doch nicht zu völlig übereinſtimmenden Zahlen. Man fragt ſich immer, warum die Gerſte auf den Färöerinſeln und in Lappland, aber nicht in Sibirien reift, wo die Sommer wärmer ſind. Will man zu einer befriedigenden Uebereinſtimmung gelangen, ſo muß man zu der von Réaumur angezeigten und ſeitdem von den Herren Bouſſingault, Quetelet, Gasparin und

Digitized by Google

Alphonſe de Candolle angewandten Methode, der Wärmeſummen greifen. Verſtändigen wir uns. Das Keimen der Gerſte beginnt, wenn das Thermometer 5 Grade C. überſteigt; man wird alſo ſämmtliche unter dieſem Grade bleibende Temperaturen nicht in Rechnung ziehen, ſondern die mittleren Temperaturen eines jeden Tages, an dem das Thermometer fünf Grade überſteigt, zuſammen addiren und auf dieſe Weiſe die Summe der angehäuften Wärme erhalten, welche nöthig iſt, um die Gerſte alle Phaſen ihres Wachsthums vom Keimen bis zur Kornreife durchlaufen zu laſſen. Nun iſt es im Grunde vernünftig, die Wirkung der Wärme auf eine Pflanze mit derjenigen zu vergleichen, welche ſie auf die unorganiſchen Körper hervorbringt. Damit das in einem Gefäße enthaltene Waſſer zum Sieden gelange, muß ſich gleichfalls eine gewiſſe Menge von Wärme anſammeln, welche dieſes Waſſer zur Temperatur von 100 Graden bringt. So verfahrend, beweiſt Herr Alphonſe de Candolle, daß in den hohen Breiten die Gerſte reift, wenn ſie eine Wärmeſumme von 1800 Graden empfängt, mögen die Mittel von Frühling, Sommer und Herbſt übrigens ſein, welche ſie wollen.

Der Weizen fängt an zu wachſen, wenn die Temperatur 6 Grade über Null erreicht. In Mitteljahren beobachtet man dieſes Mittel zu Orange den 1. März, zu Paris den 20. März, zu Upſala den 20. April. Damit das Korn zur Reife gedeihe, bedarf es einer Wärmeſumme von etwa 2000 Graden; dieſe Summe iſt meiſt erreicht und man erntet demgemäß im allgemeinen zu Orange den 25. Juni, zu Paris den 1. Auguſt und erſt den 20. Aug. zu Upſala. Der Mais erfordert zum Reifen eine Summe von 2500 Graden von 13 Graden an gerechnet, der Weinſtock, wenn er ein trinkbares Gewächs liefern ſoll, 2900 Grade von dem Tage an gerechnet, wo das Mittel 10 Grade im Schatten beträgt. Beobachtungen für die Tropengewächſe mangeln uns, doch iſt

Digitized by Google

es wahrscheinlich, daß mindestens 6000 Grade erforderlich sind, damit der Dattelbaum zuckersüße Früchte liefere. Die Kokospalme, der Muskatbaum erfordern noch höhere Summen. Da die Natur aber gewollt hat, daß auch die kältesten Regionen ihren Schmuck besäßen, so begnügen sich die Alpen- und Polarpflanzen, um ihre Blätter und Blüthen zu entwickeln, mit 50 bis 300 Graden. Nun begreift man, warum gewisse Pflanzen in einem Lande leben, ohne Blüthen zu treiben, andere, ohne Früchte zu tragen, nämlich, weil die Wärmesumme, welche genügt, um ihre Blätter zu entwickeln, nicht auch genügt, um ihre Blüthen zur Entfaltung, noch weniger um ihre Früchte zur Reife zu bringen.

Der Einfluß der Temperatur auf die Vegetation ist so groß, daß sich kaum einige kosmopolitische Arten anführen lassen; die meisten bewohnen eine bestimmte Zone; die Kälte hindert sie, dieselbe nordwärts, die Wärme, südwärts zu überschreiten, alle haben eine Polar- und eine Tropengrenze. Nehmen wir z. B. die Waldbäume. Des Holzes wegen, das sie der Industrie liefern, geschont, ist ihre Polargrenze der Punkt, wo sie die Strenge des Winters nicht mehr zu ertragen vermögen, ihre Tropengrenze die, wo Hitze und Trockenheit zu stark sind, um sich derselben anzupassen. Herr Schouw hat diese Polargrenzen auf einer Karte von Europa gezogen. Von Süden nach Norden zugehend, sieht man erst die Korkeiche, dann den Lorbeer, die Myrte, die italienische Pinie und die Cypresse, sodann den Kastanienbaum, die Buche und die Eiche, die Fichte, endlich die Kiefer, die Lärche und die Birke verschwinden, welche letztere im westlichen Europa bis zum Nordkap hinaufgeht. Die Trockenheit hindert die Bäume noch mehr als die Wärme an ihrer Ausdehnung gen Süden; sie ist es, welche die Buche von den Ebenen des mittäglichen Frankreichs, Spaniens,

Digitized by Google

Italiens, Griechenlands und von den Küsten des Schwarzen Meeres verbannt.

Diese Thatsachen führen uns ganz natürlich darauf hin, den Einfluß der Feuchtigkeit auf die geographische Vertheilung der Gewächse zu betrachten. Das Wasser ist in der Luft in mehren Zuständen vorhanden: 1) im Zustande von unsichtbarem Dampf, 2) unter der Form von Nebel, Thau, Regen und Schnee. Die warme und feuchte Luft ist dem Wachsthum gemeiniglich günstig, die kalte und trockene nachtheilig. Zu häufige Nebel fangen die Sonnenwärme und das Sonnenlicht auf, rufen die Entwickelung der Schmarotzergewächse hervor und sind den meisten Pflanzen feind; ihr Einfluß beschränkt sich auf die kalten Gegenden. Die Häufigkeit und Vertheilung des Regens in den verschiedenen Jahreszeiten aber hat auf die Vertheilung der Pflanzen in allen Zonen einen eben so entschiedenen Einfluß, als die Temperatur. Die regenlosen Sommer der Mittelmeerregion und des östlichen Europas hindern die Gewächse an ihrer Ausdehnung nach Süden, wir haben die Buche, die normännische Fichte, den Spindelbaum angeführt; eine große Anzahl einjähriger Arten befindet sich im gleichen Falle. Man begreift in der That, daß diese Pflanzen sich in einer Gegend nicht halten, wenn ihr Keimen im Frühjahr nicht durch Regengüsse hervorgerufen wird oder auch wenn sie auf dem Halm vertrocknen, bevor sie ihre Körner zur Reife gebracht haben.

Reichlicher Schnee ist nie ein Hinderniß für die Ausdehnung einer Pflanze. Wie ein Mantel schützt er sie gegen die Winterkälte, die Frühjahrsfröste und durchdringt den Boden mit einer heilsamen Feuchtigkeit. Wenn der Schnee eine Menge Gewächse vor der Kälte des Nordens bewahrt, so erhält der Thau die meisten der im Süden wachsenden während der langen Sommerdürren; jeden Morgen bedeckt sich die von der Nachtfrische abgekühlte Pflanze mit Wassertröpfchen, häufig denen

Digitized by Google

eines leichten Regenschauers vergleichbar, worauf sie von neuem dem Sonnenbrande trotzen kann. Die Sahara würde vollständig von Pflanzenwuchs entblößt sein, wenn der Thau ihren niedrigen Gewächsen nicht die geringe Wassermenge, welche zu ihrer Erhaltung erforderlich ist, verschaffte. Herr Alphonse de Candolle hat vollständig nachgewiesen, wie diese verschiedenen Ursachen, die Temperatur und die Feuchtigkeit unter all ihren verschiedenen Formen, vereint oder gesondert wirkend, die Ausdehnung gewisser Pflanzen nach Norden, Süden, Osten und Westen begrenzen und sie auf einen bestimmten Umkreis beschränken. Er hat eine gewisse Anzahl einjähriger, ausdauernder oder holziger Arten ausgesucht und für jede derselben sorgfältig die meteorologischen Umstände, welche die Wanderung derselben in der Richtung einer der vier Himmelsgegenden gehemmt haben, erörtert.

Man kann sich bei diesen Betrachtungen auf dem Gebiete der Pflanzengeographie auf das Studium eines einzigen Kontinents und zwar des kleinsten von allen, desjenigen, den wir bewohnen, beschränken; der Einfluß des Klimas macht sich auf die offenkundigste Weise fühlbar.

Man höre, mit welchen Worten Schouw die Gegensätze zwischen Norden und Süden Europas hervorhebt.

„Der südliche Theil dieser großen Halbinsel," sagt er, „ist gebirgig und hat durchaus keine ausgedehnten Ebenen; der Norden des Festlandes bietet zwei große Tiefebenen dar: die Deutschlands und Rußlands. Daher eine große Gleichförmigkeit der Landschaft und der Sitten, daher ein beträchtlicher Landhandel. Die Völkerschaften, welche diese ungeheuren Ebenen bedecken, kennen das Meer nicht und bleiben jeder seemännischen Beschäftigung fremd. Die ausgedehnteste und höchste Hochebene Europas findet sich im Süden, in Spanien, im Norden ist die hervorragendste die bairische. Die Alpen bilden die

Digitized by Google

höchste Bergkette. Im Süden sind die Gebirge höher als im Norden; so übertreffen die Sierra Nevada, der Aetna, die Apenninen und die Gipfel auf Korsika die Massive Skandinaviens und der Karpathen."

„Besteigt der Bewohner des Südens von Europa seine Gebirge, so trifft er das Klima und die Gewächse des Nordens an, während die südliche Natur den Bewohnern der nördlichen Theile des Kontinents unbekannt ist. Der Italiener und der Spanier begegnen auf der Mitte ihrer Bergabhänge den Buchen- und Haselnußwäldern, den Kornfeldern und Wiesen des Nordens, höher hinauf der Flora Lapplands und dem ewigen Schnee. Der Deutsche, Schwede und Russe aber kennen weder den Lorbeer, noch die Myrte, noch die immergrünen Wälder, noch die Olivenfelder, noch die Orangengärten, noch die milden Winter und die klare Luft der südlichen Gegenden.

„Da die Ebenen des Nordens von Europa weit entfernt vom Meere sind, während der Süden tief von demselben eingeschnitten ist, so schwindet der Gegensatz zwischen dem Klima des Orients und des Occidents, je mehr man sich dem Süden nähert. Im Norden genießen die Küsten und Inseln des Oceans ein äußerst mildes Klima; im Süden sind die oceanischen Küsten im Gegentheil weniger warm als die Mittelmeerufer. Der Temperaturunterschied zwischen Norden und Süden ist auffälliger im Winter als im Sommer; so ist der Winter Wiens im Durchschnitt 11 hunderttheilige Grade kälter als der Palermos, wogegen der Sommer Wiens nur 3 Grade weniger heiß als der Palermos ist. Der Wechsel von kalten Wintern und heißen Sommern, den man im Norden beobachtet, ist von glücklichem Einflusse auf die Pflanzenwelt; diese steht während mehrer Monate vollständig still, um mit erneuter Kraft und einer Rührigkeit wieder zu beginnen, welche durch die mit der Annäherung des Pols zunehmende Länge der Tage begünstigt wird.

Digitized by Google

Dieſer Unterſchied zwiſchen den Jahreszeiten leiht dem Frühling des Nordens einen Reiz, welcher im Süden wegfällt. Im Norden folgt den rauhen Winterſtürmen plötzlich eine laue Luft, Flüſſe und Seen thauen auf, die Schneedecke, welche auf der Erde laſtete, verſchwindet und enthüllt einen grünenden Teppich, Bäume und Sträucher treiben junge Blätter, die Vögel kommen wieder, und die Inſekten ſummen. Nichts dergleichen im Süden; der Uebergang iſt unmerklich, die Beſchäftigungen des Landmanns ſind nicht unterbrochen worden, denn er behackt ſeinen Weinſtock oder ſeine Oliven Winters ſo gut wie in den übrigen Jahreszeiten.

„Im Norden iſt der Regen faſt gleichmäßig auf die verſchiedenen Jahreszeiten vertheilt, im Süden ſind die Sommer trocken, und es regnet vornehmlich im Frühling und Herbſt.

„Dieſe Unterſchiede übertragen ſich auf die Vegetation. Im Süden giebt es eine größere Mannigfaltigkeit der Arten, namentlich unter den Bäumen und Sträuchern, tropiſche Formen, Schlinggewächſe, Zwiebelgewächſe oder wohlriechende Gewächſe, Wälder, aus Holzarten mit perennirenden Blättern beſtehend. Der Norden iſt ſtolz auf ſeine ſammetgleichen Wieſen und auf das friſche Grün ſeiner Wälder; daſſelbe erhält ſich ſelbſt im heißeſten Sommer, zu einer Jahreszeit, wo die Hitze die Fluren im Süden verſengt, welche von der Sonne mit jenen gelblichen Tönen gefärbt erſcheinen, deren Glanz ermüdend auf Augen wirkt, welche gewöhnt ſind, auf dem grünen Teppich der nördlichen Länder zu ruhen.

„Der Roggen iſt das charakteriſtiſche Getreide des Nordens, der Weizen das des Südens; mit Mais und Reis zuſammen bildet er die Hauptnahrung der Völker. Kartoffeln und Buchweizen werden im Süden ſelten gebaut. Bier iſt das Getränk des Nordländers, Wein das des Südländers. Die Weingrenze ſteigt höher als bis zum Hauptmaſſiv der Alpen hinauf, die

Digitized by Google

Linie aber, welche die Länder mit Butter von denen mit Oel trennt, fällt mit dieser natürlichen Scheidewand zusammen. Gemüse und Obst sind im südlichen Europa in Ueberfluß vorhanden; je mehr man sich dem Pole nähert, nimmt das Verhältniß derselben ab, daher einschneidende Unterschiede in der Ernährungsweise. Der Nordländer ißt schwarzes Brot, Butter, viel Fleisch und wenig Gemüse, der Südländer hat weißes Brot, Maiskuchen, Oel, viel Obst und Gemüse, verzehrt dagegen weniger Fleisch und trinkt gewöhnlich Wein, berauscht sich aber selten."

Entfernen wir uns von Europa, so werden wir mit Schouw einsehen, daß jedes Volk sozusagen seine charakteristische Pflanze hat, auf der seine Existenz und seine Civilisation beruhen.

„Unter dem schönen Himmel, dessen sich die Inseln des Stillen Ozeans erfreuen, zwischen den Tropen, bildet der Brotfruchtbaum (Artocarpus incisa) die Hauptnahrung der Bewohner Ozeaniens. Dieser schöne Baum trägt eine große Menge mehliger Früchte, deren Geschmack, wenn sie gekocht sind, vollkommen dem des Weizenbrotes gleicht. Drei solcher Bäume nähren einen Menschen acht Monate lang im Jahre, denn seine Früchte erneuern sich unaufhörlich. In den vier Monaten, wo der Baum unfruchtbar ist, essen die Ozeanier seine Früchte, in Erdlöchern aufbewahrt, wo sie eine Art von Gährung erleiden. Das Leben, sagt Cook, ist leicht auf diesen glücklichen Inseln, zehn Bäume genügen zum Unterhalt einer Familie, denn ihr Holz dient zum Bau von Kanoes und der Bast wird zum Weben von Kleidungsstücken verwandt. Ebenso spielt der Kokosbaum eine große Rolle auf den durch Korallen gebildeten Inseln. Der Stamm liefert das Holz, die Frucht, d. h. der mandelartig schmeckende Kern derselben, Oel und Milch, die holzige Umhüllung dient als Gefäß, die Fasern, welche dieselbe umgeben, lassen sich flechten, die Blätter werden benutzt, um die Hütten,

zu decken, die Endknospe wird gegessen und der Stamm liefert den Palmwein.

„Der Flachs Neuseelands (Phormium tenax) ist die charakteristische Pflanze dieses Inselmeeres; die langen Blätter desselben liefern eine zähe Faser, welche von den Eingeborenen zu allen ihren Bedürfnissen verwandt wird.

„Die Inseln des indischen Archipels wurden die Gewürzinseln genannt; dort wachsen der Gewürznelkenbaum, der Muskatbaum, der Pfeffer und der Ingwer.

„Der Mais, in Amerika zu Hause, ward namentlich in Peru kultivirt. Er reifte auf bedeutenden Höhen, selbst noch in der Nähe des Sonnentempels, der auf einer Insel des Sees Titicaca, 3915 Meter über dem Meere, erbaut war. Die Körner desselben wurden unter die Bevölkerung vertheilt, welche dieselben wie den köstlichsten Schatz betrachteten. Auch verdanken wir Amerika die Kartoffel, welche gleichfalls die eingeborene Bevölkerung ernährte.

„Vor der Ankunft der Europäer baute man auf den Hochebenen von Mexiko den Maguey (Agave potatorum). Diese Pflanze blüht in ihrem Heimatlande nur alle acht oder zehn Jahre. Im Augenblick wo der Schaft treiben muß, schneidet man ihn ab und sammelt dreimal des Tags einen Saft daraus, den man gähren läßt; dies ist der unter dem Namen Pulque bekannte Trank, den die Mexikaner den besten Weinen vorzogen. Die Aloefelder tragen gewöhnlich erst nach Verlauf von fünfzehn Jahren. Der Verbrauch der Pulque ist derartig, daß man ihn auf eine Million Piaster*) nur für die Städte Mexiko, Puebla und Toluca schätzt. Die Fasern einer andern Art (Agave americana) werden verwandt, um Stoffe daraus zu weben.

„Ueber der Zone, wo die Aloe wächst, höher noch als die der Gerste und des Roggens, nähren sich die Mexikaner von

*) Etwa 5,400,000 Francs.

Digitized by Google

den ſtärkemehlhaltigen Körnern des Chenopodium quinoa; man macht einen Brei daraus und eine Chokolate, Bergchokolate genannt.

„Das Daſein mehrer wilder Völkerſchaften iſt innig verknüpft, nicht mit kultivirten Pflanzen, ſondern mit wilden Gewächſen wie ſie ſelbſt. Während der Regenzeit werden die untern Gegenden des Orinokoſtromes, welche von den Guaraunos bewohnt werden, vollſtändig überſchwemmt, alsdann leben dieſe Wilden wie die Affen auf den Bäumen. Mehre Palmarten von der Gattung Mauritia genügen allen ihren Bedürfniſſen. Aus den Blattſtielen flechten ſie Hängematten, welche ſie von einem Baum zum andern aufhängen; ſeine Früchte eſſen ſie, bereiten aus ſeinem Saft einen Wein und aus ſeinem ſtärkemehlhaltigen, dem Sago ähnlichen Mark eine Art von Brot.

„Wenden wir unſere Blicke nach Afrika. Der nördliche Theil deſſelben bietet uns einen breiten, von Pflanzen entblößten Gürtel dar, die Dattelpalme dagegen gedeiht dort wunderbar. Im Süden der arabiſchen Halbinſel iſt der Kaffee die charakteriſtiſche Staude des Landes. Der Hindu lebt faſt ausſchließlich von Reis und verfertigt ſeine Kleider aus der Baumwolle, welche er baut. Eine ſchlechte Reisernte hat Hungersnoth im Gefolge. Die charakteriſtiſche Pflanze der Chineſen iſt nicht ſchwer zu errathen, es iſt der Thee, welcher das Bier, den Wein und den Branntwein Europas erſetzt. Die Völker, welche Europa und Weſtaſien einnehmen, gehören der indokaukaſiſchen Race an; Weizen, Roggen und Hafer bilden ihre Hauptnahrung, der ganze Ackerbau dieſer ungeheuren Länderſtrecken beruht auf drei Getreidearten. Der Oelbaum iſt das Sinnbild des mittelländiſchen Europa; er liefert ſowohl den fetten Stoff, ohne welchen jede Nahrung ungenügend iſt, als auch eine brennende Flüſſigkeit zur Beleuchtung. Der Weinſtock iſt gleichfalls das Erbtheil dieſer bevorzugten Zone. Der Lappe, von mongoliſcher Abkunft,

Digitized by Google

hat gar keine charakteristische Pflanze, man müßte denn die Flechte (Cenomyce rangiferina), welche seine Renthiere den Winter über ernährt, dafür ansehen.

„Wir haben soeben eine Skizze der ursprünglichen Vertheilung der Charakterpflanzen entworfen; Europa hat aber diese anfängliche Ordnung bedeutend verändert, es hat sich alle Pflanzen, welche in Europa gedeihen konnten, angeeignet, und der Handel führt ihm die Erzeugnisse derjenigen zu, welche es nicht zu naturalisiren vermochte. Seine Rolle besteht darin, mächtig zur Verbreitung der Nutzarten beizutragen und sie überall einzuführen, wo sie Aussicht haben zu gedeihen. Der Nordeuropäer namentlich hat sich erst Alles erwerben müssen. Der Kohl, die Möhre, die Rübe und der Spargel waren die einzigen einheimischen Nahrungspflanzen, die er überdies noch durch die Kultur hat vervollkommnen müssen, um ihren Umfang zu entwickeln und sie eßbar zu machen. Es ist dies ein Beweis für die geistige Ueberlegenheit und sittliche Kraft dieser Völkerschaften, sie haben zu Stande gebracht, was wir tagtäglich in der Welt vor sich gehen sehen, daß der intelligente Sohn eines armen Mannes sich im Schweiße seines Angesichts emporarbeitet und den reichen Erben überflügelt, der einen beträchtlichen Vorsprung vor ihm hatte."

Dieselben Ursachen, welche der Ausbreitung der Pflanzen nach Norden Schranken setzen, hemmen sie auch an den Abhängen der Gebirge. Der Botaniker, der vom Fuße der Alpen oder Pyrenäen ausgehend einen ihrer Gipfel erklimmt, durchschreitet Klimate, welche denen ähnlich sind, die er antreffen würde, wenn er ohne die Ebene zu verlassen sich nach Norden wendete. Je höher er kommt, desto mehr nimmt die Feuchtigkeit zu, die Nebel werden häufiger, die Temperatur fällt im Sommer äußerst rasch, im Winter langsamer, im Durchschnitt aber um einen Grad C. auf je 180 Meter senkrechter Erhebung.

Digitized by Google

Der Reisende trifft also ein analoges Klima an, sei es, daß er sich 180 Meter erhebt, sei es, daß er in den Ebenen Frankreichs um 22 Myriameter nach Norden vorrückt.*) Auch durchschreitet er ähnliche Pflanzenzonen. Am Fuße des Canigou z. B. bringt die Orange ihre Früchte in von Mauern umschlossenen Gärten zur Reife, dann passirt der Reisende Oliven- und Maisfelder, Gruppen von Steineichen und durch ihre Sorten berühmte Weingärten; in einer Höhe von 420 Meter aber verläßt ihn der Oelbaum, mit 550 Meter macht der Weinstock Halt, mit 800 Meter der Kastanienbaum, und mit 1320 Meter stößt man auf die ersten Rhododendren, deren Blüthenbüschel stets das Auge des Gebirgsfreundes entzücken, denn sie verkündigen ihm, daß er die reine Luft der Alpenregionen genießt. Die letzten Roggen- und Kartoffelfelder, welche der unermüdliche Katalonier noch an der äußersten Grenze, wo er auf eine Ernte hoffen darf, baut, gehen nicht über 1640 Meter hinaus. In dieser Höhe beschatten die Buche, die Silbertanne, die Kiefer, die Birke den Boden, ihre Höhe aber nimmt allmälig unter dem vereinten Einfluß der Kälte, des Windes und der Schneelast ab. Die Fichte endet bei 1950 Meter, die Birke bei 2000 Meter, die Kiefer erklimmt das Gebirge bis zu einer Höhe von 2430 Meter. Darüber dehnt sich ein aus Alpen- oder Polarpflanzen, welche den gemäßigten Regionen unbekannt sind, bestehender Rasenteppich aus. Das Rhododendron geht nicht über 2540 Meter hinaus. Nur der Wachholder, krüppelhaft, am Boden gelagert, steigt bis zum Gipfel an 2785 Meter empor, wo die Pflanzen neun Monate lang unter Schnee begraben schlummern und binnen drei Monaten wachsen, blühen und Früchte ansetzen. Diese auf dem Canigou von Herrn Aimé-Massot ge-

*) Als Grundlage meiner Berechnungen habe ich die mittlern Jahrestemperaturen von Toulouse, 12°1, und von Paris, 10°1, angenommen, als das jüngste nach gründlicher Untersuchung von Herrn Renou erlangte Resultat.

Digitized by Google

ſammelten Beobachtungen laſſen ſich auch auf die Alpen anwenden, nur ſieht man am Fuße derſelben weder die Orange, noch die Steineiche, noch den Oelbaum. Der Weinſtock ſteigt an den Abhängen derſelben eben ſo hoch wie in den Pyrenäen empor, das Gewächs aber, welches er hervorbringt, verräth zur Genüge den Unterſchied der Breiten und der Klimate. Nach dem Weinſtock kommt die Region der Kaſtanien, der Nußbäume, der Eichen und der Buchen, ſodann die der ſubalpinen Matten, berieſelt von unzähligen Bächen, welche von Eſchen und Erlen eingefaßt ſind. Höher hinauf beginnt die Region der immergrünen Bäume, des Vogelbeerbaums und der Bergerle. Darüber befindet ſich die Alpenwieſe, von Bäumen entblößt und bis zur Grenze des ewigen Schnees aufſteigend, deſſen Ränder, unter dem Einfluß der Sommerſonne ſchmelzend, abwärts eine ewige Friſche erhalten. Kaum iſt der Schnee verſchwunden, ſo erſetzt ihn der Raſen, und da die Sommerwärme mit jedem Jahre wechſelt, ſo ſieht man oft Kühe auf einem Abhange weiden, welcher in den vorhergehenden Jahren unter dem Schnee begraben war.

Die Reihenfolge der Gewächſe iſt in den verſchiedenen bisher unterſuchten Bergketten nicht dieſelbe. Bald ſteigt die Birke höher hinauf als die Kiefer oder die Fichte, bald findet das Gegentheil ſtatt. Die Buche läßt in den Pyrenäen den Elsbeerſtrauch hinter ſich, während ſie in den Tyroler Alpen von dieſem zurückgelaſſen wird. Die Richtung des Gebirges, die Neigung der Bergjoche, der durch Seitenketten gebotene Schutz, die gewöhnliche Richtung der Winde verändern die Grenzen der verſchiedenen Holzarten. So kommen auf dem Ventoux, einem vereinzelten Berggipfel, der ſich in der Rhôneebene erhebt, gewiſſe Arten nur auf dem Südabhange vor, während andere ſich nur auf dem nordwärts gekehrten Bergjoche finden. Die Buchen, Lavendeln, Wachholder erheben ſich zu geringerer Höhe

Digitized by Google

auf der nördlichen Abdachung als auf dem Südabhange; der durchschnittliche Unterschied beträgt 245 Meter. Auf dem Aetna, einem isolirten Gebirge wie der Ventoux, beträgt dieser Unterschied nach den Messungen Gemellaro's 350 Meter. Die südlichere Lage des Berges, die größere Kraft der Wärme und des Lichts, welche die Südseite des Vulkans treffen, erklären die Abweichung der in Frankreich und in Sicilien erhaltenen Resultate.

Die Kulturpflanzen stufen sich an den Seiten der Gebirge gleich den wildwachsenden Pflanzen ab; hier aber treten politische und soziale Elemente hinzu, um die klimatischen und geologischen Einflüsse zu verwirren. So geht in der penninischen Alpenkette, welche den Mont-Blanc mit dem Monte-Rosa verbindet, die Grenze der Kulturfelder am Nordabhange höher hinauf als am Südabhange. In meteorologischer Rücksicht müßte gerade das Gegentheil stattfinden, allein die Bevölkerung ist in der Schweiz dichter als in Piemont, auch ist sie rühriger, und der wallisische Bauer säet seinen Roggen oder seine Gerste bis zur äußersten Grenze, wo er in günstigen Jahren auf eine Ernte hoffen darf. In Europa ist diese Kulturleiter beschränkt, dehnt sich aber, sobald man sich dem Aequator nähert, aus. In Andalusien gedeihen bereits die Baumwollenstaude und das Zuckerrohr am Ufer des Meeres; die Dattel, die indische Feige, die Orange, die Korkeiche, die Olive, der Weinstock, die Nuß-, Maulbeer- und Kastanienbäume reihen sich an den Abhängen der Sierra Nevada von der Ebene bis zu einer Höhe von 1600 Meter über einander, die Getreidearten hören erst mit 2500 Meter auf, über dieser Grenze trifft man keine Kulturgewächse mehr an, sondern nur noch Matten.

Die ausgedehnteste Kulturleiter, welche es giebt, rollt sich an den Abhängen der Anden ab. Am Meeresstrande kultivirt man Zucker, Indigo, Kaffee, Bananen, höher hinauf Baum-

Digitized by Google

wolle, darüber Mais, Bataten und europäisches Getreide. Wallnüsse, Aepfel, Weizen und Gerste halten bei 3300 Meter inne, die Kartoffeln aber, der Ulluco und die knollige Kapuzinerkresse steigen bis zu 4000 Meter hinan; erst in dieser Höhe hören die Kulturpflanzen auf. Darüber liegen Triften, von Lamas, Schafen, Ochsen und Ziegen durchstreift. Die Grenze des ewigen Schnees beträgt 4800 Meter, die Höhe des Mont-Blanc in Europa. *)

Zu den Ursachen, welche die Vertheilung der Pflanzen auf dem Erdboden erklären und bestimmen, muß man noch den Einfluß der Sonne hinzurechnen. Gleich der Atmosphäre wirkt der Boden auf die Gewächse zunächst durch seine Temperatur ein. Gewisse Bodenarten erwärmen sich unter dem Einflusse der Sonnenstrahlen ungemein und erkälten sich darauf sehr schnell wieder. Andere erwärmen sich wenig und erkälten sich kaum. Daher sehr verschiedene Einwirkungen auf die Wurzeln und den untern Theil des Stengels. Je mehr man sich auf dem Hochgebirge erhebt, nimmt die relative Sonnenwärme, verglichen mit der der Luft, in stetiger Progression zu. Der Grund davon ist leicht einzusehen. Indem die Sonnenstrahlen die Atmosphäre durchdringen, geben sie einen Theil ihrer Wärme an dieselbe ab, folglich wird, je dünner die Luftschicht ist, desto geringer die Abnahme ihrer Wärme sein. Nun ist auf Gebirgen die atmosphärische Luftschicht um die ganze zwischen der Ebene und dem Gipfel des Gebirges liegende Höhe minder dicht, so daß die Sonnenstrahlen, welche sie treffen, eine geringere Wärme-

*) Wir bedauern, dem Leser nicht die schönen Tafeln mit Abbildungen, welche von Herrn Ed. Boissier in seinem Voyage botanique en Espagne herausgegeben sind, sowie das Tableau de la végétation des régions équinoxiales von Humboldt vorlegen zu können. Diese Tafeln sprechen eben so wohl zum Auge wie zum Geiste, und prägen dem Gedächtnisse das Bild der darauf dargestellten Pflanzenzonen ein.

Digitized by Google

menge eingebüßt haben werden als diejenigen, welche bis in die Ebene hinabſteigen. So war auf dem Faulhorn — einem Berge im Kanton Bern, 2680 Meter über dem Meeresſpiegel erhaben, die mittlere Temperatur des Bodens in einer Tiefe von 2 Decimeter an einem ſchönen Tage gleich dem Maximum derjenigen der Luft.*)

*) Auf eben dieſem Berggipfel ſind von Bravais, Peltier und mir ſelbſt zwei Reihen zweiſtündiger meteorologiſcher Beobachtungen zwiſchen dem 16. und 18. Auguſt 1842 und ſpäter zwiſchen dem 21. September und 2. Oktober 1844 angeſtellt worden. Die bei ſchönem und ſchlechtem Wetter, bei klarem oder bewölktem Himmel fortgeſetzten hundertfünfundzwanzig Beobachtungen der beiden Reihen ergeben für die Mitteltemperatur des Bodens zwiſchen 6 Uhr Morgens und 6 Uhr Abends 11°75, während die der Luft nur 5°40 betrug. Es ſtellte ſich klar heraus, daß die Erwärmung des Bodens zweimal ſo ſtark wie die der Luft war; doch wußten wir nicht, wie ſich während derſelben Zeit die bezügliche Erwärmung der Luft und des Bodens in der Schweizer Ebene verhalten hatte. Längſt ſchon wünſchte ich dieſe Lücke auszufüllen und feſtzuſtellen, wie ſich bei reinem Himmel und ruhiger Luft im ſelben phyſiſchen Augenblicke die bezügliche Erwärmung ein und derſelben Bodenart auf einem erhabenen Berggipfel und auf einer offenen Ebene verhalte. Bagnères-de-Bigorre und der Pic du Midi ſchienen mir alle wünſchenswerthen Bedingungen zur Anſtellung dieſer Unterſuchungen in ſich zu vereinigen Die horizontale Entfernung der beiden Punkte, nach der neuen Generalſtabskarte gemeſſen, beträgt nur 14,450 Meter. Beide Punkte liegen unter demſelben Meridian. Der Pic, vollkommen iſolirt von der Hauptkette der Pyrenäen, erhebt ſich 2877 Meter über dem Meere; dieſe Ziffer verdient völliges Vertrauen, da der Pic du Midi einer der Hauptpunkte der Triangulation iſt, welche als Grundlage für die neue Karte von Frankreich gedient hat. Andererſeits konnte ich mit einer einzigen Niveaulinie den Punkt, wo ich beobachtete, im Garten meines Freundes, des Doktors Coſtallat zu Bagnères, mit dem Generalnivellement der Eiſenbahnen Frankreichs verbinden. Dieſer Punkt befindet ſich 551 Meter über dem Spiegel des Ozeans. Der Niveauunterſchied der beiden Standpunkte beträgt demnach 2326 Meter. Ueberdies gehört das Thal von Bagnères keineswegs zu jenen engen Thälern, wo die Rückwerfung der Sonnenſtrahlen die Temperatur ſteigert, da die Breite deſſelben, auf dem Kamm der Abhänge, welche es von Morgen und Abend begrenzen, genommen, 2800 Meter erreicht. Man ſieht, daß es ſchwer halten würde, in den Alpen oder in den Pyrenäen zwei Stationen zu finden, die günſtiger zur Anſtellung der korreſpondirenden Beobachtungen, welche ich im Auge hatte, gelegen wären; ſie würden gar nicht zu vergleichen geweſen ſein, wenn man das eine Thermometer auf der natürlichen Bodenfläche des Berges,

Digitized by Google

Dieſe Bodenwärme in Verbindung mit der Stärke des Lichts und der fortwährenden vom Schmelzen des Schnees herrührenden Bewäſſerung erklärt uns die Mannichfaltigkeit und Lebhaftigkeit in den Farben der Alpenpflanzen; ſie werden von unten erwärmt wie die Pflanzen, welche wir auf Miſtbeeten oder in Gewächshäuſern ziehen. Die Wärme der Erde erſetzt die Unzulänglichkeit derjenigen der Luft.

Der Boden wirkt aber auf die Gewächſe nicht blos durch ſeine Temperatur ein, auch ſeine Kompaktheit oder ſein Desaggregatzuſtand, ſeine Härte, ſeine Dichte, ſeine Durchdringlichkeit, kurz ſeine phyſiſchen Eigenſchaften ſpielen eine Hauptrolle. Jedermann weiß, daß man nicht dieſelben Pflanzen auf Sand, auf Lehmboden oder auf kompaktem Felſen antrifft. Iſt dieſer Einfluß überwiegend, oder ſind die Pflanzen vielmehr gleich empfänglich für

---

das andere auf dem Boden im Garten des Herrn Coſtallat aufgeſtellt hätte. Damit die Unterſuchungen etwas bewieſen, mußte man die Erwärmung derſelben Erdart auf beiden Stationen beobachten. Ich wählte Dammerde, welche aus der Zerſetzung von Holz hervorgeht, das man in alten hohlen Weiden findet; es iſt dies eine Gewächserde, weil man oft Pflanzen wie Brombeeren, Geisblatt, Flieder u. ſ. w. kräftig daraus hervorſprießen ſieht, überdies iſt ſie gleichartig, mit ſich ſelbſt vergleichbar und leicht in jedem Lande zu erhalten. Das Mittel der Lufttemperaturen im Schatten während der zwanzig bei herrlichem Sonnenſcheine, klarem Himmel und ruhiger Luft angeſtellten Beobachtungen betrug zu Bagnères 22°3, auf dem Pic nur 10°1. Die mittlere Temperatur der Bodenfläche betrug zu Bagnères 36°1, auf dem Pic 33°8. Der mittlere Ueberſchuß der Bodentemperatur auf die der Luft auf den beiden Stationen verhält ſich demnach wie 10:17, d. h. er beträgt auf dem Gebirge faſt das Doppelte. Noch mehr: im Durchſchnitt war die abſolute Bodenerwärmung der Ebene der des Berggipfels um 2°3 überlegen, aber den 10. September von 10 bis 11 Uhr 30 M. war die Bodentemperatur auf dem Gipfelpunkte des Pic um 6°9 höher als die des Bodens zu Bagnères, obgleich das Mittel der Luft auf dieſem Punkte der Stadt 23°2, auf dem Pic du Midi 13°8 betrug. Bei 5 Centimeter Tiefe war die relative Erwärmung des Bodens dieſelbe. Dieſe Unterſuchungen ſetzen die bei weitem größere Wärmekraft der Sonne auf dem Gebirge als in der Ebene außer Zweifel.

Digitized by Google

die chemiſche Miſchung des Bodens? Erfordert die und die Pflanze, um fortzukommen, die Anweſenheit gewiſſer Beſtandtheile, als Potaſche, Kalk, Bitter- und Kieſelerde? Ueber dieſen Punkt ſind die Botaniker und Landwirthe verſchiedener Meinung. Ein Gelehrter, deſſen Verluſt die Schweiz noch lange ſchmerzlich empfinden wird, Thurmann, hat das Vorherrſchen der phyſiſchen Bedingungen behauptet. In dem kleinen Städtchen Pruntrut, inmitten der Kalkkette des Jura, nicht weit von den Vogeſen, welche granitiſch ſind, und der kleinen vulkaniſchen Gruppe des Kaiſerſtuhls wohnend, war es Thurmann aufgefallen, dieſelben Arten auf Bodenarten von ähnlicher phyſiſcher Miſchung wachſen zu ſehen, deren chemiſche Grundſtoffe hingegen gänzlich verſchieden waren. So traf er ein und dieſelben Pflanzen hier auf einer Kalkſteinböſchung, dort auf einem vulkaniſchen Gipfel oder einer Granitkuppe; andere kamen gleich gut auf Sand oder auf Erdfällen fort, die von ganz verſchiedenen Felsarten ſtammten.

Herr Henri Lecoq hat eine Menge derartiger Thatſachen in der Auvergne und auf dem Centralplateau von Frankreich angezeigt, wo ſich die verſchiedenſten Erdarten auf engem Raume vereint finden. Andererſeits haben die Herren Unger in Tyrol, Mohl in der Schweiz, Schnizlein und Frickhinger im Norden von Baiern und Herr Sendtner im Süden deſſelben Landes den Einfluß der chemiſchen Miſchung hervorgehoben. Herr Alphonſe de Candolle ſchloß, indem er alle dieſe partiellen Arbeiten zuſammenfaßte und dieſelben in entfernten Ländern beobachteten Arten mit einander verglich, auf das Vorherrſchen der phyſiſchen Beſchaffenheit als entſcheidende Bedingung für den Standort einer Pflanzenart, wiewohl gewiſſe Pflanzen eine auffallende Vorliebe für Bodenarten zeigen, welche gewiſſe Grundſtoffe enthalten. Die Kaſtanie, der rothe Fingerhut, der gemeine Ginſter lieben Kieſelerden, die ſtinkende Nieswurz, die Schwalben-

Digitized by Google

wurz, der große Enzian ziehen Kalkboden vor, im Allgemeinen aber werden sich die Gewächse, welche in einem Lande nie anders als in einer bestimmten Erde wachsen, anderwärts auf einem seinen Eigenschaften nach ähnlichen, seinen mineralischen Stoffen nach aber verschiedenen Boden zeigen. So wird der Botaniker, indem er innerhalb der engen Grenzen eines Departements botanisirt, eine Zeit lang an den chemischen Einfluß des Bodens glauben können, jedoch enttäuscht werden, wenn er den Kreis seiner Beobachtungen erweitert, um zu erkennen, ob die Spezies, welche er auf einer Felsart allein antraf, ihr beständig in allen Ländern treu bleibt. Herr Alphonse de Candolle hat von diesem Gesichtspunkte aus die 45 Arten, welche Mohl nur auf kieseligen Erdarten in der Schweiz und in Oestreich gefunden hatte, analysirt; nun wurden 19 davon in andern Klimaten denselben untreu. Von 67 dem Kalkstein eigenthümlichen Spezies sind 36 außerhalb der Schweiz auf Bodenarten ohne kohlensauren Kalk angetroffen worden. Von 43 Arten, welche Wahlenberg in den Karpathen nur auf Kalkfelsen angetroffen hatte, sah er 22 auf krystallinischem Gestein in der Schweiz und in Lappland wieder. Vermehrte und zweckmäßig geleitete Reisen würden die Zahl dieser ausschließlichen Arten noch vermindern.

Nur die Seegewächse machen eine Ausnahme von dieser Regel; zu ihrem Fortkommen ist das Salz unerläßlich, auch entfernen sie sich niemals vom Strande, doch findet man sie in vom Meere entfernten salzigen oder brackigen Gewässern sowie in der Nähe der Mineralquellen. Aus diesen Thatsachen ist der Schluß zu ziehen, daß die physischen Bedingungen einen überwiegenden Einfluß in Bezug auf die Landspezies ausüben, während das Vorkommen der Meerpflanzen an die Anwesenheit von Salzen gebunden ist, welche einen Theil der Mischung des Seewassers bilden; sie würden sich an Süßwasser nicht gewöhnen können, doch kommen die meisten recht

Digitized by Google

gut in einer Mischung von Süß- und Salzwasser, wie die der brackigen Gewässer der Lagunen, der Flußmündungen und Salzteiche fort.

3. Naturalisation und Akklimatisation der Pflanzen. — Erscheinen der Arten auf dem Erdboden.

Wir kennen nun die Gesetze, welchen die Vertheilung der Pflanzen auf dem Erdball unterworfen ist. Nachdem wir die Gesammtheit der Begriffe, auf denen die Pflanzengeographie beruht, zusammengefaßt haben, bleibt uns noch übrig, eine Vorstellung von dem Interesse der Fragen zu geben, zu deren Lösung sie uns behülflich sein kann und von denen die einen es mit den möglichen Anwendungen, die andern mit den Grundlagen der Wissenschaft selbst zu thun haben. Unter den erstern führen wir die Naturalisation, die Akklimatisation der Gewächse, unter den zweiten das Erscheinen der Arten auf der Oberfläche des Erdballs an.

Die männliche und weibliche Bevölkerung eines Landes besteht nicht allein aus den Eingeborenen und den Abkömmlingen von Familien, welche es seit mehren Jahrhunderten bewohnen; die verschiedensten Ereignisse führen auch Fremde herbei, welche sich daselbst niederlassen, naturalisiren und nach etlichen Generationen mit den Ureinwohnern der Gegend verschmelzen. Ebenso verhält es sich mit den Pflanzenvölkern. Eine Flora besteht aus einheimischen Pflanzen, die seit undenklichen Zeiten im Lande bekannt waren, und andern, welche allmälig durch die mannichfaltigsten Ursachen dort eingeführt wurden. Die Meeresströmungen, die Flüsse, die Winde, die Thiere tragen Samenkörner von Land zu Land, der Mensch aber ist es vornehmlich, der den absichtlichen oder unabsichtlichen Vermittler dieser Verführungen macht. Die Samen

Digitized by Google

von Getreidearten, die von Europa nach Amerika geſchickt wurden oder umgekehrt, haben in die Ernten der alten und der neuen Welt fremde Pflanzen eingeführt, deren Köner mit denen des Weizens, des Roggens oder der Gerſte vermiſcht waren. Oft gehen dieſe Samen, mit dem Getreide ausgeſäet, auf dem fernen Felde, wo der Zufall ſie hingeſtreut hatte, nicht auf, oft aber keimen ſie auch und erzeugen eine Pflanze. Wenn die neuen Bedingungen des Daſeins, worein ſie ſich verſetzt ſieht, ihr zuſagen, ſo lebt und vermehrt ſich die Pflanze. So ſind mehre Amaranthen und eins der gemeinſten Unkräuter in Frankreich, das Erigeron Kanadas, aus dieſem Lande mit Getreidekörnern zu uns herübergekommen. Umgekehrt haben die Landwirthe der Vereinigten Staaten in ihren Ernten die Hirtentaſche, Arten der Luzerne (Medicago), die weiße Goldblume, die gemeine Kreuzwurz ſich zeigen ſehen, alles gemeine Arten in den Kornfeldern Europas, in Amerika aber fremd.

Parke, Gärten, namentlich botaniſche Gärten, ſind Mittelpunkte der Naturaliſation.*) Die Pflanze verbreitet ſich erſt innerhalb des Gartenbezirks und vervielfältigt ſich daſelbſt, zögert aber nicht, denſelben zu überſchreiten und ſich draußen im Freien auszubreiten, wo ſie ſich bisweilen erhält. Bei Montpellier, an den Ufern des ſich ins Meer ergießenden kanaliſirten Lez, findet ſich ein kleiner Hafen, Port Juvénal genannt. Dort luden die Tartanen Jacques Coeur's im 15. Jahrhundert die koſtbaren Gewebe und wohlriechenden Stoffe des Morgenlandes aus, gegenwärtig trocknet man daſelbſt Wolle, die von den Handelsplätzen der Levante, des Schwarzen Meeres, Algeriens, von Buenos Ayres und andern Gegenden kommt. Dieſe

*) So haben ſich im botaniſchen Garten von Montpellier vierundzwanzig exotiſche Arten, d. h. aus Aſien, Afrika und Amerika ſtammende, von ſelbſt naturaliſirt.

Digitized by Google

Wolle ſitzt voll von Samen, welche ſich an das Fell der Schafe angehängt haben. Auf glühend heißen Kieſelſteinen ausgebreitet, die einen feuchten Boden bedecken, läßt ſie dieſe Samen fallen, welche zwiſchen den Steinen keimen, ſo daß der erſtaunte Pflanzenkenner alljährlich Gewächſe Aſiens, Afrikas oder Amerikas zum Vorſchein kommen ſieht. Herr Profeſſor Godron (von Nancy) und Herr Coſſon haben 475 Arten derſelben beſchrieben. Die Mehrzahl erhält ſich auf dem neuen Boden, wo der Zufall ſie hat entſtehen laſſen, nicht, ſie leben ein bis zwei Jahre und verſchwinden alsdann unwiederbringlich, einige aber haben ſich in der Umgegend von Montpellier verbreitet und naturaliſirt. Obgleich mehre ſehr allgemein ſind, andere ſich durch ihre Höhe bemerklich machen, ſo iſt doch keine in der von dem berühmten Magnol im Jahre 1686 herausgegebenen Flore de Montpellier beſchrieben, ein Beweis, daß ſie zu ſeiner Zeit in der Umgegend dieſer Stadt nicht vorhanden waren. Herr Hewett-Watſon hat es in ſeiner Cybele britannica unternommen, die fremden Gäſte, welche ſich mit der einheimiſchen Bevölkerung Großbritanniens vermiſcht haben, zu ſondern; er zählt im Ganzen 83 Arten derſelben auf, deren fremder Urſprung gewiß iſt, 10 kommen aus Amerika, die andern aus den benachbarten europäiſchen Gegenden, aus Aſien und aus Afrika. Frankreich beſitzt ihrer ſicher eine weit größere Anzahl, ſeine kontinentale Lage aber macht die Unterſuchungen ſchwieriger und die Schlüſſe unſicherer.

Einige Zahlen werden eine Vorſtellung von der Bedeutung dieſer Naturaliſation geben. Alle bleiben hinter der Wahrheit zurück, denn es hält ſehr ſchwer, hinterher das Erſcheinen einer ſeit mehren Jahrhunderten eingeführten Art feſtzuſtellen; doch haben ſich ſeit der Entdeckung Amerikas, die erſt 373 Jahre alt iſt, bereits 64 Pflanzen dieſes Kontinents von ſelbſt auf dem unſerigen vermehrt und verbreitet. Umgekehrt geben uns die

Digitized by Google

amerikaniſchen Pflanzenkenner 172 europäiſche in den Vereinigten Staaten und in Kanada naturaliſirte Arten an. Dieſer Austauſch iſt zu geringfügig, um den Charakter der Floren zu verändern, doch zeigt er uns, daß gewiſſe Gewächſe eine plaſtiſche Natur beſitzen, welche ſich an anſcheinend ziemlich abweichende Daſeinsbedingungen anſchmiegt. Dagegen gedeihen die meiſten unter einem fremden Himmel nur durch die Sorgfalt des Menſchen, ja ſie kommen um, wenn ſie nicht in das künſtliche Klima der Treib- und Gewächshäuſer verſetzt werden.

Die meiſten Nähr-, Nutz- oder Zierpflanzen, welche wir kultiviren, ſtammen aus fernen Gegenden. Das vom Himmel ſo begünſtigte Frankreich vermöchte, wenn es auf die Kultur der einheimiſchen Gewächſe beſchränkt würde, nicht den vierten Theil ſeiner Einwohner zu ernähren. Alle Getreidearten, Roggen und Hafer ausgenommen, alle Obſtbäume, den Birn- und Apfelbaum ausgenommen, kamen uns aus Mittelaſien. Amerika hat uns den Mais, die Kartoffel und den Taback gegeben. Obgleich ſeit Jahrhunderten kultivirt, ſind dieſe Arten doch in Europa nicht naturaliſirt, ſie breiten ſich nicht von ſelbſt und ohne Kultur aus. Nur die Sorgfalt des Menſchen vermag ſie fortzupflanzen. Sich ſelbſt überlaſſen, pflanzen ſich die Getreidearten nicht fort und verſchwinden, das Schnittobſt wird wieder herb, der Weinſtock artet aus. Es bedarf der ganzen Kunſt, der ganzen Sorgfalt des Landwirths, um dieſe koſtbaren Gewächſe, auf denen die ganze Exiſtenz der europäiſchen Völker beruht, zu erhalten und zu verbeſſern. Furchtbare Warnungen, wie die Kartoffelkrankheit und die des Weinſtocks, haben gezeigt, daß dieſe Pflanzeneroberungen, welche man für abgeſchloſſen hielt, nicht für ewig geſichert ſind. Eine Jahrhunderte lang fortgeſetzte Kultur, abnorme Vermehrungsarten, zu große Ueberfüllung derſelben Gewächſe auf beſchränktem Umkreiſe gehören vielleicht gleich den großen Menſchenüberfüllungen

Digitized by Google

zu den dauernden Urſachen zerſtörender Seuchen. Wie dem nun auch ſein möge, der Mahnruf iſt ergangen, und allſeitig hat man unter den exotiſchen Pflanzen nach Nährarten geſucht, die geeignet wären, diejenigen zu erſetzen, deren Verluſt wenn nicht wahrſcheinlich, doch möglich iſt. Dieſes Suchen iſt ein vernünftiges und wird von Erfolg gekrönt werden. Da faſt alle unſere Nutzpflanzen aus jenem ungeheuren Kontinent Aſien, von dem wir nur erſt den Saum kennen, herkommen und die Hälfte aller Pflanzen des Erdballs noch unbekannt iſt, ſo leuchtet es ein, daß wir unter den von andern Völkern angebauten Arten, ja ſelbſt unter den wildwachſenden Pflanzen, neue Nahrungspflanzen entdecken werden. Man kann der Verſuche alſo nicht genug anſtellen, unter vielen werden einige gelingen; doch muß man ſich vor Täuſchungen hüten, von denen die Erfahrung alle geſcheidten Köpfe geheilt hat. Ein naturaliſirtes und einer Gegend definitiv erworbenes Gewächs iſt dasjenige, welches ſich von ſelbſt, ohne Zuthun des Menſchen, fortpflanzt, wie es dies auf heimiſchem Boden thun würde. Die gemeine Akazie z. B., aus dem nördlichen Amerika ſtammend, iſt in Mitteleuropa naturaliſirt, denn ſie beſamt ſich von ſelbſt und verwildert in unſern Hecken und Wäldern. Die Roßkaſtanie iſt nicht naturaliſirt, ihr Same keimt allerdings, wenn er zu Boden fällt, und der Baum beginnt zu treiben, kommt aber bald um, wenn der Menſch ihm ſeine Pflege nicht angedeihen läßt. Es giebt alſo nichts Seltneres als vollſtändige Naturaliſationen. Allein nicht zufrieden damit, die Nutzpflanzen und Nutzthiere zu naturaliſiren, hat der Menſch auch verſucht, ſie zu akklimatiſiren. Er hat ſich mit der Hoffnung geſchmeichelt, daß ein aus einem heißen Lande ſtammendes Gewächs ſich allmälig an ein ſtrengeres Klima gewöhnen würde, er hat ſich eingebildet, daß das von einem kultivirten Individuum in ſeinem neuen Vaterlande geerntete Korn kräftigere Weſen geben würde. Süßer Wahn!

Digitized by Google

wie Dupetit-Thouars ſagt. Das Gewächs lebt, ſo lange das Thermometer und das Hygrometer ſich innerhalb der Grenzen halten, die es zu ertragen vermag; iſt dieſe Grenze aber überſchritten, ſo kommt es um. Jeder ſtrenge Winter iſt für die leidenſchaftlichen Gartenkünſtler eine Quelle bitterer Täuſchungen. Der Baum, den man akklimatiſirt glaubte, weil er mehre Winter, ähnlich denen ſeiner Heimat, durchgemacht hatte, ſtirbt ab, ſobald das Thermometer unter das Minimum ſeines heimatlichen Klimas herabſinkt. Die ſtrengen Winter von 1709, 1789, 1820 und 1830 haben Bäume getödtet, welche wir als einheimiſche anzuſehen gewohnt waren, wie Nuß-, Kaſtanien- und Maulbeerbäume. Alle zwanzig Jahre ſterben die Olivenbäume der Provence und die Orangenbäume Liguriens vor Kälte auf dem einen oder andern Punkte ab. Ihr Abſterben ruft uns zurück, daß in den Gegenden, aus denen ſie ſtammen, das Queckſilber nie unter den Gefrierpunkt herabſinkt.

Was ich von den Pflanzen geſagt, gilt eben ſo gut von den Thieren: ihre Akklimatiſation iſt ein Wahn. Jede Art lebt und pflanzt ſich unter gewiſſen Temperatur- und Ernährungsbedingungen fort, ohne dieſe Bedingungen ſtirbt ſie ab. Sache des einſichtigen Thierkenners iſt es, diejenigen herauszufinden, deren geſchmeidigere Natur ſich in die Veränderungen unſerer nordiſchen Klimate ſchickt; doch muß er dem Beginnen entſagen, ihren Organismus verändern zu wollen. Das Renthier hat ſich in den Gebirgen Schottlands, deſſen Klima und phyſiſche Beſchaffenheit der Lapplands ſo ähnlich iſt, nicht zu akklimatiſiren vermocht. Das Pferd dagegen iſt der getreue Diener des Menſchen auf der ganzen Erde, von den ſengenden Wüſten Arabiens bis zu den eiſigen Gebirgen Islands und Skandinaviens. Der Hund iſt dem Eskimo bis in jene mit ewigem Schnee bedeckten Gegenden gefolgt, wo ſelbſt das Meer nicht mehr aufthaut; aber es iſt keineswegs die menſchliche Kunſt,

Digitized by Google

welche dieſe Thiere umgewandelt und ihre Verfaſſung ſo verſchiedenen Einflüſſen angeſchmiegt hat, die Natur hat Alles gethan und der Menſch nur Nutzen daraus gezogen. Die Thiere der heißen Länder, welche ihre Organiſation nicht im voraus akklimatiſirt hatte, ſind in Europa ſtets umgekommen, die Schwindſucht hat ſie ohne Unterſchied dahingerafft. Der Menſch allein kann ungeſtraft allen Klimaten Trotz bieten, weil er ſeine Kleidung, ſeine Wohnung, ſeine Nahrung ändert, und weil er den Gebrauch des Feuers kennt; das Thier aber gewöhnt ſich eben ſo wenig an ein Klima, als der Menſch es thun würde, wenn er nackend und obdachlos in den nordiſchen Gegenden leben wollte, wie er es ungeſtraft in einigen bevorzugten Gegenden der Tropenzonen thun kann. Seine Einſicht, ſein Fleiß haben ihn zum Kosmopoliten gemacht; durch ſeine Organiſation war er es nicht. Es iſt mir nicht darum zu thun, die Meteorologen, die Botaniker und die Zoologen, welche ſich Naturaliſationsverſuchen hingeben, abſchrecken zu wollen; man muß ſie in Menge machen, und die Erfahrung beweiſt, daß ſelbſt Tollkühnheiten oft gelingen. Welcher Botaniker hätte geglaubt, daß die Aloe, das Dasylirion gracile, die Jubaea spectabilis, aus Amerika ſtammend, die Lagerstroemia und das Nelumbium Indiens im Süden von Frankreich fortkommen könnten, daß der Pfau, das Perlhuhn und das Känguru ſich an unſere Winter gewöhnen würden? Allein indem man die Wichtigkeit und den Nutzen dieſer Verſuche betont, muß man das Publikum nicht über das Ziel, das zu erreichen iſt, täuſchen. Pflanzen und Thiere naturaliſiren iſt möglich, ſie akklimatiſiren, nicht.

Neben dieſen Fragen von durchaus praktiſchem Intereſſe ſtellt die Pflanzengeographie andere von weſentlich philoſophiſcher Art. Wie hat ſich die gegenwärtige Vegetation auf der Oberfläche des Erdballs feſtgeſetzt? Ward jede Art urſprünglich durch

Digitized by Google

ein einziges Individuum, Erzeuger aller gegenwärtig vorhandenen, vertreten, oder iſt vielmehr eine gewiſſe Anzahl von Individuen gleichzeitig auf mehren Punkten erſchienen? Mit einem Wort, um die Sprache der Naturforſcher zu reden, hat es urſprünglich vielfache und verſchiedene Schöpfungscentren gegeben, von wo aus die Pflanzen ſtrahlenförmig ſich ausbreiteten, bis ſie auf ihrer Wanderung durch mit ihrem Daſein unverträgliche Bedingungen gehemmt wurden? War beim Erſcheinen der gegenwärtigen Pflanzendecke die Erdoberfläche wie heute disponirt, oder unterſchied ſich vielmehr die Vertheilung von Land und Meer und das Relief des Bodens von dem gegenwärtigen Zuſtande? All' dieſe und mehre andere Fragen haben die Wißbegierde der denkenden Botaniker und Geologen lebhaft erregt. Dieſe Fragen ſind ungelöſt, noch ſind ſie ſämmtlich in Dunkel gehüllt, allein es beginnt zu tagen. Meine Aufgabe iſt es, in wenig Worte das Klarſte, was unſer Wiſſen über dieſen Gegenſtand enthält, zuſammenzufaſſen. Bevor wir jedoch bei dem Erſcheinen der gegenwärtigen Gewächſe anlangen, muß ich zuvor eine Vorſtellung von denjenigen zu geben verſuchen, deren Seitenſtücke nicht mehr vorhanden, aber in foſſilem Zuſtande im Schoße der Erde aufbewahrt ſind. Dank den Arbeiten der Herren Adolphe Bronguiart, Alexander Braun, Heinrich Göppert, von Sternberg, Unger, Corda, Lindley, William Hutton, Schimper, Oswald Heer und Bunbury iſt die vegetabiliſche Paläontologie den Fortſchritten der animaliſchen gefolgt, ſo daß wir uns eine Vorſtellung von der Vegetation der geologiſchen Perioden machen können, in denen die ſeltſamen Thiere lebten, deren Ueberreſte mit denen der foſſilen Vegetation vermiſcht ſind.

Urſprünglich war unſere Erde eine weißglühende, halb geſchmolzene Maſſe, welche ſich um die Sonne drehte; die Umdrehung um ſich ſelbſt hat ihr, indem dieſelbe ihre Pole abplattete und ihren Gleicher anſchwellte, die Form verliehen,

Digitized by Google

welche sie seitdem bewahrt hat. Während dieser Periode vermochte kein organisches Wesen auf ihrer Oberfläche zu leben. Nach Tausenden von Jahrhunderten hat der Erdball sich abgekühlt; das Wasser bildete, indem es sich auf seiner Oberfläche verdichtete, Meere, in diesen Meeren kamen die ersten Thiere, die ersten Meeralgen zum Vorschein; allmälig tauchten Inseln auf, woselbst sich eine Landvegetation festsetzte: es waren große Bäume ohne Blüthen, kryptogamischen Familien angehörend, welche in der gegenwärtigen Flora nur noch durch niedrige und unscheinbare Pflanzen vertreten sind. Der Anblick dieser ersten Bäume erinnert an den riesiger Cypressen oder jener Bäume mit hängenden Blättern (Dracaena) der heißen Länder. Das Festland beschränkte sich damals auf einige Inselgruppen, die Vegetation war spärlich und dünn gesäet. In der folgenden Periode aber bedecken ungeheure feuchte Wälder einen Theil der Erdoberfläche, Bäume mit breiten Blättern beschatten die Sümpfe, wo die ersten Reptilien zum Vorschein kommen. Diese Bäume, gestürzt und Jahrhunderte lang über einander gehäuft, haben die Steinkohle gebildet, sei es, daß sie an Ort und Stelle fielen und eine Umwandlung ähnlich der der Moose erlitten, welche sich in den Sümpfen der kalten Länder in Torf verwandeln, sei es, daß sie, durch mächtige Ströme fortgerissen, sich vor den Mündungen der Flüsse dieser Epoche anhäuften. Aehnliche Anhäufungen gehen noch gegenwärtig vor der Mündung der großen Flüsse Amerikas, namentlich des Mississippi, vor sich.

Von der Steinkohlenperiode bis zu der Kreide bleibt der Charakter der Vegetation derselbe, immer sind es Kryptogamen, welche den Boden einnehmen; nach Ablagerung der Kreide aber mischen sich Bäume, ähnlich den unserigen, zwischen die Urformen. Die heutigen Gattungen nehmen während der beiden ersten Tertiärperioden, welche den Gebirgsarten in der Umgegend von Paris entsprechen, unaufhörlich an Zahl zu. In

Digitized by Google

dieſer Epoche iſt die Vegetation vollſtändig verändert; die Urgewächſe, denen wir die Steinkohle verdanken, ſind verſchwunden, die Landſchaft gleicht im Ausſehen der der heißen Länder und der gemäßigten Zonen. Die Bäume ähneln Weiden, Kiefern, Palmen. In der jüngſten Tertiärperiode endlich ſind es unſern Akazien, Ahorn, Pappeln nahe ſtehende Bäume, welche den Boden beſchatten: es iſt die Morgenröthe der gegenwärtigen Vegetation, derjenigen, welche die Erde beim Erſcheinen des Menſchen ſchmücken ſollte. Die Bäume Japans, die Wälder Nordamerikas erinnern am meiſten an dieſe Pflanzenperiode und ſcheinen ſo die jetzige Flora mit der letzten der entſchwundenen zu verknüpfen.

Die Pflanzen, welche uns umgeben, ſind nicht gleichzeitig auf der geſammten Erdoberfläche erſchienen. Sobald ein Stück Erde über den Waſſern emportauchte, klammerten ſich einige beſcheidene Flechten an den Felſen; auf der aus der langſamen Zerſetzung dieſer Flechten hervorgehenden Dammerde konnten Mooſe feſten Fuß faſſen; dieſe bereiteten ihrerſeits den Boden vor, auf dem ſich verſchiedene einjährige Pflanzen, dann ausdauernde Arten, endlich Stauden und Bäume zeigten. So bekleiden ſich die Korallenriffe des Stillen Ozeans mit Pflanzenwuchs, ſobald eine Bewegung des Bodens ſie über das Meer emporgehoben hat. Um uns her, auf verlaſſenen Mauern und verfallenen Gebäuden, ſehen wir die Vegetation ſich feſtſetzen und dabei denſelben Gang verfolgend; das beſcheidene Mooos iſt es, welches den Boden vorbereitet, wo Hühnerdarm, Löwenmaul, Levkoje, dann Feigen, Ahorn, Lotosbäume Wurzel ſchlagen und die düſtere Ruine durch ihr friſches Grün erheitern. Gleich der Pflanzenbevölkerung eines Felſenriffs, gleich der einer Mauer iſt die des ganzen Erdballs das Werk von Jahrhunderten geweſen. Bei der Mündung des Miſſiſſippi haben die durch den Fluß abgelagerten Anſchwemmungen 200 Meter Dicke, in dieſen

Digitized by Google

Anschwemmungen sind deutliche Schichten, aus gegenwärtigen Gewächsen bestehend, vergraben. Zuerst stößt man auf ein Bett von Gräsern und Kräuterpflanzen, welches auf das ehemalige Vorhandensein von Prairien, ähnlich denen, welche sich noch an den Ufern der großen amerikanischen Seen und des Golfes von Meriko ausdehnen, hinweist. Herr Ch. Lyell weist der so vertretenen Periode eine Dauer an, die nicht unter 1500 Jahre betragen kann. Darüber befinden sich Anhäufungen von kahlen Cypressen, welche durch Massen von Sand geschieden sind, dann kommen Betten, welche ausschließlich aus Eichen gebildet sind, ähnlich denen, welche gegenwärtig an den Ufern des Flusses wachsen. An den Stämmen dieser Bäume hat man die Jahresringe zählen können. Jeder derselben entspricht einem Jahr, und man leitet daraus das Alter des Waldes ab; nun finden sich zehn Betten dieser über einander geschichteten Eichen vor, und addirt man das Alter all' dieser aufgehäuften Bäume zusammen, so gelangt man zu der erschreckenden Zahl von 158,000 Jahren: das würde die Zeit sein, welche zwischen den Urprairien des Missisippideltas und der gegenwärtigen Epoche verflossen ist.

Amerika ist nicht das einzige Land, wo man Reste verschiedener Vegetationen findet, die sich an ein und demselben Orte gefolgt sind. Kiefern- und Fichtenstämme sind weit über der gegenwärtigen Baumgrenze in den Torfmooren der Alpen begraben. In denen der Ebene gräbt man gleichfalls Stämme von Arten, welche der Gegend fremd sind, aus; so findet man in England die Fichte, welche auf den brittischen Inseln keineswegs wild wächst. Die gegenwärtige Pflanzenwelt hat also allmälige Phasen durchgemacht, welche über alle geschichtlichen Ueberlieferungen hinausgehen. Beim Erscheinen der Gewächse, welche um uns her leben, war die Oberfläche des Erdballs keineswegs so, wie sie heutzutage beschaffen ist, die Vertei-

Digitized by Google

lung von Land und Waſſer, die Abgrenzung der Kontinente, Zahl und Geſtalt der Inſeln wichen von dem ab, was wir um uns her erblicken. Alles beweiſt in der That, daß ſich das Erdreich, je mehr es emportauchte, deſto mehr mit Pflanzen bedeckte. Gewiſſe Floren ſind älter, andere dagegen jünger. Inſeln in der Nähe großer Kontinente, wie die Galapagos an den Küſten von Chili, gewiſſe Eilande im griechiſchen Archipel und in der kanariſchen Gruppe, haben eine ſo ſehr von der des benachbarten Feſtlandes verſchiedene Vegetation, daß es unmöglich iſt, eine gleichzeitige Schöpfung zuzugeben. Die geologiſche Natur des Bodens beſtätigt dieſen Schluß, wenn ſie uns wahrnehmen läßt, daß zur Zeit, wo ein Erdſtrich über das Waſſer emporragte, der andere noch vom Waſſer bedeckt war. Die meiſten Naturforſcher betrachten die Fauna oder Flora Auſtraliens als eine Schöpfung für ſich und älter als die der ganzen übrigen Erde. Endlich kann man nachweiſen, daß Länder, die heutzutage durchs Meer getrennt ſind, zur Zeit, wo die Pflanzen ſich auf der Oberfläche des Erdballs verbreiteten, mit einander verbunden waren. Edward Forbes hat es für England bewieſen. Dieſes Land zählt keine einzige einheimiſche Pflanzen- oder Thierart, die ſich nicht auf dem benachbarten Feſtlande, ſei es in Frankreich oder in Deutſchland, fände. Ja mehr, einige dieſer Arten haben den Meeresarm, welcher England von Irland trennt, noch nicht überſchritten; letztere Inſel aber beſitzt Arten, welche England fremd, ihr dagegen mit dem nördlichen Spanien gemeinſam ſind. Alle dieſe Umſtände ſcheinen darauf hinzudeuten, daß zur Zeit der Pflanzenzerſtreuung England mit dem Feſtlande verbunden war. Geologie und Botanik ſtimmen überein, um dies zu beſtätigen. In der That iſt die Trennung der beiden Länder ein bezüglich ſehr neues und ſpäteres Ereigniß, als die Niederlage von Rollkieſeln, welche die Bodenfläche auf beiden

Digitized by Google

Ufern des Kanals bedeckt. Auf der andern Seite steht in geologischer Beziehung nichts der Annahme entgegen, daß Irland, Spanien und die Azoren einen einzigen Kontinent (vielleicht die Atlantis des Plato) zu einer Zeit, wo die gegenwärtige Pflanzenwelt bereits vorhanden war, gebildet haben. Seit dem Erscheinen derselben haben Bodensenkungen diese Länder getrennt; aber trotz der Veränderung des Klimas, welche die nothwendige Folge davon gewesen ist, hat Irland einige spanische Pflanzen, stumme Zeugen der ehemaligen Vereinigung beider Länder, bewahrt.

Die Studien Alphonse de Candolle's über die getrennten Arten beweisen, daß diese Eigenthümlichkeiten sich nicht blos auf Irland beschränken. Eine getrennte Art ist eine solche, die sich hie und da in sonderbarer, durch die gegenwärtige Geographie und Klimatologie unerklärlicher Weise zeigt. Ich wähle zwei Beispiele aus. Die Zwergpalme (Chamaerops humilis) kommt im Süden von Portugal, im ganzen südlichen und östlichen Theile von Spanien vor, sie fehlt im Roussillon und im Languedoc, auf Korsika, im nördlichen Sardinien, zeigt sich aber wieder auf beschränktem Gebiet an der Küste von Nizza und auf der Insel Kapraja bei Livorno, dann fehlt sie von neuem im ganzen Norden der italienischen Halbinsel, sie zeigt sich erst wieder in der Umgegend von Terracina an den Grenzen des Königreichs Neapel und der päpstlichen Staaten, und wird gemein auf der Insel Kapri, vornehmlich aber auf Sicilien. Im östlichen Theile der italienischen Halbinsel findet sie sich zu Tarent, dann gegenüber auf der Küste von Dalmatien, wo sie bis zum Meerbusen von Korinth heruntergeht, kommt aber weder in Griechenland noch auf den Inseln Zante und Korfu vor. Nur zu gemein in Algerien, wo sie das größte Hinderniß der Urbarmachung ist, begegnet man ihr dagegen in Aegypten nicht, sondern nur in Nubien. Keine geologische oder meteorologische

Digitized by Google

Betrachtung erklärt eine so seltsame Vertheilung. Warum fehlt die Zwergpalme auf Korsika und im nördlichen Theile von Sardinien, während sie sich im Norden bei Nizza findet, im Osten auf der kleinen Insel Kapraja, im Westen auf der ganzen Küste von Spanien? Nur ehemalige Verbindungen von jetzt durch das Meer getrennten Ländern vermögen Rechenschaft von dieser launenhaften Zerstreuung zu geben.

Die schöne, unter dem Namen Rhododendron ponticum bekannte Staude liefert uns ein zweites Beispiel. Ihr ursprüngliches Vaterland ist das Küstenland des Schwarzen Meeres am Fuße des Kaukasus und die Umgegend des Olymp von Smyrna bis Nikomedia. Unbekannt im ganzen griechischen Archipel, Morea, der europäischen Türkei, Italien, Sicilien, den Balearen, Algerien, bildet sie eine ferne Kolonie in den Gebirgen des südlichen Spanien, der sogenannten Sierra von Monchique und in den Algarven von Portugal. Ich könnte an der Hand de Candolle's diese Beispiele noch vermehren; die beiden, welche ich soeben angeführt, scheinen mir jedoch hinreichend, die Botaniker und Geologen, wenn nicht zu überzeugen, doch zum Nachdenken zu stimmen.

Ein anderer Umstand ist nicht weniger charakteristisch. Gewisse Pflanzen, welche in Teichen und Sümpfen leben, wie die Seerose, die Villarsia nymphoides, das Pfeilkraut, sind in Europa sehr verbreitet, fehlen jedoch meist im Umkreise der Schweizer und Savoyer Alpen; sie würden daselbst, wie man sich unzweifelhaft vergewissert hat, dort so gut wie anderwärts wachsen; in Sümpfe ausgestreut, haben sie sich dort in einem Grade vermehrt, daß sie lästig wurden. Es muß also zur Zeit, wo sie sich in Europa ausbreiteten, irgend ein Hinderniß sie abgehalten haben, sich in dem Schweizer Becken festzusetzen. Dieses Hinderniß waren die Gletscher, welche damals das ganze zwischen den Alpen und

Digitized by Google

dem Jura liegende Thal erfüllten. Diese ehemalige Ausdehnung der Gletscher, deren unwiderlegliche Zeugen die erratischen Blöcke sind, ist das letzte große, der gegenwärtigen Aera vorangegangene geologische Ereigniß. Es ist mit der Epoche der Zerstreuung der Wasserpflanzen zusammengefallen, welche sich in mit einem dicken Eismantel bedeckten Gegenden nicht ausbreiten konnten.

Giebt es einen oder mehre Mittelpunkte der Pflanzenschöpfung? Ist es wahrscheinlich, daß eine Art erst auf einem Punkte des Erdballs erschien und sich von da nach allen Gegenden, wo wir sie gegenwärtig antreffen, verbreitete? oder müssen wir vielmehr vielfache Schöpfungsmittelpunkte zugeben? Lassen wir zuerst die Thatsachen sprechen. Drei Arten*) sind bisher erst in Irland und den Vereinigten Staaten beobachtet worden; eine bedeutende Anzahl kommt nur in Asien und Afrika, oder in Amerika und Asien vor. Andere bewohnen die gemäßigten Zonen der beiden Erdhälften und sind durch den ungeheuren Zwischenraum der tropischen und intertropischen Zonen des Erdballs geschieden. Unter diesen Pflanzen werden solche angeführt, welche auf der nördlichen Erdhälfte nur in Lappland, auf der südlichen Erdhälfte nur auf dem Feuerlande und auf Neuseeland beobachtet worden sind, andere hat man nur in den Vereinigten Staaten und an den Ufern des Mittelländischen Meeres einerseits und in Patagonien andererseits bemerkt. Pflanzen der kalten oder gemäßigten Länder, könnten sie unter dem Aequator nicht leben, eine allmälige Verbreitung ist daher durchaus unmöglich, und die Verführung der Samenkörner von einem Ende der Welt zum andern desgleichen, denn es giebt keine Luft- oder Wasserströmung, durch welche sie diese ungeheure Entfernung hätten zurücklegen können. Die-

*) Eriocaulon septangulare, Sisyrinchium anceps, Spiranthes cernua.

Digitized by Google

ſelben Thatſachen wiederholen ſich, wenn man in der Richtung von Oſten nach Weſten ſehr entfernte Gegenden in Betracht zieht. Man kann ſie vernünftiger Weiſe nicht mit Hülfe von geologiſchen Verbindungen heutzutage durch ungeheure Meere getrennter Länder erklären. In der That waren zur Zeit der Zerſtreuung der Arten, als die Beſchaffenheit des Erdballs eine andere war, auch die Klimate andere, denn dieſelben ſind die unmittelbare Folge dieſer Beſchaffenheit. Nun findet man an den äußerſten Enden der Pole beider Erdhälften Pflanzen, welche auch bei der mäßigſten Wärme ſchnell umkommen. Zur Zeit ihres Erſcheinens war das Klima alſo eben ſo kalt wie heutzutage, die Vertheilung von Land und Meer, das Bodenrelief, alles entſcheidende Klimaurſachen, unterſchieden ſich nicht von dem gegenwärtigen Zuſtande, und die ehemalige Verbindung großer Kontinente, die jetzt durch unermeßliche Meere getrennt ſind, wird zu einer unzuläſſigen Hypotheſe. Die Paläontologie beſtätigt dieſe Schlüſſe, ſie lehrt uns, daß die Klimate auf der ganzen Erde wärmer geweſen ſind als gegenwärtig. Zu Ende der jüngſten, von den Gelehrten pliocän genannten geologiſchen Epoche bewohnten die Elephanten die Umgegend von Paris, die Löwen und Tiger den Süden von Frankreich. Während dieſer Periode alſo hätten ſich dieſe Pflanzen nicht feſtſetzen können; allerdings folgte darauf die Kälteperiode, welche die Ausdehnung der Gletſcher beförderte, die rings um die Alpen, Pyrenäen, Vogeſen herumlagen und ſämmtliche Polarländer bedeckten. Auch betrachtet Edward Forbes die Eiszeit als die der Ausbreitung der Alpenpflanzen. Dieſe Meinung, für eine geſondert betrachtete Erdhälfte haltbar, iſt es nicht mehr, wenn es ſich darum handelt, die Verbreitung der polaren Arten über den Aequator weg zu erklären, wo die Hitze dieſelbe wie heutzutage geweſen zu ſein ſcheint. Eine andere Folge ergiebt ſich aus dem Studium der foſſilen Pflan-

Digitized by Google

zen und Thiere, nämlich, daß während der geologischen Perioden die Klimate bei weitem gleichförmiger waren, als sie es gegenwärtig sind. Folglich, wenn Erdverbindungen die Anwesenheit von Pflanzen auf bezüglich wenig entfernten Punkten erklären können, so glaube ich dagegen, daß ihr Vorkommen am äußersten Ende beider Erdhälften keine andere Ursache haben kann, als die Vielfältigkeit von Schöpfungsmittelpunkten. Alles beim Studium der Pflanzengeographie führt auf diese Vorstellung zurück.

Endlich ist noch eine Frage aufgeworfen worden. Ist das Erscheinen der verschiedenen Pflanzenfamilien auf dem Erdboden allmälig oder gleichzeitig vor sich gegangen? Hat sich die Erde ohne Unterschied mit allen den Arten, welche die Gesammtheit des Pflanzenreichs bilden, bedeckt, oder ist dieses Erscheinen vielmehr langsam und allmälig vor sich gegangen? Es ist wahrscheinlich, daß die Familien und Gattungen sich eine nach der andern in hierarchischer Ordnung erzeugt haben. Die Geologie hat einiges Licht auf diese ersten Tage der gegenwärtigen Schöpfung geworfen. Wie wir gesehen haben, herrschen nämlich die Kryptogamen in den alten Schichten, dann kommen die Koniferen und Monokotyledonen, die jüngsten Gebirge bieten uns polypetale Dikotyledonen, Gewächse aus der Familie der Malven, des Ahorns, der Weiden, der Eichen, der Birken, der Myrte und der Rose, aber kaum einige gamopetale Dikotyledonen, z. B. Pflanzen aus der großen Familie der Synanthereen, welche gegenwärtig ein Zehntel der Pflanzenwelt der Erde bildet, dar; nun sind diese Pflanzen aber diejenigen, deren Bildung die allerverwickeltste ist. Die hierarchische Ordnung, welche die im Schoße der Erde vergrabenen Pflanzen bei ihrer Aufeinanderfolge beobachtet haben, hat ebenso beim Erscheinen der lebenden Pflanzen walten müssen. Es giebt Arten, die jünger sind als andere, die gegenwärtige Schöpfung

Digitized by Google

hat die antediluviane fortgesetzt und setzt sich vielleicht noch fort; nichts beweist uns in der That, daß sich nicht fortwährend neue Arten erzeugen. Wenn vollkommen bekannte und tagtäglich erforschte Gegenden dem Auge der Botaniker immerfort neue Formen darbieten, so darf man wohl sagen, daß diese der Aufmerksamkeit ihrer Vorgänger entgangen seien, man kann aber nicht nachweisen, daß sie nicht neuerdings erst entstanden sind. Diese Meinung ist von Herrn Henri Lecoq in seiner Géographie botanique du plateau central de la France formulirt und mit geistreichen Betrachtungen unterstützt worden; sie verdient die ganze Aufmerksamkeit der philosophischen Naturforscher, und die Lösung einer derartigen Frage würde für immer ihre Vorstellungen von dem so heiklen und schwierigen Begriffe der Art feststellen.

Die Wissenschaft hat, wie man sieht, einen Zipfel des Schleiers zu lüften versucht, welcher den geheimnißvollen Ursprung der organischen Welt, zu der wir gehören, bedeckt. Dank der Astronomie, der physischen Geographie, der Geologie und der Paläontologie, erkennt man in fernem Dämmerlicht durch Tausende von Jahrhunderten hindurch, wie der glühende Kern der Erde sich abkühlte und dann mit Thieren und Pflanzen bevölkerte, wie langsame und allmälige Veränderungen, säculare Umwälzungen allmälige zahllose Schöpfungen, unvollkommene Skizzen der gegenwärtigen Schöpfung, haben verschwinden lassen. Endlich bedecken sich auf dem völlig erkalteten Balle die aufgetauchten Erdräume allmälig mit einer schönern und mannichfaltigern Vegetation als alle vorhergehenden; die partiellen Schöpfungen vervollständigen sich und bleiben, ähnliche Umstände führen das Erscheinen gleicher oder ähnlicher Wesen herbei, und nachdem die Erde mit Blumen geschmückt und von Thieren bevölkert ist, erscheint der Mensch. Sein Ursprung verliert sich, wie der der andern höhern organischen Wesen, in

Digitized by Google

die Nacht der Zeiten, gleich ihnen aber gehört er der heutigen Periode an. Seine geiſtige Ueberlegenheit erhebt ihn über Alles, was ihn umgiebt, und ſcheint ihn in dem ſtolzen Gedanken zu befeſtigen, daß die vorangegangenen Schöpfungen keinen andern Endzweck gehabt haben, als ſeine Ankunft vorzubereiten, indem ſie die Erde würdig machten, ein Weſen zu empfangen, das fähig war, die Welt zu begreifen und zu beherrſchen.

Digitized by Google

Digitized by Google

Spitzbergen.

Bild eines Inſelmeers zur Eiszeit.

Unter dem Meridian Mitteleuropas und der ſkandinaviſchen Halbinſel zwiſchen dem 76° 30′ und 80° 50′ Grade n. Br. gelegen, iſt Spitzbergen ſo zu ſagen die vorgerückte Vorhut unſeres Erdtheils nach Norden. Auf dieſen Inſeln herrſcht der Winter zehn Monate des Jahres hindurch, erliſcht das organiſche Leben aus Mangel an Wärme und Licht, dort ſammelt der Naturforſcher die letzten Pflanzen dort beobachtet er die letzten Thiere, es iſt die äußerſte Grenze der europäiſchen Fauna und Flora. Darüber hinaus iſt Alles todt, und eine Schollenmaſſe ewigen Eiſes erſtreckt ſich bis zum Nordpol. Auf Spitzbergen ſelbſt ſchmilzt der Schnee nur am Meeresſtrande, an günſtig gelegenen Stellen, die Berge hingegen bleiben ſelbſt während der drei Sommermonate beſtändig weiß. Sämmtliche Thäler ſind mit mächtigen Gletſchern angefüllt, welche bis zum Meere herunterreichen; ſo ſind denn dieſe Inſeln das getreue Bild des geologiſchen Zeitalters, welcher demjenigen, worin wir leben, unmittelbar vorangegangen iſt, der Gletſcherperiode. Während dieſer Periode bedeckte ein Eismantel den ganzen Norden Europas bis zum 53° n. Br., ſämmtliche Thäler von Bergketten, wie die Vogeſen, der Jura, die Alpen, die Pyrenäen, die Karpathen, der Kaukaſus, der Himalaya, ja ſelbſt diejenigen Neuſeelands,

Digitized by Google

waren von Gletschern eingenommen, welche sich mehr oder minder weit in die benachbarten Ebenen erstreckten. Spitzbergen stellt unsern Augen also in Wirklichkeit das Bild eines geologischen Zeitalters dar, dessen Spuren fast überall sichtbar sind. Die geringe Anzahl von Thieren und Pflanzen, welche diese Inseln bewohnen, sind solche, welche der Kälte am meisten Widerstand leisten und das geringste Quantum jener Lebensquelle der organischen Wesen, der Sonnenwärme, erfordern. Von diesem zwiefachen Gesichtspunkte aus verdient das physische Bild dieses Theiles der arktischen Länder, von einem Reisenden entworfen, der ihn zu wiederholten Malen gesehen und durch das Studium der älteren und neueren Entdeckungsreisen vervollständigt, dem gebildeten Publikum, welches sich für die Beschreibung und Geschichte unseres Planeten interessirt, vorgeführt zu werden.

Der Archipel von Spitzbergen besteht aus einer Hauptinsel, welche ihren Namen der ganzen Gruppe verliehen hat, und aus zwei andern bedeutenden Inseln, einer kleinern im Süden und einer größern im Norden, dem Staatenlande und dem Nordostlande. Die Prinz Karl Insel ist auf der westlichen Seite gelegen, und eine Reihe kleiner Eilande, die Sieben Inseln genannt, läuft gerade gegen den Pol. Das Tafeleiland ist der letzte Felsen, welcher sich aus dem Schooße des Eismeeres erhebt.

Bevor wir zur Beschreibung von Spitzbergen übergehen, wollen wir kurz die Geschichte seiner Entdeckung und der Forschungen, deren Schauplatz es gewesen ist, andeuten.

Entdeckung und Erforschung von Spitzbergen.

Gegen Ende des sechzehnten Jahrhunderts suchten die Holländer, vom spanischen Joche befreit, ihren Handel in allen Welttheilen, namentlich in der Levante, auszubreiten. Genöthigt, die Westküsten Spaniens entlang zu segeln, stießen ihre friedlichen Galioten daselbst auf spanische Korsaren. So tauchte der

Digitized by Google

Gedanke auf, Indien von Norden her zu erreichen. In dieser Absicht rüsteten die Vereinigten Provinzen drei Fahrzeuge aus: den Schwan von Kornelis, den Merkur von Ysbrandtz und den Boten von Barentz befehligt. Diese Schiffe drangen bis zur Meerenge von Waigatz oder Kara, welche Nova Semlja von Rußland trennt, vor und glaubten die gesuchte Durchfahrt entdeckt zu haben. Eine zweite Expedition, von Heemskerk befehligt, durchschnitt sie im folgenden Jahre. Da die Jahreszeit aber bereits zu weit vorgerückt war, so waren die Schiffe gezwungen, nach Holland zurückzukehren. Durch diese Mißerfolge entmuthigt, weigerten sich die Generalstaaten, die Kosten für eine dritte Expedition zu bestreiten, setzten aber einen namhaften Preis für denjenigen aus, dem es gelingen würde, die Durchfahrt zu entdecken. Die Stadt Amsterdam beschloß einen neuen Versuch zu machen. Sie rüstete zwei Fahrzeuge aus, von denen das eine unter dem Befehl von Heemskerk, das andere unter dem von Jan Kornelis stand; Willem Barentz war der Lootse und die Seele der Expedition.*) Den 18. Mai 1596 ging sie bei Texel unter Segel. Den 9. Juni entdeckten die Holländer eine Insel von ödem Aussehen, in der Mitte erhob sich ein nackter Berg. Barentz gab ihm den Namen Jammerberg, und nachdem seine Leute einen riesigen Bären erlegt hatten, erhielt die Insel den Namen Beeren-Eiland. Es ist dieselbe, welche der Engländer Steven Bennet im Jahre 1603 rekognoscirte und nach dem Namen seines Rheders Cherryisland benannte. Zwischen Norwegen und Spitzbergen unter 74° 35′ n. Br. gelegen, wird sie zuweilen von Bärenjägern und Walroßfängern besucht. Die Bäreninsel verlassend, steuerten die Schiffe Westnordwest. Den 17. Juni befanden

*) Man sehe hierüber die Histoire du pays nommé Spitzberghe, monstrant comment qu'il est trouvée son naturel et ses animauls. En Amsterdam, à l'enseigne des Cartes nautiques. 1613.

Digitized by Google

sie sich unter 81° 10 n. Br., und indem sie lavirten, um aus dem Eise herauszukommen, entdeckten sie ein hohes, mit Schnee bedecktes Land. Den 21. Juni gingen sie in einer Bucht, der von Smeerenberg, unter 79° 44′ n. Br. zwischen den Inseln und dem Lande vor Anker. Indem sie fortfuhren, dieses Land in der Richtung von Südsüdost zu bestreichen und es von spitzen Berggipfeln starren sahen, gaben sie ihm den Namen. Spitzbergen, und verfolgten die Küste bis an's äußerste Ende unter 76° 35′. Den 1. Juli bekamen sie die Bäreninsel wieder zu Gesicht.

In den Meinungen über die ferner einzuschlagende Richtung getheilt, trennten sich die Befehlshaber. Barentz wandte sich nach Nordost, überwinterte in Nova Senelja und starb im folgenden Frühjahre, dieses öde Land verlassend, auf einem kleinen Fahrzeuge und Angesichts des Kaps, welches er im Jahre zuvor mit so tiefer Rührung umschifft hatte, denn er glaubte jene Nordostpassage entdeckt zu haben, welche dem Handel seines Vaterlandes eine neue Bahn eröffnen sollte. Kornelis dagegen war nach Norden zurückgegangen und unter 80° n. Br. wieder bei der Küste von Spitzbergen neben der Insel Amsterdam angelangt, wo sein Schiff einen Monat vorher Anker geworfen hatte.

Im Jahre 1607 rekognoscirte ein Engländer, Henry Hudson, auf ein und derselben Reise die Ostküste von Grönland bis zum 73° n. Br. sowie die Westküste von Spitzbergen, und drang bis zum 82° n. Br. in's Meer vor, wo er von den Eismassen am Weiterkommen gehindert wurde. In den darauf folgenden Jahren besuchten Jones Poole, Robert Fotherby und eine große Anzahl von baskischen, holländischen und englischen Walfischfängern Spitzbergen.

Im Jahre 1614 drangen Baffin und Fotherby bis zum 80° vor, stiegen auf dem am Lande festsitzenden Eise aus, drangen zu Fuß in nordöstlicher Richtung vor, wurden aber durch einen

Digitized by Google

unübersteiglichen Eiswall acht Meilen von dem Punkte, wo sie angelegt hatten, an weiterem Vordringen gehemmt.

Während des ganzen 17. Jahrhunderts wurden die Küsten von Spitzbergen fleißig von Walfischfängern besucht. Vom Juni bis September waren die Buchten der nördlichen Striche durch einen bedeutenden Zusammenfluß von rührigen und entschlossenen Seeleuten belebt, jede Nation hatte eine für sich. Wie durch einen Zauber entstanden Dörfer, aus Hütten von zu Schiffe herbeigebrachten Brettern bestehend. Das schönste war das von Smeerenberg. Dort fanden die Holländer ihre Amsterdamer Schenken wieder und das sogenannte Haarlemer Küchenviertel war dem Brennen des Walfischthrans gewidmet. Gegen den Herbst verschwanden diese zeitweiligen Ansiedelungen, die Hütten mit ihren Bewohnern kehrten nach Holland zurück. Im Jahre 1633 brachten sieben Leute den Winter daselbst zu und wurden gesund und wohlbehalten wieder angetroffen. Im folgenden Jahre wollten sieben Andere denselben Gefahren Trotz bieten. Den 20. Oktober verschwand die Sonne, einen Monat darauf zeigte einer von ihnen Symptome von Skorbut und unterlag den 24. Januar. Allmälig allesammt von dieser schmerzhaften Krankheit befallen, hörten sie den 26. Februar auf, ihr Tagebuch weiter zu führen. Derjenige, welcher es abfaßte, schrieb zuletzt noch mit zitternder Hand folgende Zeilen nieder: „Wir liegen selbvierte in unserer Hütte hingestreckt, so schwach und krank, daß wir uns gegenseitig nicht mehr unterstützen können. Wir bitten den lieben Gott, uns beizustehen und uns von dieser Welt zu nehmen, wo wir nicht mehr die Kraft besitzen zu leben.“ Diese und andere Versuche, welche die russischen Walfischfänger immer noch machen, beweisen, daß es möglich ist, auf Spitzbergen zu überwintern. Ich bin mit Scoresby der Ansicht, daß in einer zweckmäßigen Behausung aus Holz, mit Steinkohlen, eingemachten Vorräthen und einem

Digitized by Google

feurigen Wein versehen, eine derartige Ueberwinterung keine ernstlichen Gefahren darbieten würde.

Nun soll von derjenigen Reise, welche am meisten zur Kenntniß von Spitzbergen beigetragen hat, der eines Hamburger Walfischfahrers, Namens Friedrich Martens die Rede sein. Den 15. April 1671 aus der Elbe ausgelaufen, kehrte er den 29. August zurück. Nachdem er die Insel Jan Mayen rekognoscirt, hatte er sich dem Norden von Spitzbergen zugewandt, dem Walfischfange an der Nordwestküste zwischen der Magdalenenbai und der Hinlopenstraße obgelegen und war bis zum 81° n. Br. vorgedrungen. Er ging bei Magdalenenbai, Fairhaven, Smeerenberg, in der Muschelbai (Mussel-bay) und im Südhafen (Zuidhaven) vor Anker. Sein Bericht ist sehr ausführlich. Er beschreibt Spitzbergen, handelt sodann vom Meere, vom Eise, von der Luft, von den Pflanzen und Thieren, und giebt höchst belangreiche und wahrheitsgetreue Einzelheiten über die Sitten und den Fang des Walfisches oder der großen Cetaceen, welche man in damaliger Zeit an den Küsten von Spitzbergen fand.*)

Der Fang zog stets eine große Menge von Schiffen in diese Gegenden; die Seefahrer, die Erforscher der Polarmeere aber wandten sich den Nordküsten Amerikas zur Auffindung jener Durchfahrt vom Atlantischen in den Stillen Ocean zu, deren Entdeckung in unsern Tagen Maclure vollenden sollte.

Die erste rein wissenschaftliche Reise an den Küsten von Spitzbergen ist die von John Constantin Phipps,**) nachherigem Lord Mulgrave, und von Skeffington Lutwidge auf den Schiffen Race Horse und Carcaß, in Begleitung des Astronomen Lyons und des Physikers Irving. Der Zweck der Expedition war,

*) Recueil de Voyages au Nord, t. II.: Journal d'un voyage au Spitzberghen par Frédéric Martens (de Hambourg), suivi d'une description de Spitzberghen. In 18., Amsterdam, 1715, avec 17 planches.

**) Voyage towards the Northpole 1774.

Digitized by Google

ſich ſo viel als möglich dem Nordpol zu nähern. Die Schiffe liefen den 2. Juni 1773 aus der Themſe aus und entdeckten den 28. Juni Abends die Südküſte von Spitzbergen. Den 4. Juli gingen ſie in einer kleinen Bucht ſüdlich von der Hamburger Bai vor Anker, drangen danach bis 80° 48′ vor, wo ſie von den Eisſchollen am Weiterkommen gehindert wurden, und von da öſtlich nach den Sieben Inſeln, immer inmitten der Eisberge hinfahrend. Am 5., 6. und 7. Auguſt liefen ſie die größten Gefahren, die Schiffe blieben, von Eis umringt, trotz der Anſtrengungen beider Mannſchaften unbeweglich auf demſelben Flecke liegen. Schon waren die Boote in's Meer hinabgelaſſen und klar gemacht, als man bemerkte, daß das Eis ſich in Bewegung ſetzte und die Schiffe mit nach Weſten zog. Den 10. befanden ſie ſich auf offener See. Von nun an freies Meer befahrend, waren ſie Mitte Septembers wieder in England. Phipps hat an mehreren Punkten vor Spitzbergen, ſüdlich von der Hamburger Bai, bei der Inſel Amſterdam, bei Waldenisland, bei der Niedern Inſel (Low island) und bei der Inſel Moſſen angelegt. Es iſt die erſte Reiſe, auf der man regelmäßige meteorologiſche Beobachtungen angeſtellt hat. Doktor Irving bemühte ſich die Temperatur des Meeres bei verſchiedener Tiefe mit einem von Cavendiſh erfundenen Thermometer feſtzuſtellen, und Lyons erprobte mehrere Methoden, um die Lage des Schiffes durch Schätzung und durch den Chronometer zu beſtimmen. In ſeiner Beſchreibung giebt Phipps ein umſtändliches Tagebuch ſeiner Reiſe, alle Einzelheiten der Beobachtungen und Experimente, endlich ein Verzeichniß mit Abbildungen von Thieren und Pflanzen, die während der Reiſe beobachtet wurden.

Zu Anfang des 19. Jahrhunderts ſtoßen wir auf eine Reihe von Reiſen, die von einem einzigen Seefahrer ausgeführt wurden, der in Anſehung der Zahl, der Genauigkeit und Man-

Digitized by Google

nichfaltigkeit der vollbrachten Arbeiten mit keinem ſeiner Vorgänger verglichen werden kann und als Beobachter nie übertroffen werden wird. William Scoresby, Sohn eines Kapitains auf einem Walfiſchfahrer, machte ſiebenzehn Reiſen nach Spitzbergen. Zu jung, um ſich während der erſteren ununterbrochenen Unterſuchungen hinzugeben, ſind es die Ergebniſſe der zwölf letzteren, unternommen in den Jahren 1807 bis 1818, die den Stoff zu dem ausgezeichneten Werke bilden, welches er über die arktiſchen Meere herausgegeben hat.*) Wenn man bedenkt, daß Scoresby ſebſt einer der unternehmendſten Walfiſchfänger war, ſo kann man nicht umhin, es zu bewundern, wie er ſich all' die nöthigen Kenntniſſe zu erwerben und die Zeit herauszufinden gewußt hat, die unerläßlich ſind, um ein vollſtändiges Bild von Spitzbergen, ſeinen Meeren, ſeinen Eisbergen, ſeinem Klima und ſeinen Naturprodukten zu entwerfen. Um ſich eine richtige Vorſtellung von ſeiner Genauigkeit und ſeinem Scharfſinn zu machen, muß man geſehen haben, was er geſehen, und geprüft haben, was er geſchrieben. Gleich den Reiſen Sauſſure's, mit dem er die meiſte Aehnlichkeit in Rückſicht auf Scharfſinn der immer vorurtheilsfreien Beobachtungen und eine gewiſſe Schüchternheit in den gezogenen Schlüſſen hat, wird ſein Werk ſtets den Ausgangspunkt jeder wiſſenſchaftlichen Forſchung in den arktiſchen Meeren bilden. Die zahlreicheren und genaueren Reſultate, welche ſeine Nachfolger gewonnen haben, verdanken dieſe nicht ihren perſönlichen Eigenſchaften, ſondern den vollkommneren Inſtrumenten und den genaueren Methoden, welche die unaufhörlichen Fortſchritte der Phyſik zu ihrer Verfügung geſtellt haben. Desgleichen beobachten die Geologen, welche die Alpen durchſtreifen, keineswegs beſſer

*) An account of the arctic regions with an history and description of the Northern whalefishery, illustrated by twenty-four engravings. 2 vol. in 8°, 1820.

Digitized by Google

als Sauſſure, wiſſen aber mehr als er. Scoresby iſt der Sauſſure der arktiſchen Meere, und ich bin feſt überzeugt, daß alle diejenigen, welche die Alpen ſowohl wie das Eismeer beſucht haben, dies Urtheil beſtätigen werden.

Im Jahre 1807 machte der Shannon unter Kapitain Brocke eine Rekognoscirungsfahrt an den Weſtküſten von Spitzbergen, welche als Grundlage für die Geographie und Hydrographie dieſer Gegenden gedient hat.

Gedenken wir noch der erfolgloſen Reiſe der Dorothea, befehligt vom Kapitain David Buchan, und des Trent unter Lieutenant John Franklin, der vor zwanzig Jahren einen glorreichen Tod fand, indem er ſich beſtrebte, jene Nordweſtdurchfahrt zu entdecken, welche er ſelbſt, Roß und Parry ſo lange vergebens geſucht hatten. Die beiden Schiffe, den 27. Mai 1818 von den Shetlandinſeln abgegangen, erreichten den 80ſten Grad bei Spitzbergen. Die Eisſchollen bildeten einen unüberſteiglichen Wall; acht Tage zwiſchen dem Eiſe feſtgehalten, gingen ſie bei Fairhaven vor Anker. Ein zweiter Verſuch, bei dem ſie bis 80° 32′ hinaufgingen, fiel nicht glücklicher aus, und nachdem ſie einen furchtbaren Sturm inmitten der Eisberge ausgehalten, gewannen ſie die Bai von Smeerenberg wieder, blieben daſelbſt einen Monat, um ihre Seeſchäden auszubeſſern und kamen den 10. Oktober wieder in England an.

Dies Fehlſchlagen entmuthigte die engliſche Admiralität nicht: im Jahre 1823 ſandte ſie die Korvette Griper an die Küſten von Spitzbergen. Derſelbe wurde von Kapitain Clavering und Lieutenant Forſter befehligt und trug den Artilleriekapitain, nachmaligen General Sabine an Bord, welcher wichtige Experimente machen ſollte und auch in der That machte, nämlich mit dem Pendel für die Beſtimmung der Geſtalt und Dichte der Erde, mit dem Barometer für die Höhenmeſſung, ſodann mannichfaltige Beobachtungen über die Temperatur, Vegetation u. ſ. w. Der

Digitized by Google

Griper, im Mai von England abgegangen, verweilte in Fairhaven unter 79° 46′ n. Br. und kehrte die Oſtküſten von Grönland entlang zurück, welche vom 72. bis 76. Breitengrade erforſcht wurden.

Phipps und Scoresby hatten die Meinung verbreitet, daß die Schollen, welche alle Seefahrer bei ihren Verſuchen, den Nordpol zu erreichen, hinderten, eine ſchlichte Ebene bildeten, auf welcher man zu Fuß oder im Schlitten vordringen könnte. Edward Parry baute auf dieſe Vorſtellung. Er war erſt ſiebenunddreißig Jahre alt, hatte bereits vier Reiſen nach Norden gemacht und zwei Winter im Norden des Baffinsmeeres zugebracht, den einen auf der Melvilleinſel, den andern zu Port Bowen in der Prinzregentenſtraße; Niemand war alſo beſſer als er zu einer dergleichen Expedition gerüſtet. Den 27. März ging er auf dem Hekla unter Segel, legte bei Hammerfeſt an, rekognoſcirte den 14. Mai die Spitze von Hackluit, lief in die Magdalenabai ein und ließ nach wiederholtem Laviren nordwärts ſein Schiff in Heklacove, einer Nebenbucht von Treurenburgbai. Der Hekla blieb daſelbſt vom 20. Juni bis 28. Auguſt, während Parry mit ſeinen Booten und Schlitten auf den Eisſchollen nach dem Pole vorzubringen ſuchte; unglücklicher Weiſe wurden dieſelben nach Süden fortgeriſſen, während Parry und ſeine Gefährten nordwärts ihre Wanderung fortſetzten. Nach Verlauf von einunddreißig Tagen unerhörter Mühſeligkeiten und Beſchwerden befanden ſie ſich erſt unter 82° 44′ n. Br. Weiter auf dieſen Schollen vorzubringen, die keineswegs, wie Phipps und Scoresby von weitem geurtheilt hatten, eine glatte Fläche, ſondern eine Art von Gletſcher bildeten, der mit zackigen Spitzen beſäet und durch Spalten und Lücken, welche das Meer frei ließen, unterbrochen wurde, wäre unmöglich und unnütz zugleich geweſen, da die Schollen immer weiter nach Süden entwichen, je mehr Parry nach

Digitized by Google

Norden vordrang. So kam Parry den 20. Auguſt nach Heklacove zurück, nachdem er die meiſten der nördlichſten Inſeln von Spitzbergen beſucht hatte, nämlich: Low-island, Walden-island, die Inſel Moſſen und endlich Little-table-island und Ross-inlet, die nördlichſte von allen.

Parry's intereſſante Beſchreibung*) iſt mit einem Anhange verſehen, enthaltend: „Vier Monate meteorologiſcher Beobachtungen, angeſtellt in den Meeren von Spitzbergen zu Heklacove unter 79° 55′ n. Br. und während ſeines Ausfluges auf den Eisbänken, Meſſungen der Meerestemperatur bei verſchiedenen Tiefen, welche ich anderwärts**) beſprochen habe, ſowie eine Aufzählung der im nördlichen Theile von Spitzbergen von Roß, Forſter und Halſe, Offizieren des Hekla, beobachteten Pflanzen und Thiere."

Im ſelben Jahre, wo Parry mit ſeinem Verſuche ſcheiterte, befand ſich Keilhau, Profeſſor der Geologie zu Chriſtiania, in Hammerfeſt, nachdem er das norwegiſche Lappland beſucht hatte; dort traf er einen Deutſchen, Herrn von Lowenhigh, welcher ſoeben Rußland bereiſt hatte, nebſt zwei Engländern, den Herren Everest, an. Dieſe Herren beſchloſſen, nach Spitzbergen zu reiſen und bei der ruſſiſchen Niederlaſſung, welche ſich im Süden der öſtlichen im Jahre 1616 von den Holländern entdeckten und Staatenland genannten Inſel befindet, zu landen. Sie ſchifften ſich auf einer kleinen Brigg mit einer Bemannung von ſechs Leuten am 15. Auguſt ein. Am 20. landeten ſie bei Beeren-Eiland, wo ſie bis zum 22. blieben. Die Temperatur ſchwankte zwiſchen 3°, 1′ und 5°4′. Zwei Quellen, welche aus einer Kiesſchicht von drei Meter Dicke hervor-

*) An attempt to reach the North-pole. In 4°, 1818.

**) Mémoire sur les températures de la mer Glaciale (Voyages en Scandinavie et au Spitzberg de la Corvette la Recherche, Géographie physique, t. II. p. 279, et Annales de physique et de chimie, 1849).

Digitized by Google

ſprudelten, zeigten die eine 0°7, die andere 4°7. Keilhau ſammelte auf dieſer Inſel 28 Phanerogamen und 23 Kryptogamen. Am 27. befand ſich das Schiff ſechs Meilen von Ice-Sound, am 3. September beim Südkap von Spitzbergen. Nachdem ſie einen Sturm ausgehalten hatten, verwickelten ſie ſich in die Tauſend Inſeln, wo ſie Eis und eine beträchtliche Menge von Seehunden und Walroſſen antrafen, und nachdem ſie mühſam durch das Eis durchgedrungen, landete das Schiff den 10. September bei der Niederlaſſung, welche ſich an der Weſtküſte des Staatenlandes, auch das öſtliche Spitzbergen genannt, befindet. Das zur Aufnahme von dreißig bis vierzig Menſchen eingerichtete Haus war gerade ohne Bewohner. Keilhau ſammelte in der Umgegend ungefähr 26 Phanerogamen und 34 Kryptogamen und ſtellte zahlreiche geologiſche Beobachtungen an, welche er in ſeiner Reiſebeſchreibung*) niedergelegt hat.

Die chronologiſche Reihenfolge veranlaßt mich jetzt, von zwei Reiſen nach Spitzbergen zu ſprechen, welche ich als Mitglied der wiſſenſchaftlichen Commiſſion in den Jahren 1838 und 1839 gemacht habe. Dieſe Commiſſion beſtand aus den Herren Gaimard, Lottin, A. Bravais, X. Marmier, E. Robert, Mayer und mir. Die Recherche, ein zu Fahrten auf den nordiſchen Meeren eigens gebautes Schiff, befehligt von Herrn Fabvre, Schiffslieutenant, 1864 als Admiral geſtorben, war zu dieſer Reiſe auserſehen. Wir verließen Havre den 13. Juni 1838, den 26. liefen wir in den Fjord von Drontheim ein und den 27. lagen wir vor der alten Hauptſtadt Norwegens vor Anker. Die Korvette hielt ſich hier bis zum 3. Juli auf, den 13. lief ſie in die ſchöne Bai von Hammerfeſt, der nördlichſten Stadt Europas, ein. Den 15. Juli ſegelten wir

*) Reise i oest og vest Finmarken samt til Beeren-eiland og Spitzbergen. Christiania, 1831.

Digitized by Google

nach Spitzbergen ab. Folgenden Tags ſtießen wir auf eine Bank von Eisbergen, zwiſchen denen wir drei Tage lang herumfuhren; dieſe Eisberge dehnten ſich wahrſcheinlich bis Beeren-Eiland aus, ſie waren nicht ſehr hoch, da ſie die Schanzverkleidung des Schiffes nicht überragten. Der Umfang derſelben wich ungeheuer von einander ab und war ſelbſt annähernd ſchwer zu ſchätzen. Zuweilen iſt ein dem Anſchein nach ganz kleiner Eisberg nur die aus dem Waſſer hervorragende Spitze einer mächtigen Pyramide, von der vier Fünftel unter Waſſer ſind. Diejenigen, welche die Form eines Parallelepipeds haben, bieten eine große und ebene, ſelten durch Sand verunreinigte Fläche dar; die Schollen, welche beinahe gänzlich geſchmolzen ſind, nehmen die ſeltſamſten und gewundenſten Formen an. Man mußte um jeden Preis einen Zuſammenſtoß mit dieſen ſchwimmenden Maſſen vermeiden, auch hielt ſich der wachthabende Offizier immerfort auf dem Vordertheil des Schiffes, den Steuermann durch Zeichen bedeutend, die Ruderpinne auf Backbord oder auf Steuerbord zu ſetzen. Der beſtändige Tag begünſtigte unſere Fahrt, dichte Nebel aber hielten ſie oft auf. Der Offizier hatte Mühe, die Eisberge zu unterſcheiden, und da der Steuermann die Zeichen des Kommandanten nicht mehr bemerkte, ſo wurden die Ordres durch die Schiffsjungen überbracht, welche unaufhörlich zwiſchen dem Vorder- und Hinterdeck hin und her liefen.

Die Eisberge bieten ein Schauſpiel dar, an dem man ſich nie ſatt ſieht. Grotten und Höhlen, auf der Waſſerlinie durch die Wellen gebildet, ſind mit den ſchönſten laſurblauen Tinten gefärbt, und wenn bei etwas unruhiger See dieſe Eisberge von den Schlagwellen geſchaukelt werden, ſo bieten dieſe Tinten alle Nüancen vom reinſten Weiß bis zum Ultramarinblau dar. Sind die Blöcke zahlreich, ſo vernimmt man ein Kniſtern, ähnlich dem von elektriſchen Funken; daſſelbe rührt

Digitized by Google

wahrscheinlich gleich dem der Gletscher von den tausend und aber tausend Luftbläschen her, welche aus dem Eise aufsteigen, je mehr es bei der Berührung mit dem Wasser schmilzt. Den 24. Juli liefen wir in die Bai von Bell-Sound 77° 30′ n. Br. ein und blieben daselbst bis zum 4. August. Eine Menge Beobachtungen und zwei Reihen stündlich meteorologischer Ablesungen wurden dort vom 30. Juli bis 4. August angestellt. Eine Station war 5_{45} M. über dem Meere, die andere auf einem Berge Namens Slaadberg in einer Höhe von 564 Meter. Den 12. August lief die Korvette wieder in den Hafen von Hammerfest ein.

Im Jahre 1839 ging die Recherche abermals den 14. Juni von Havre ab und ankerte den 25. Juni vor Thorshavn, der Hauptstadt der Faröerinseln unter 62° 3′ n. Br. Am 12. Juli befand sich die Korvette wieder vor Hammerfest, und den 31. lief sie in die Magdalenenbai unter 79° 34′ n. Br. und 8° 49′ ö. L. ein. Vom 1. bis 12. August ward ununterbrochen 6 Meter über dem Meeresspiegel eine stündliche meteorologische Reihe angestellt. Alle Ausschußmitglieder und Offiziere verwandten jeden Augenblick in nutzbringender Weise. Die Abwesenheit der Nacht verdoppelte die Arbeitszeit. In dem großen auf Veranstaltung des Marinedepartements herausgegebenen Werke findet man die Ergebnisse dieser und derjenigen Studien, welchen sich zwei Mitglieder der Kommission, die Herren Lottin und Bravais und zwei schwedische Gelehrte, die Herren Lilliehöck und Siljeström überließen, welche den Winter von 1838 auf 1839 zu Bossekop in Lappland unter 70° n. Br. und 21° 10′ ö. L. zubrachten. *)

Seit dieser Zeit sind noch zwei wissenschaftliche Reisen nach

*) Voyages en Scandinavie et au Spitzberg de la corvette la Recherche 41 volumes in 8°, avec atlas.

Digitized by Google

Spitzbergen unternommen worden, die erste im Jahre 1858 vom Professor Nordenskjöld von Helsingfors, die zweite von einer schwedischen Kommission. Im Jahre 1861 schiffte Herr Nordenskjöld, von den Herren Torell und Quennerstedt begleitet, die Westküste entlang und erreichte Smeerenberg, nachdem er sämmtliche zwischen Hornsound und der Amsterdamer Insel belegenen Fjorde besucht hatte. Diese Herren verweilten zwei Monate auf Spitzbergen. Die Einzelheiten dieser Reise sind mir nicht bekannt. Die schwedische Expedition hat hauptsächlich den Norden Spitzbergens untersucht, nämlich die Straße von Van Hinlopen, welche es vom Nordostlande trennt, die äußerste Nordspitze eben dieses Nordostlandes und die Reihe von Inselchen, welche sich nach dem Pole zu erstreckt. Wir werden aus den von den Mitgliedern dieser Kommission, den Herren Nordenskjöld, Malmgrén, Chydenius, Blomstrand, Dunér und Torell vollbrachten Arbeiten Nutzen ziehen, doch ist der Reisebericht, durch den frühzeitigen Tod des Doktors Chydenius unterbrochen, noch nicht erschienen. Eine bedeutende Anzahl von Resultaten ist jedoch bereits in schwedischer Sprache und in den Geographischen Mittheilungen von Petermann erschienen. Herr Nordenskjöld hat die im Norden von Spitzbergen, auf dem Nordostlande und auf den Sieben Inseln gemachten astronomischen Bestimmungen bekannt gemacht. Derselbe hat im Verein mit Blomstrand eine geologische Karte von diesem Theil des Archipels geliefert. Die magnetischen Beobachtungen rühren von Chydenius her, auch hat derselbe die Punkte vorgezeichnet, welche zur Messung eines Meridianbogens dienen könnten, der, zwischen dem 79° 8′ und 80° 50′ n. Br. liegend, von höchster Bedeutung für die genauere Bestimmung der Abplattung der Erde sein würde. Malmgrén hat ein Verzeichniß der Säugethiere, der Vögel und Pflanzen von Spitzbergen, und Torell einen allgemeinen Ueberblick über die physische Geographie der arktischen

Digitized by Google

Gegenden gegeben. Wir beschließen hiermit diese kurze Darlegung der hauptsächlichsten Forschungsreisen nach Spitzbergen, um zur Beschreibung dieses Landes überzugehen.

Klima von Spitzbergen.

Wenn man bedenkt, daß die Sonnenhöhe auf Spitzbergen selbst in den südlichsten Theilen nie 37 Grad übersteigt, daß ihre schrägen Strahlen, eine ungeheuer dicke Atmosphäre durchbrechend, erst zur Erde gelangen, nachdem sie fast alle ihre Wärme verloren haben, und die Oberfläche des Bodens so zu sagen bestreichen, statt, wie in den heißen Ländern, senkrecht auf sie herabzufallen; wenn man ferner dazu nimmt, daß sich vom 26. Oktober bis zum 16. Februar das Gestirn nicht mehr zeigt, und daß eine viermonatliche Nacht diese eisige Erde einhüllt; wenn man bedenkt, daß während der Periode von 128 Tagen, in der die Nacht mit dem Tageslicht abwechselt, die Sonne sich kaum über den Horizont erhebt, so wird man es begreiflich finden, daß das Klima von Spitzbergen eines der strengsten ist, die es giebt. Die beständige Anwesenheit der Sonne vier Monate des Jahres hindurch wiegt nicht seine Abwesenheit während eines eben so langen Zeitraumes noch die Schrägheit seiner Strahlen auf; selbst während der Monate Juli und August wird sie zumeist durch Nebel, die sich aus dem Meere erheben, verdunkelt. Nie ist der Himmel einen ganzen Tag lang heiter. Dazu bringen heftige, durch die Eisbänke oder durch die Gletscher abgekühlte Winde in kurzen Intervallen die Temperatur der Atmosphäre zum Fallen. Nichtsdestoweniger ist das Klima von Spitzbergen weniger kalt als das der nördlichen, unter demselben Breitengrade gelegenen Gegenden von Amerika, nämlich des äußersten Endes der Baffinsbai, unter dem Namen Smithsound bekannt. In diese Gegenden haben

Digitized by Google

die Meteorologen den Kältepol der nördlichen Halbkugel verlegt, der keineswegs mit dem der Erde zusammenfällt, sondern sich in Amerika unter dem 98° w. L. und unter dem 78° n. Br. befindet. Wenn das Klima von Spitzbergen weniger streng als das der Festlandgegenden ist, so kommt dies auch daher, weil Spitzbergen ein Inselmeer ist, dessen Gewässer durch den Golfstrom erwärmt werden, eine mächtige Strömung warmen Wassers, die im Golf von Mexiko ihren Ursprung nimmt, den Atlantischen Ozean durchschneidet und im Weißen Meere und an den Westküsten von Spitzbergen endet. Auch sind diese im Sommer beständig frei, während die Ostküsten, von Eisbergen umlagert, selten für die Robben- und Walroßfänger, die allein diese öden Striche besuchen, zugänglich sind.

Ich will den Leser nicht mit den Methoden ermüden, die ich angewandt, und den Berechnungen, die ich angestellt habe, um die Mitteltemperaturen von Spitzbergen in Zahlen auszudrücken. Ich habe mir dabei die Beobachtungen von Phipps, Parry, Scoresby und des wissenschaftlichen Nordausschusses auf Spitzbergen und in Lappland zu Nutze gemacht. Da meine Resultate merklich mit denen, welche Scoresby aus seinen eigenen Beobachtungen abgeleitet hat, übereinstimmen, so verdienen die erlangten Zahlen das Vertrauen der Gelehrten. Gleich ihm habe ich die Temperaturen für den mittlern unter dem 78° n. Br. gelegenen Theil der Insel berechnet. Die nachfolgende Tabelle stellt die mittleren Temperaturen eines jeden Monats in hunderttheiligen Graden ausgedrückt dar. Damit der Leser sich eine richtige Vorstellung von der Strenge dieses Klimas machen könne, setze ich daneben die entsprechenden Temperaturen für Paris, von Herrn Renou berechnet und auf fünfundvierzigjährige (von 1816 bis 1860 laufende), auf der Sternwarte von Paris angestellte Beobachtungen gestützt.

Digitized by Google

Mittlere Monatstemperaturen auf Spitzbergen unter dem 78. Breitengrade und zu Paris unter 48° 50′ n. Br.

	Spitzbergen.	Paris.
Januar . . .	— 18°,2	2°,3
Februar . . .	— 17°,1	3°,9
März	— 15°,6	6°,3
April	— 9°,9	10°,0
Mai	— 5°,3	13°,8
Juni	— 0°,3	17°,3
Juli	+ 2°,8	18°,7
August	+ 1°,4	18°,5
September . .	— 2°,5	15°,5
Oktober . . .	— 8°,5	11°,2
November . . .	— 14°,5	6°,6
Dezember . . .	— 15°,0	3°,5

Die mittlere Jahrestemperatur beträgt demnach — 8°,6, während die von Paris + 10°,6, so daß der Unterschied sich auf 19 Grad beläuft.

Die mittleren Temperaturen genügen jedoch nicht, um sich eine richtige Vorstellung von einem Klima zu machen, denn ein und dasselbe Mittel kann sehr verschiedenen Extremen entsprechen. Hier einige extreme auf Spitzbergen vom Monat April bis August beobachtete Temperaturen. Im April hat Scoresby das Thermometer auf dem Meere nicht über — 1°,1 stehen sehen. Im Mai betrug die höchste Temperatur + 1°,1. Nur sechs Mal stieg das Thermometer über den Gefrierpunkt. Der Mai ist also noch ein Wintermonat. Im Juni geht das Quecksilber oft über die Null der thermometrischen Skala hinaus und Scoresby hat es + 5°,6 zeigen sehen, im Jahre 1810 aber ist es noch bis zu — 9°,4 heruntergegangen. Im Juli

Digitized by Google

habe ich es nie über 5°,7 steigen, noch unter 2°,7 fallen sehen; man ersieht daraus, daß die Temperatur eine auffallende Gleichförmigkeit besitzt, da sie nur um 3 Grad wechselt. Dieselbe Erscheinung im August, wo ich unterm 78° n. Br. das Thermometer auf dem Meere zwischen 1°,2 u. 3°,0 habe schwanken sehen. Um eine Vorstellung von der Abwesenheit der Wärme auf Spitzbergen zu geben, will ich bemerken, daß während eilf Jahren, von 1807 bis 1818, Scoresby nur ein einziges Mal, den 29. Juli 1815, das Thermometer auf 14°,4, Parry den 19. Juli 1827 auf 12°,8 und ich selbst im August 1838 auf 8°,2 habe stehen sehen. Die höchste Temperatur, 16°,0, ist den 15. Juli 1861 von der schwedischen Expedition notirt worden. Was die Kälte anbetrifft, so besitzen wir keine genauen Angaben für den Winter; doch ist es wahrscheinlich, daß das Queckſilber alsdann zuweilen gefriert und daß das Thermometer sich oft zwischen — 20 und — 30 Graden hält, denn Scoresby hat noch den 18. April 1810 — 17°,8, ja den 13. Mai 1814 — 18°,9 beobachtet. Schnee fällt in allen Monaten des Jahres. Als die Korvette Recherche unter 79° 34′ n. Br. in der Magdaleneubai vor Anker lag, war sie in den ersten Tagen des August 1839 davon bedeckt. In Scoresby's Tagebuche kommt kein Monat vor, wo er nicht angezeigt wäre. Das Wetter ist von auffallender Unbeständigkeit. Auf vollkommene Meeresstille folgen oft heftige Windstöße; der Himmel, einige Stunden lang heiter, bedeckt sich mit Wolken, die Nebel halten fast beständig an und sind von einer Dichtigkeit, daß man die Gegenstände auf ein paar Schritt vor sich nicht erkennt; diese Nebel, feucht, kalt und durchdringend, durchnässen oft wie Regen; Gewitter sind in diesen Strichen, selbst während des Sommers, unbekannt; nie unterbricht das Rollen des Donners die Stille dieser öden Meere. Beim Nahen des Herbstes nehmen die Nebel zu, der Regen verwandelt sich in

Digitized by Google

Schnee, und während die Sonne sich immer weniger über den Horizont erhebt, nimmt der Glanz derselben immer mehr ab. Am 23. August geht das Gestirn zum ersten Male im Norden zu Rüste, diese erste Nacht ist weiter nichts als eine verlängerte Dämmerung; von diesem Augenblick an aber nimmt die Tageslänge sehr rasch ab. Endlich, den 26. Oktober, steigt die Sonne in's Meer hinab, um nicht wieder zum Vorschein zu kommen. Eine Zeit lang erleuchtet noch der Abglanz einer Morgenröthe, die nicht mehr den Tag verkündet, den Himmel in der Nähe der Mittagsgegend; diese Dämmerung aber wird immer kürzer und matter, bis sie endlich gänzlich erlischt. Alsdann ist der Mond das einzige Gestirn, welches die Erde erleuchtet, und sein bleiches, vom Schnee zurückgeworfenes Licht enthüllt das traurige Düster dieser unter dem Schnee begrabenen Erde und dieses vom eisgeronnenen Nebel verschleierten Meeres.

Den Mondschein aber ersetzt ein anderer Schein, nämlich der des Nordlichts, das, stark oder schwach, sich allnächtlich dem aufmerksamen Beobachter zeigt. Bald ist es ein einfacher, zerstreuter Schimmer oder leuchtende Flecken, bald sind es zitternde Strahlen von blendender Weiße, welche das ganze Firmament vom Horizont aus durcheilen, als ob ein unsichtbarer Pinsel über das Himmelsgewölbe führe; zuweilen hält derselbe inne, die unvollendeten Strahlen erreichen den Zenith nicht, doch setzt sich das Nordlicht an einem andern Punkte fort, ein Strahlenbündel schießt hervor, breitet sich fächerförmig aus, erbleicht sodann und erlischt. Ein anderes Mal wallen lange goldne Vorhänge über dem Haupte des Beschauers, verschlingen sich tausendfach in sich selbst und blähen sich, als ob der Wind hineinbliese. Anscheinend liegen sie ganz niedrig in der Atmosphäre, und man wundert sich, nicht das Anschlagen der Falten zu vernehmen, welche über einander gleiten. Zumeist zeichnet sich ein leuchtender Bogen gegen Norden ab, ein schwarzer Kreisabschnitt trennt ihn

Digitized by Google

vom Horizont und bildet durch seine dunkle Farbe einen lebhaften Gegensatz zu dem Bogen von blendendem Weiß oder glänzendem Roth, welcher die Strahlen entsendet, sich ausdehnt, theilt und alsbald einen leuchtenden Fächer darstellt, welcher den nördlichen Himmel erfüllt, allmälig zum Zenith emporsteigt, wo die Strahlen, sich vereinigend, eine Krone bilden, die ihrerseits leuchtende Strahlen nach allen Richtungen hin entsendet. Nun scheint der ganze Himmel eine Feuerkuppel zu sein; Blau, Grün, Roth, Gelb, Weiß spielen in den zuckenden Strahlen des Nordlichts. Dieses prächtige Schauspiel währt jedoch nur wenige Augenblicke. Erst hört die Krone auf, leuchtende Strahlen zu werfen, und wird dann allmälig immer schwächer, ein breiter Schimmer erfüllt den Himmel, hier und da zeigen sich leuchtende, leichten Wölkchen vergleichbare Flecken, die sich mit unglaublicher Schnelligkeit wie ein klopfendes Herz ausdehnen und zusammenziehen. Bald erbleichen auch sie, Alles vermischt und verwischt sich, Aurora scheint im Todeskampf zu ringen. Die Gestirne, welche ihr Schein verdunkelt hatte, funkeln in erneutem Glanze, und die lange, düstere und tiefe Polarnacht herrscht abermals ausschließlich über den eisigen Einöden von Land und Ozean. Vor solchen Phänomenen beugen sich Dichter und Künstler und gestehen ihre Ohnmacht ein, nur der Gelehrte verzweifelt nicht; nachdem er dies Schauspiel bewundert hat, studirt, analysirt, vergleicht, ergründet er es und gelangt zu dem Beweise, daß diese Nordlichter von den elektrischen Strahlungen der Pole der Erde herrühren, die gleichsam einen riesigen Magnet bildet, dessen Nordpol sich im Norden von Nordamerika nicht weit vom Kältepol unserer Halbkugel befindet, während sein Südpol im Meere südlich von Australien bei dem von James Roß entdeckten Victorialande liegt.

Einige Hinweise werden genügen, um die elektromagnetische Natur des Nordlichtes zu beweisen. Auf Spitzbergen dreht sich

Digitized by Google

eine, an einem ungezwirnten Seidenfaden horizontal aufgehängte Magnetnadel nach Westen; sofort nach Eintritt des Nordlichts bemerkt der Physiker, welcher diese Nadel beobachtet, daß sie, statt sich merklich regungslos zu verhalten, einer ungewohnten Unruhe verfallen zu sein scheint und schnell von der Rechten zur Linken und von der Linken zur Rechten schwingt. Je glänzender das Nordlicht wird, desto mehr nimmt die Bewegung der Nadel zu, und ohne aus seinem Kabinet herauszutreten, beurtheilt der Beobachter die Intensität des Nordlichts nach der Abweichung der Nadelschwingungen. Endlich, wenn die Nordlichtkrone sich bildet, befindet sich ihr Mittelpunkt genau über der Verlängerung einer andern frei über einem Dopp schwebenden und in der Richtung des magnetischen Meridians orientirten Magnetnadel; dieselbe ist keineswegs horizontal, sondern dem magnetischen Pole zugeneigt und heißt die Inklinations- oder Neigungsnadel. Die Nordlichte hängen demnach auf's innigste mit den magnetischen Erscheinungen des Erdballs zusammen und einem berühmten Physiker, Herrn Auguste de la Rive, war es vorbehalten, auf experimentalem Wege die hauptsächlichsten Phänomene des Nordlichts an einer den Erdball darstellenden und angemessen elektrisirten Holzkugel auszuführen.

Fast alle Polarnächte sind durch mehr oder weniger glänzende Nordlichter erhellt, jedoch von Mitte Januars ab wird die Mittagsdämmerung merklicher, die Morgenröthe, welche die Rückkehr der Sonne ankündet, nimmt zu und steigt zum Zenith empor. Endlich, den 16. Februar, strahlt ein Abschnitt der Sonnenscheibe, ähnlich einem leuchtenden Punkte, einen Augenblick lang, um sogleich wieder zu erlöschen; mit jedem Mittage aber vergrößert sich der Abschnitt, bis der ganze Ball sich über dem Meere erhebt; damit hat die lange Winternacht ihr Ende erreicht. Nun lösen sich Tag und Nacht fünfundsechzig Tage lang bis zum 21. April ab, welcher den

Digitized by Google

Anfang eines vier Monate langen Tages bildet, während dessen die Sonne sich um den Horizont dreht, ohne je unter demselben zu verschwinden. Gehen wir zur physischen Beschreibung von Spitzbergen über.

Physische und geologische Beschaffenheit von Spitzbergen.

Spitzbergen — so lautet der Name, welchen die holländischen Seefahrer diesen Inseln nach Entdeckung derselben verliehen, und in der That sieht man vom Meere aus, so weit das Auge reicht, nichts als spitze Bergzacken. Diese Berge sind nicht sehr hoch, ihre Höhe schwankt zwischen 500 und 1200 Meter, überall treten sie bis dicht an den Rand des Meeres heran, und im Ganzen ist nur ein schmaler Landstreifen vorhanden, der den Strand bildet. An den beiden äußersten Enden der Insel, im Norden und Süden ist der Boden weniger uneben, die Thäler sind breiter, und das Land nimmt das Aussehen einer Hochebene an. Die Westküste Spitzbergens wird von drei jener tiefen und verzweigten Buchten eingeschnitten, welche die Norweger Fjorde nennen. Es sind von Süden nach Norden Hornsound, die Hornbucht, Bellsound, die Glockenbucht, Icesound, die Eisbucht, Croßbay, die Kreuzbucht, Kingsbay, die Königsbucht. Die Hamburger und Magdalenen-Bucht sind weniger tiefe und verzweigte Meerbusen.

Sämmtliche Thäler, sowohl im Norden wie im Süden Spitzbergens, sind mit Gletschern angefüllt, welche bis an's Meer hinabreichen. Die Länge derselben ist veränderlich; der längste, den ich gesehen, der von Bellsound, maß 18 Kilometer Länge auf 6 Kilometer Breite, der im Hintergrunde der Magdalenenbai 1840 Meter Länge auf 1580 Meter Breite am Meeresstrande. Nach Scoresby sind die beiden größten Gletscher der des Südkaps und ein anderer im Norden von Hornsound, welche alle beide 20 Kilometer Breite am Rande des Meeres

Digitized by Google

und eine unbekannte Länge haben. Die sieben Gletscher, welche an die Küste im Norden der Insel Prinz Karl herantreten, haben jeder beinahe 4 Kilometer Breite. Alle diese Gletscher bilden an ihrem äußersten untern Ende große Eismauern oder Eisböschungen, welche sich senkrecht über dem Wasser in einer zwischen 30 und 120 Meter wechselnden Höhe erheben. Als die ersten holländischen und englischen Seefahrer diese riesigen Eiswände, welche die Höhe ihrer Masten überragten, zu Gesicht bekamen, bezeichneten sie dieselben mit dem Namen Eisberge (icebergs), die Verwandtschaft derselben mit den Gletschern im Innern des Festlandes nicht ahnend; der Name ist ihnen geblieben, und Phipps, Parry, ja selbst Scoresby erkannten nicht die Natur dieser Eisströme, welche sich vor ihren Augen in das Meer ergossen. Als ich zum ersten Male, im Jahre 1838, auf Spitzbergen landete, erkannte ich sofort die Gletscher, welche ich so oft in der Schweiz bewundert hatte, wieder; der Ursprung beider ist derselbe, die Verschiedenheiten aber hängen vom Klima, von der Nähe des Meeres und der geringen Erhebung der Gebirge von Spitzbergen ab.

Ein Gletscher bildet sich durch Anhäufung von Schneemassen während des Winters der kalten Länder in einer Ebene, einer Bodensenke oder einem Thale. Dieser Schnee schmilzt zum Theil im Sommer, gefriert wieder, schmilzt von neuem, wird vom Wasser durchsickert, gefriert vollends mit Eintritt des Winters und verwandelt sich so erst in Firn, dann in mehr oder weniger festes, immer aber noch von den zahlreichen Luftbläschen, welche in den Schneelücken saßen, angefülltes Eis. Diese Eismassen, welche die Einbildungskraft sich versucht fühlen könnte zu Sinnbildern der vollkommensten Regungslosigkeit und Starrheit zu machen, sind mit einer fortrückenden Bewegung begabt, welche von ihrer Plasticität und dem Drucke der obern Theile herrührt. Diese langsame, aber ununterbrochene, im Sommer

Digitized by Google

ſchnellere, im Winter langſamere Bewegung ſchiebt das untere Ende des Gletſchers unaufhörlich vorwärts. In der Schweiz ragt dieſes untere Ende oft in die bewohnten Thäler, wie die von Chamounix, von Montjoie und Val Veni um den Montblanc, von Zermatt, Saas und Greſſoney um den Monte Roſa, von Grindelwald am Fuße der Berner Hochalpen, herein. Auf Spitzbergen gelangt der Gletſcher nach einer mehr oder weniger langen Reiſe an's Meer. Iſt das Ufer geradlinig, ſo überſchreitet er daſſelbe nicht; in der Tiefe einer Bucht aber, deren Geſtade gekrümmt iſt, rückt er weiter vor, indem er ſich auf die Seiten der Bucht ſtützt und, über dem Waſſer hängend, fortſchreitet. Man begreift leicht warum. Im Sommer beſitzt das Seewaſſer im Hintergrunde der Buchten immer eine Temperatur etwas über Null; der Gletſcher ſchmilzt bei der Berührung mit dieſem Waſſer, und bei Ebbe bemerkt man zwiſchen dem Eiſe und der Oberfläche des Waſſers einen Zwiſchenraum. Der Gletſcher, nun nicht mehr unterſtützt, ſtürzt theilweiſe ein, ungeheure Blöcke löſen ſich ab, fallen in's Meer, verſchwinden unter dem Waſſer, kommen wieder zum Vorſchein, indem ſie ſich um ſich ſelbſt drehen, und ſchwanken einige Augenblicke, bis ſie ihre Gleichgewichtslage eingenommen haben. Dieſe von den Gletſchern losgelöſten Blöcke bilden die Eisberge. Zweimal täglich wohnten wir bei Ebbe im Hintergrunde von Bellſound und Magdalenenbai dieſem theilweiſen Einſtürzen des äußerſten Gletſcherendes bei. Ein donnerähnliches Getöſe begleitete ſeinen Fall, das aufgewühlte Meer, einen Strudel bildend, trat über das Ufer, die Bucht bedeckte ſich mit ſchwimmenden Eismaſſen, die, durch die Ebbe fortgeriſſen, Flotten gleich aus der Bai ausliefen, um das offene Meer zu gewinnen oder auch an Punkten, wo das Waſſer eben nicht tief war, auf den Strand trieben. Dieſe Eisberge hatten nicht mehr als 4 bis 5 Meter Höhe über dem Waſſer, denn vier Fünftheile eines Eisberges ſind in's

Digitized by Google

Wasser getaucht. Die Eisberge der Baffinsbai sind bei weitem höher, sie überragen zuweilen die Masten der Schiffe; in dieser Bucht ist die Meerestemperatur aber auch unter Null, der Gletscher schmilzt nicht bei der Berührung mit dem Wasser, er geht bis auf den Grund des Meeres hinab, und die Theile, welche sich von demselben ablösen, sind um den ganzen untergetauchten Theil höher, der in den Baien von Spitzbergen durch die Schmelzung zerstört wird.

Die Gletscher von Spitzbergen sind im Allgemeinen glatt und weisen selten jene Eisnadeln, jene Prismen auf, welche die Reisenden auf dem Glacier des Bossons, auf dem von Talèfre bei Chamounix und auf anderen Schweizer Gletschern bewundern. Diese mit Nadeln besäeten Flächen entsprechen immer jähen Bodensenkungen, auf welchen der Gletscher bricht, und gleichsam kaskadenartig über sehr geneigte Flächen herabfällt. Befinden sich diese am untern Ende des Gletschers, so schmilzt, verdünnt und spitzt die mächtige Sonnenhitze diese Nadeln und Prismen aus, die alsdann die malerischsten Formen annehmen. Auf Spitzbergen sind die Abhänge schwach und gleichförmig, und die Sommerwärme ist unvermögend, das Eis zu schmelzen. Nur Mittags ist die Oberfläche des Gletschers von kleinen Wasserfäden überlaufen, welche zuweilen als Sturzbäche in's Meer fallen, aber gestehen, sobald die Sonne aufhört zu scheinen oder die Temperatur sinkt; doch habe ich auf den Seitentheilen des großen Gletschers von Bellsound Nadeln bemerkt, dagegen gab es keine mehr auf dem der Magdalenenbai im Norden von Spitzbergen. Gleich den Schweizer Gletschern bieten die Gletscher dieser Inseln oft sehr breite und tiefe Querspalten dar.

Die im Glacier du Bois bei Chamounix ausgehöhlte blaue Grotte des Arveyron, die der Gletscher von Grindelwald und Rosenlaui im Kanton Bern, welche von den Touristen so sehr

Digitized by Google

bewundert werden, sind Miniaturen im Vergleich zu den in der Endböschung der Gletscher von Spitzbergen geöffneten Höhlen. Eines Tages, als ich vor dem Gletscher von Bellsound Meerestemperaturen aufgenommen hatte, schlug ich den mich begleitenden Matrosen vor, mit dem Boote in eine dieser Höhlen einzudringen. Ich setzte ihnen die Gefahren auseinander, welche wir laufen würden, da ich nichts ohne ihr Gutheißen wagen wollte. Einstimmig nahmen sie meinen Vorschlag an. Als unser Nachen den Eingang passirt hatte, befanden wir uns in einem ungeheuren gothischen Dome; lange Eiszapfen mit kegelförmiger Spitze hingen vom Gewölbe herab, die Einbiegungen schienen eben so viele zum Hauptschiff gehörige Kapellen zu sein, breite Spalten trennten die Wände, und die vollen Zwischenpfeiler strebten gleich Bogen zur Wölbung empor; lasurblaue Tinten spielten auf dem Eise und spiegelten sich im Wasser wieder. Die Matrosen, lauter Bretagner, waren, wie ich selber, stumm vor Bewunderung. Eine zu sehr in die Länge gezogene Betrachtung wäre jedoch gefährlich gewesen, wir gewannen alsbald die enge Oeffnung wieder, durch die wir in diesen Tempel des Winters eingedrungen waren, und wieder an Bord der Korvette angelangt, beobachteten wir Stillschweigen über ein Wagestück, das mit Recht getadelt worden wäre. Abends sahen wir vom Strande aus unsere Kathedrale vom Morgen sich langsam senken, dann vom Gletscher ablösen, in die Wellen tauchen und, in tausend Eisstückchen zerbröckelt, welche die fallende Fluth mit sich in's offene Meer führte, wieder zum Vorschein kommen.

Alle Reisenden, welche die Alpengletscher gesehen haben, sind von der großen Anzahl von Felsblöcken überrascht worden, welche auf der Oberfläche derselben umher liegen. Diese Blöcke kommen von den benachbarten Bergen, die Sommers wie Winters einstürzen und den Gletscher mit Trümmern bedecken; je höher die Berge sind, welche ihn beherrschen, desto zahlreicher

Digitized by Google

ſind die Trümmer. Dieſe Haufen zerſchmetterter Felsblöcke, Moränen genannt, ſind nicht auf's Geradewohl zerſtreut; die einen bilden lange, ſichtlich parallel und längs der Gletſcherränder hinlaufende Reihen, dies ſind die Seitenmoränen; die andern nehmen den mittlern Theil des Eisfeldes ein, man nennt ſie Mittelmoränen; ſie entſtehen aus der Verſchmelzung von Seitenmoränen zweier Gletſcher, welche ſich zu einem einzigen vereinen. Ganz ſo erkennt man bei der Vereinigung zweier Flüſſe, deren Waſſer von verſchiedener Farbe iſt, in der Mitte des durch die Vereinigung der beiden Flüſſe gebildeten Stromes eine Färbung, welche von der Miſchung des Waſſers beider Zuflüſſe herrührt. In ſeinem unaufhaltſamen Vorrücken reißt der Gletſcher, wie ein Strom die Trümmer, welche er trägt, mit ſich fort; am äußerſten Ende angelangt, fallen dieſe Trümmer eines nach dem andern am Fuße des Gletſchers zu Boden. Die Anhäufung derſelben bringt am ſteilen Gletſcherende einen concentriſchen Wall hervor, dieſer Wall heißt Endmoräne. In der Schweiz ſind gewiſſe Gletſcher, wie der der Unteraar, das Eismeer von Chamounix, der Glacier du Miage, der von Zmutt bei Zermatt, mit Felsblöcken bedeckt, unter denen das Eis faſt vollſtändig verſchwindet; das rührt daher, daß dieſe Gletſcher von ſehr hohen Bergen beherrſcht werden, welche aus Felſen beſtehen, die ſich beſtändig ſpalten, zerſplittern und einſtürzen. Auf Spitzbergen dagegen ſind die Berge bei geringer Höhe ſo zu ſagen unter den Gletſchern vergraben, nur ihre Spitze ragt aus den ſie umgebenden Eismaſſen hervor, ſo daß nur wenig Trümmer auf die Gletſcher fallen. Daraus geht hervor, daß die Moränen minder beträchtlich ſind. Fügen wir noch hinzu, daß die Gletſcher von Spitzbergen dem obern Theile der Schweizer Gletſcher entſprechen, demjenigen, welcher ſich über der Grenze des ewigen Schnees oder, wenn man lieber will, über der Grenze der

Digitized by Google

Baumvegetation befindet. Je höher man nun einen Gletscher in den Alpen hinanklimmt, desto mehr nehmen die Seiten- und Mittelmoränen an Breite und Mächtigkeit ab, bis sie dünner werden und endlich unter dem hohen Firn der Kesselthäler verschwinden, wovon der Gletscher nur ein Ausfluß ist, sowie die Bergströme ihren Ursprung oft aus einem oder mehren übereinander liegenden Seen herleiten. Aus allen diesen Gründen zeigen sich die Seiten- und Mittelmoränen auf den Gletschern von Spitzbergen wenig; eine gewisse Anzahl von Blöcken bemerkt man wohl an den Rändern und zuweilen in der Mitte, doch verschwindet das Eis nie wie in den Alpen gänzlich unter der Trümmermasse, welche es bedeckt. Was die Endmoränen betrifft, so muß man sie auf dem Meeresgrunde suchen, da die Endböschung fast immer über demselben hängt, so daß die Felsblöcke mit den Eisblöcken fallen und einen unterseeischen Stirnwall bilden, dessen beide äußerste Enden zuweilen auf dem Strande sichtbar sind. Herr O. Torell hat bemerkt, daß überall in der Nähe der Küste von Spitzbergen der Grund des Meeres aus Blöcken und Kieseln, selten aus Sand oder Schlamm bestand. Derselbe Beobachter hat auf den Gletschern von Spitzbergen alle auf denjenigen der Alpen bemerkten Eigenthümlichkeiten angetroffen: die Schichtung des Eises, die blauen Streifen und die Einwirkung auf die einschließenden Felsen, welche gerundet, geglättet und geriefelt werden, wie die der Schweiz.

Da die Gletscher bis zum Meere heruntergehen, so giebt es auf Spitzbergen weder Ströme noch Flüsse; einige unbedeutende Bäche entschlüpfen zuweilen den Seiten des Gletschers, versiegen aber oft; da der Boden in der Tiefe von einigen Decimetern stets gefroren ist, so sind Quellen auf diesen Inseln unbekannt.

Die Geologie der Westküsten von Spitzbergen ist von Keilhau, den Mitgliedern der französischen Kommission und in

Digitized by Google

jüngster Zeit von den Herren Nordenskjöld und Blomstrand erforscht worden. Ohne in die für den Leser wenig anziehenden Einzelheiten einzugehen, will ich nur bemerken, daß die Gebirge von Spitzbergen im Ganzen aus krystallinischem Gestein gebildet sind. Der Granit ist darunter sehr allgemein. Die Sieben Inseln im Norden des Archipels sind durchaus granitisch. Der Granit ist also diejenige Felsart, woraus die letzten Erdstriche im Norden Europas bestehen. Weiter im Süden kommen zuweilen dolomitische Kalkarten vor, welche wahrscheinlich den untern Stufen der Flötzgebirge angehören und von Gängen hypersthenischer Gesteine, einer sehr seltenen Porphyrart, die man nur in Skandinavien und auf Labrador antrifft, durchsetzt sind. An andern Punkten hat man dasselbe Gestein vorgefunden, in der Hinlopenstraße aber und in der Nähe von Bellsound bemerkt man fossilhaltige Kalkarten. Nach Besichtigung der Versteinerungen hat Herr de Koninck sie in das permische System verwiesen, eine Formation, welche auf dem Steinkohlengebirge ruht und ihren Namen vom Gouvernement Perm in Rußland hat. In der Königsbai (Kings-bay) hat Herr Blomstrand das Steinkohlengebirge mit Brennstoffspuren nachgewiesen. Man begreift all' die Schwierigkeiten, auf welche der Geolog in einem mit Eis und Schnee bedeckten Lande stößt. Doch kann man nach den Anzeichen, welche wir besitzen, behaupten, daß Spitzbergen den alten Formationen des Erdballs, also den seit der Urzeit der Erde aufgetauchten Ländern angehört, wo all' die Gebirgsarten fehlen, welche den verschwundenen ungeheuren Meeresbecken entsprechen, in denen sich die Jura-, Kreide- und Tertiärschichten abgelagert haben.

Flora von Spitzbergen.

Nach dem Gemälde, welches wir vom Klima und der physischen Beschaffenheit Spitzbergens entworfen haben, muß die

Digitized by Google

Ueberschrift dieses Kapitels unwahrscheinlich klingen. Welche Vegetation kann es in einem mit Eis und Schnee bedeckten Lande geben, wo die mittlere Sommertemperatur nur + 1°,3 beträgt, also niedriger ist als die des Januars in Paris? Giebt es Pflanzen, die fähig sind, unter derartigen Boden- und Klimaverhältnissen zu leben und sich fortzupflanzen? Trotzdem bemerkt man beim Landen auf Spitzbergen hier und da gewisse günstig gelegene Plätze, wo der Schnee verschwunden ist. Diese inmitten der sie umringenden Firnfelder zerstreut liegenden Erdinseln scheinen zuerst vollständig nackt zu sein, kommt man aber näher, so unterscheidet man kleine mikroskopische Pflanzen, gegen den Boden gedrückt, in den Spalten desselben verborgen, an den südlichen Abhängen angeschmiegt, durch Steine geschützt oder zwischen den kleinen Moosen und grauen, die Felsen bekleidenden Flechten verloren. Die feuchten Senken, von großen Moosen vom schönsten Grün bedeckt, laben das von der schwarzen Farbe der Felsen und dem weißen Einerlei des Schnees ermüdete Auge. Am Fuße der von Seevögeln bewohnten Steilgestade, deren Guano die Vegetation des Erdreichs befördert, das er erwärmt, erreichen Ranunkeln, Löffelkraut, Gräser zuweilen eine Höhe von mehren Decimetern, und mitten im Geröll erhebt sich ein gelbblühender Mohn (Papaver nudicaule), welcher unsern Gartenbeeten nicht zur Unzierde gereichen würde. Nirgends ein Strauch oder ein Baum; die letzten von allen, die Weißbirke, der Vogelbeerbaum und die Föhre bleiben in Norwegen unter dem 70° n. Br. stehen. Trotzdem sind einige Gewächse von holziger Konsistenz; zunächst zwei kleine am Boden geschmiegte Weidenarten, von welchen eine, die Weide mit netzförmig geaderten Blättern, auch in den Alpen wächst; ferner ein sich über den feuchten Moosen erhebender Strauch, die Schwarzbeere (Empetrum nigrum), welche man in den Torfmooren Europas bis in Spanien und Italien

Digitized by Google

hinein findet. Die andern Pflanzen sind niedrige Kräuter ohne Stengel, deren Blüthen sich dicht über dem Boden erschließen. Die meisten sind so klein, daß sie dem Auge des Botanikers entgehen, man bemerkt sie nur, wenn man sorgfältig zu Füßen sieht. Beweis davon ist der langsame Zuwachs des Phanerogamenverzeichnisses von Spitzbergen, welches erst allmälig durch die fortgesetzten Untersuchungen der Reisenden, welche diese Inseln erforschten, vervollständigt worden ist. So giebt im Jahre 1675 Friedrich Martens von Hamburg die Beschreibung und Abbildung von nur 11 Landarten, Phipps brachte im Jahre 1773 nur 12 dergleichen mit, welche von Solander benannt und beschrieben wurden. Scoresby hielt sich fast beständig auf dem Meere auf; auch beläuft sich die Gesammtzahl der von ihm auf seinen Reisen gesammelten Arten nur auf 15, welche im Jahre 1820 von dem berühmten Robert Brown beschrieben wurden. Im Jahre 1823 sammelte Kapitän, gegenwärtig General Sabine ihrer 24, welche Sir W. Hooker Sorge trug zu bestimmen. Derselbe Botaniker hat die 40 von Parry im Jahre 1827 während seines Aufenthaltes im Norden von Spitzbergen gesammelten Arten bekannt gemacht. Danach hat Sommerfelt 42 im selben Jahre durch Keilhau vom südlichen Spitzbergen und der Bäreninsel heimgebrachte Arten benannt. Im Jahre 1838 und 1839 haben ein dänischer Botaniker, Herr Vahl, und ich zu Bellsound, Magdalenenbai und Smeerenberg 57 Arten gesammelt. Die Reise der Herren Torell, Nordenskjöld und Quennerstedt im Jahre 1858 hat die Flora von Spitzbergen um 6 Arten und die der schwedischen wissenschaftlichen Kommission im Jahre 1861 um 21 Arten bereichert. Herr Malmgrén, der Botaniker der Expedition, giebt, nachdem er die doppelt aufgeführten ausgeschieden und die von seinen Vorgängern verwechselten unterschieden hat, die Gesammtzahl der Phanerogamenpflanzen Spitzbergens auf 93 an.

Digitized by Google

Ich werde nicht weiter von den Kryptogamen, d. h. den Mooſen ſprechen, welche den Grund der feuchten Niederungen bekleiden und die Torfmoore bedecken. Desgleichen übergehe ich mit Stillſchweigen die Flechten, welche bis zu den Berggipfeln auf dem Geſtein wachſen und der ſtrengſten Kälte Widerſtand leiſten, denn die meiſten derſelben werden nie von Schnee bedeckt. Herr Lindblom gab die Zahl dieſer Kryptogamen ſchon vor den beiden letzten ſchwediſchen Expeditionen auf 152 an. Man ſieht, daß das von Linné über das Vorherrſchen der Kryptogamen im Norden aufgeſtellte Geſetz ſich vollkommen bewahrheitet. Phanerogamen und Kryptogamen zuſammengerechnet, würde die Totalſumme der von Spitzbergen bekannten Gewächſe ſich auf 245 Arten belaufen.

Die Anzahl der Phanerogamen Spitzbergens iſt äußerſt beſchränkt, ſie beläuft ſich nur auf 93. Island, unter dem 65° n. Br. gelegen und mit bei weitem geringerer Oberfläche, enthält deren ſchon 402. Geht man weiter nach Süden, ſo nimmt das Verhältniß ſehr ſchnell zu, da Irland, ebenfalls kleiner als Spitzbergen, ihrer 960 ernährt. Die Gewächſe der letztern Inſeln ſind alſo die verlorenen Kinder der europäiſchen Flora, diejenigen, welche von allen der Kälte am beſten Widerſtand leiſten oder vielmehr, da ſie im Winter von Schnee bedeckt werden, bei der geringſten Wärmeſumme leben und blühen können.

Von den 93 Phanerogamen Spitzbergens zählt nur ein einziges zu den Nahrungspflanzen, nämlich das Löffelkraut, Cochlearia fenestrata. Drei derſelben Gattung angehörige Arten, C. officinalis, C. danica und C. anglica, bewohnen die Küſten des Atlantiſchen Ozeans. Dieſe Pflanzen, die einen herben und bittern Stoff enthalten, werden in der Medizin als Mittel gegen den Skorbut verwandt, dienen aber nicht als Nahrungsmittel. Auf Spitzbergen entwickeln ſich dieſe Stoffe in Anbe-

BAYERISCHE STAATS-BIBLIOTHEK MUENCHEN

Digitized by Google

tracht der atmosphärischen Wärme so wenig, daß das Löffelkraut als Salat verspeist werden kann, ein kostbares Hülfsmittel für die Seefahrer, denn seine antiskorbutischen Eigenschaften sind, wenn auch in abgeschwächtem Maße, darum doch vorhanden und verhüten eine Krankheit, zu deren Entwickelung Kälte, Feuchtigkeit, der Genuß von Pökelfleisch und die Entbehrung von Pflanzennahrung zusammenwirken. Während des Sommers bilden die Gräser die vorzügliche Nahrung der Renthiere, der einzigen Grasfresser, welche Spitzbergen bewohnen.

Ich glaube hier das vollständige Verzeichniß der Pflanzen Spitzbergens, nach natürlichen Familien geordnet, geben zu sollen.

Phanerogamen von Spitzbergen.

Anmerkung: Die mit Kursivschrift bezeichneten Arten kommen auch in Frankreich vor. Die durch ein Sternchen ausgezeichneten sind ausschließlich arktische Arten und fehlen in Skandinavien.

Ranunculaceae. *Ranunculus glacialis L.*, R. hyperboreus Rottb., R. pygmaeus Wgb., R. nivalis L., R. sulfureus, Sol., *R. arcticus, Richards.

Papaveraceae. Papaver nudicaule L.

Cruciferae. *Cardamine pratensis L., C. bellidifolia L., Arabis alpina L.*, *Parrya arctica R. Br., *Eutrema Edwardsii R. Br., *Braya purpurascens R. Br., Draba alpina L., *D. glacialis Adams, *D. pauciflora? R. Br., *D. micropetala? Hook, D. nivalis Liljebl., *D. arctica Fl. Dan, *D. corymbosa R. Br., D. rupestris R. Br., D. hirta L., *D. Wahlenbergii Hartm.*, Cochlearia fenestrata R. Br.

Caryophylleae. *Silene acaulis L.*, Wahlbergella (Lychnis) apetala Fr., W. affinis Fr., *Stellaria Edwardsii R. Br., *S. humifusa Rottb., *Cerastium alpinum L.*, Arenaria ciliata L., *A. Rossii R. Br., *A. biflora L., Alsine rubella*

Digitized by Google

Wbg., *Ammadenia (Arenaria) peploides Gm.*, Sagina nivalis Fr.

Rosaceae. *Dryas octopetala L.*, *Potentilla pulchella R. Br., P. maculata Pourr., *P. nivea L.*, *P. emarginata Pursh.

Saxifrageae. Saxifraga hieracifolia Waldst. et Kit., S. nivalis L., S. foliolosa R. Br., *S. oppositifolia L.*, *S. flagellaris Sternb., *S. hirculus L.*, *S. aizoides L.*, S. cernua L., S. rivularis L., S. caespitosa L., *Chrysosplenium alternifolium var. tetrandrum Th. Fr.*

Synanthereae. Arnica alpina *Murray*, *Erigeron uniflorus L.*, *Nardosmia (Tussilago) frigida Cass.*, *Taraxacum palustre Sm.*, *T. phymatocarpum Vahl.

Borragineae. Mertensia (Pulmonaria) maritima L.

Polemoniaceae. *Polemonium pulchellum Ledeb.

Scrofulariaceae. Pedicularis hirsuta L.

Ericaceae. Andromeda tetragona L.

Empetreae. *Empetrum nigrum L.*

Polygoneae. *Polygonum viviparum L.*, *Oxyria digyna Campd.*

Salicineae. *Salix reticulata L.*, S. polaris Wbg.

Juncaceae. Juncus biglumis S., Luzula hyperborea R. Br., L. arctica Blytt.

Cyperaceae. *Eriophorum capitatum Host.*, Carex pulla Good, C. misandra R. Br., C. glareosa Wbg., C. nardina Fr., *C. rupestris All.*

Gramineae. Alopecurus alpinus Sm., R. Br., Aira alpina L., Calamagrostis neglecta Ehrh., *Trisetum subspicatum P. Beauv.*, *Hierochloa pauciflora R. Br., *Dupontia psilosantha Rupr., *D. Fischeri, R. Br., *Poa pratensis var. alpigena Fr.*, *P. cenisia* All., P. stricta Lindeb., *P. abbreviata R. Br., P. Vahliana Liebm., *Glyceria

Digitized by Google

angustata Mgr. Catabrosa algida Fr., *C. vilfoidea Anders., Festuca hirsuta Fl. Dan., *F. ovina L.*, *F. brevifolia R. Br.

Wem die Botanik nicht fremd ist, der wird eine gewisse Anzahl dieser Pflanzen in verschiedenen Ländern wiederfinden. So sind von den 93 Phanerogamen Spitzbergens 69 Arten in Skandinavien, 28 selbst in Frankreich vorhanden. Letztere sind in obigem Verzeichnisse mit Kursivschrift gedruckt. Die Wiesenkresse, der Löwenzahn und der Schafschwingel finden sich in unsern Ebenen. Das Sandkraut mit Portulakblättern (Arenaria peploides) wächst am Meeresufer, das Chrysosplenium alternifolium in den feuchten Waldungen der Gebirge. Das Empetrum nigrum und die Saxifraga hirculus sind Torfmoorpflanzen. Die andern Arten bewohnen die höchsten Theile der Alpen und der Pyrenäen.

Man hüte sich wohl, hieraus vorschnell auf vielfache Schöpfungscentren zu schließen und anzunehmen, daß diese 27 französischen Arten nicht gemeinsamen Ursprunges mit ihren Schwestern auf Spitzbergen wären, sondern gleichzeitig oder zu verschiedenen Epochen um den Pol, auf den Mooren Frankreichs und auf den höchsten Schneegipfeln der Alpen und Pyrenäen entstanden seien. Die neuesten Fortschritte der Pflanzengeographie gestatten einen derartigen Schluß nicht. Zuvörderst hat man nachgewiesen, daß die Flora sämmtlicher Eisgegenden, welche den Nordpol umgeben, von auffallender Gleichförmigkeit ist. Herr Malmgrén lehrt uns, daß von den 93 phanerogamischen Pflanzen Spitzbergens 81 sich in Grönland wiederfinden. Weiter westlich haben die Inseln, welche die in Nordamerika etwa unterm 75° n. Br. gelegenen Lancastre-, Barrow- und Mellville-Straßen einfassen, 58 Pflanzen mit dem nördlichen Theile von Spitzbergen gemein; die, welche in Amerika fehlen, sind gemeiniglich Arten der Westküste jener Insel, welche der Festlandflora des

Digitized by Google

Nordens von Europa spezieller angehören. Gegen Osten, im asiatischen Sibirien auf der Halbinsel Taymir, unter 100° ö. L. und 75° n. Br. hat Herr Middendorf 124 Phanerogamen gesammelt, von denen 53 ebenfalls auf Spitzbergen zu Hause sind.

Der Kranz bescheidener Blumen, welcher den Nordpol umgiebt, wechselt unter den verschiedenen Meridianen nicht eben gleich den übrigen Pflanzengürteln, welche den Erdball umziehen, ab; es sind überall dieselben Pflanzen oder Arten, welche denselben Gattungen und denselben Familien angehören, es sind immer Gramineen, Kruziferen, Karyophylleen und Sarifragen, welche vorherrschen und unter den Geschlechtern die Draba, die Steinbrecke, die Ranunkeln, die Ried- und Rispengräser. Alle diese Arten sind ausdauernd, es ist dies eine Bedingung ihres Daseins, denn es giebt nur ganz wenige unter ihnen, die alljährlich Früchte ansetzen und Samen zur Reife bringen können. Jährige Pflanzen aber verschwinden aus dem Lande, wenn es nur ein einziges Mal vorkommt, daß ihre Samenkörner nicht zur Reife gelangen.

Es giebt demnach eine arktische Flora; die von Spitzbergen gehört theilweise dazu, ist aber zugleich die Fortsetzung der skandinavischen, welche sich auf dieser Insel mit der eigentlichen arktischen Flora vermischt. In der That haben diese beiden Gegenden 69 Arten mit einander gemein; es bleiben mithin 24 eigenthümliche Arten für Spitzbergen, die sich aber sämmtlich in Nordamerika, im nördlichen Sibirien und auf Nova Semlja finden; es sind dies die vorzugsweise arktischen Pflanzen, diejenigen, welche am besten die cirkumpolare Flora charakterisiren. Ich habe sie von den übrigen durch ein Sternchen unterschieden. Kurz, die Flora von Spitzbergen besteht aus einem Gemisch von zwei Floren, einer europäischen und kraft der Nähe Skan-

Digitized by Google

binaviens herrschenden und einer arktischen, d. h. einer amerikanischen und asiatischen.

Diese Flora ist in den hohen Breiten durch eine für sie unübersteigliche Scheidewand, die Sommerwärme, abgegrenzt. Vor der gegenwärtigen Periode aber hat die Erde eine Kälteperiode durchgemacht; die Gletscher bildeten eine vom Pol strahlenförmig sich ausbreitende Haube, die bis in die Mitte Europas, Amerikas und Asiens vorrückte, Felsblöcke, Sand- und Kieshaufen und damit zugleich die sie bewohnenden Pflanzen mit sich führend. Diese Pflanzen haben sich von Ort zu Ort nach Süden fortgepflanzt. Als eine erhöhte Temperatur das Schmelzen und Zurückziehen der Gletscher herbeiführte, verschwanden diese Pflanzen von der Wärme überrascht fast sämmtlich von den Ebenen Europas, doch haben sie sich in höheren Gebirgen, wie in den Sudeten, im Harz, in den Vogesen und vor Allem in den Alpen erhalten. So zählt nach Heer die Schweiz gegenwärtig 360 alpine Arten, wovon 158 sich im Norden Europas wiederfinden; darunter zählt er 42 auf, welche sogar die Ebenen des Kantons Zürich bewohnen. Einige besondere Beispiele werden diese Wahrheiten veranschaulichen.

Das Faulhorn im Kanton Bern bildet einen Theil der den Berner Hochalpen gegenüber liegenden Kette von Kalksteingebirgen. Der nördliche Fuß desselben wird vom Brienzer See bespült, während der Südabhang im Grindelwaldthale ausläuft. Von der Höhe dieser Fernsicht umfaßt das Auge die ganze Alpenkette vom Sustenhorn im Kanton Uri an bis zu den Diablerets im Kanton Waadt. Das Faulhorn endet in einem Kegel, der sich über einem Plateau erhebt, worauf sich ein kleiner Gletscher befindet. Dieser Kegel, gegen Süden ziemlich sanft abfallend, bildet auf der Nordseite einen steilen Abhang. Seine Totalhöhe beträgt 65 Meter, seine Ober-

Digitized by Google

fläche 4½ Hektaren, und der Gipfel befindet sich 2,683 Meter über dem Meere. Er besteht aus einem schwarzen, den untern neokomischen Stufen angehörigen Kalkstein. Die leichte Verwitterbarkeit dieses Kalksteins erklärt den Namen Faulhorn, welchen dieser bemerkenswerthe Gipfel von den ersten Bewohnern des Landes erhalten hat. Auf diesem acht Monate des Jahres mit Schnee bedeckten Kegel habe ich bei mehrmaligen Aufenthalten in den Jahren 1841, 1842, 1844 und 1846 mit meinem Freunde August Bravais 132 phanerogamische Arten gesammelt, deren Verzeichniß hier folgt:

Phanerogamen des Faulhorngipfels.

Anmerkung: Die mit einem Sternchen versehenen Pflanzen finden sich auch in Lappland. Die mit Kursivschrift gedruckten Arten kommen auch auf dem Gipfel des Pic du Midi de Bigorre in den Pyrenäen vor.

Ranunculaceae. Ranunculus montanus Wild, *R. glacialis L., R. alpestris L., Aconitum napellus L.

Cruciferae. *Arabis alpina L., A. Gerardi Besser, *Cardamine bellidifolia Gaud., Draba fladnizensis Wulf., D. frigida Suter, *D. aizoides L.*, *Thlaspi rotundifolium Gaud.*, *Capsella bursa pastoris DC., *Lepidium alpinum* L.

Violarieae. Viola calcarata L.

Cistineae. Helianthemum alpestre DC.

Caryophylleae. Silene inflata Sm., **S. acaulis L.*, Moehringia polygonoides Mert. et Koch., *Alsine verna Bartl.*, Spergula saginoides L., Arenaria biflora L., A. ciliata L., *Stellaria media Sm., *S. cerastoides L.*, Cerastium arvense L., **C. latifolium L., Cherleria sedoides L.*

Papilionaceae. Trifolium pratense L., T. badium L., T. caespitosum Reyn., *Astragalus alpinus L., *Oxytropis lapponica Gay., **O. campestris DC.*, *Hedysarum obscurum L.

Digitized by Google

Rosaceae. **Sibbaldia procumbens L.*, *Dryas octopetala L., Geum reptans L., G. montanum L., Potentilla glacialis Hall., P. salisburgensis Haencke, P. grandiflora L., P. aurea L., **Alchemilla vulgaris L.*, *A. alpina L., A. pentaphylla L., A. fissa Schum.

Onagrarieae. *Epilobium alpinum L.

Crassulaceae. *Sedum repens* Schl., S. atratum L.

Saxifrageae. *Saxifraga stellaris L., *S. aizoides L.*, *S. bryoides L.*, S. muscoides Wulf., S. planifolia Lapeyr., S. aizoon Jacq., **S. oppositifolia L.*, S. androsacea L., S. Seguierii Spr.

Umbelliferae. Gaya simplex Gaud., Ligusticum mutellina Cr., *Carum carvi L.,

Rubiaceae. Galium helveticum Weig., G. sylvestre var. alpestre Koch.

Dipsaceae. Scabiosa lucida Vill.

Synanthereae. Tussilago alpina L., **Erigeron uniflorus L.*, **E. alpinus L.*, Aster alpinus L., *Arnica scorpioides L.*, *Artemisia spicata L.*, Chrysanthemum leucanthemum L., *Pyrethrum alpinum* Willd., Achillaea atrata L., **Omolotheca supina var. subacaulis DC.*, Cirsium spinosissimum Scop., Leontodon aureum L., L. hispidum L., *Taraxacum dens leonis Desf.

Campanulaceae. Campanula linifolia Lam., C. pusilla Haencke, *Phyteuma hemisphaericum* L.

Primulaceae. *Primula farinosa L., Androsace helvetica Gaud., A. alpina Gaud., A. pennina Gaud., A. obtusifolia All., A. chamaejasme Willd, Soldanella alpina L.,

Gentianeae. *Gentiana acaulis L.*, G. bavarica L., *G. verna L.*, G. campestris L., **G. nivalis L.*, G. glacialis A. Thom.

Borragineae. *Myosotis silvatica var. alpestris* Koch.

Digitized by Google

Scrofulariaceae. *Linaria alpina DC.*, Veronica aphylla L., *V. saxatilis Jacq., V. bellidioides L, *V. alpina L., *V. serpyllifolia L., *Bartsia alpina L., Euphrasia minima Jacq., Pedicularis versicolor Wbg., P. verticillata L.,

Labiatae. *Thymus serpyllum L.*

Plantagineae. Plantago montana Lamk., *P. alpina* L.

Chenopodeae. Blitum bonus-Henricus C. A. M.

Polygoneae. **Polygonum viviparum L.*, **Oxyria digyna Cambd.*

Salicineae. *Salix herbacea L., *S. retusa L.*

Liliaceae. Lloydia serotina Salisb. (Phalangium serotinum Lamk.)

Junceae. Juncus Jacquini L., Luzula spadicea DC., *L. spicata DC., Elyna subspicata Schr.

Cyperaceae. Carex foetida All., *C. curvula All.*, *C. nigra All.*, C. sempervirens Vill.

Gramineae. *Phleum alpinum L., Sesleria caerulea L., *Agrostis rupestris All., A. alpina Willd., Avena versicolor Vill., **Trisetum subspicatum P. Beauv.*, *Poa annua L., *P. alpina var. vivipara, *P. alpina L.*, brevifolia Gaud., *P. laxa Haencke, *Festuca violacea Gaud.*, F. pumila Vill., F. Halleri Vill.

Unter diesen Pflanzen sind 11, welche der Flora Spitzbergens angehören, nämlich: Ranunculus glacialis, Cardamine bellidifolia, Silene acaulis, Arenaria biflora, Dryas octopetala, Erigeron uniflorus, Saxifraga oppositifolia, S. aizoides, Polygonum viviparum, Oxyria digyna und Trisetum subspicatum, sowie 40 mit einem Sternchen bezeichnete, welche ich auch in Lappland gesehen habe. Keine dieser Pflanzen gehört der eigentlichen arktischen Flora an; alle bilden einen Theil der skandinavischen Flora. Die geringe Anzahl von Pflanzen Spitzbergens auf dem Faulhorn erklärt sich aus zwei Gründen.

Digitized by Google

Obgleich die mittlere Jahrestemperatur — 2°3 beträgt, ist der Sommer doch im Vergleich zu dem auf Spitzbergen wärmer, man kann sein Mittel zu 3°,3 annehmen, und gegen Mitte des Tages schwankt das Thermometer oft um 10 Grad herum. Uebrigens erwärmt sich der Boden wie auf allen Hochgebirgen beträchtlich,*) während er auf Spitzbergen beständig kalt, feucht und bis auf einige Decimeter Tiefe gefroren ist. Der Boden des Faulhorns ist also für die Pflanzen von Spitzbergen zu warm und nicht feucht genug. Die Kegelspitze, aus schwarzem verwittertem Kalkstein gebildet, nach Süden gekehrt und steil abfallend, ist dürr und trocken, wenn der Schnee verschwunden ist, während der Boden von Spitzbergen stets an allen den Theilen, wo der Pflanzenwuchs sich entwickelt, feucht, ja schwammig ist. Die andern Pflanzen, welche die Kegelspitze des Faulhorn schmücken, sind Arten aus dem Norden Europas, alpine Pflanzen oder Gewächse, die aus der Schweizer Ebene und untern Bergregion bis zum Gipfel emporgestiegen sind.

Prüfen wir nun die Flora einer andern scharf begrenzten Oertlichkeit, die sich unter ganz andern Bedingungen als die des Faulhorngipfels befindet, nämlich des Gartens des Eismeeres von Chamouni. Ich kenne in den Alpen keinen Punkt, der mehr an Spitzbergen erinnerte, als die große, zum Eismeere gehörige Firnmulde, in deren Mitte sich der unter dem Namen Courtil oder Jardin bekannte Rasenplatz befindet. Die Aiguille du Moine, die Aiguille Verte, die Tour des Courtes, die Aiguille de Triolet und die Aiguille de Léchaud beherrschen ihn von allen Seiten; die Spitze des Montblanc erhebt sich majestätisch über dem ungeheuren Trichter, durch welchen der Glacier du Géant zur Mer de Glace sich ergießt. Der mächtige Gletscher des Talèfre füllt den Hintergrund des

*) Siehe S. 41, Anm.

Digitized by Google

Cirkus aus. Stellt der Reisende, im Jardin stehend, sich im Geiste vor, das Meer bespüle den Fuß des Amphitheaters, dessen Mittelpunkt er einnimmt, so kann er sich rühmen, eine Vorstellung von dem Anblicke Spitzbergens vor Augen zu haben. Das schneefreie Eiland, auf dem er sich befindet, bietet eine Aehnlichkeit mehr dar, und die Vergleichung der Vegetation dieser Insel mit der von Spitzbergen ist eine der berechtigtsten und interessantesten, die man anstellen kann. Pictet und Forbes haben gefunden, daß der Jardin 2756 Meter über dem Meere liegt; seine Länge beträgt 800 Meter, seine Breite etwa 300, sein Abstand von den nächstliegenden Felsen, auf denen einige Pflanzen wachsen, mindestens 800 Meter. Der Garten besteht aus einer Gruppe von geglätteten und gestreiften Protogynfelsen, welche zwischen den beiden Zuflüssen hervorragen, die den Talèfre-Gletscher bilden; der größere dieser Zuflüsse kommt von dem zwischen der Tour des Courtes und der Aiguille de Triolet und de Léchaud liegenden Theile des Cirkus, der zweite und kleinere von der Aiguille Verte und der Aiguille du Moine herab. Zwei Moränen fassen diese Felsen von beiden Seiten ein, von denen die zur Linken die mächtigste ist; in der Mitte des Rasenplatzes sprudelt eine Quelle hervor und bildet einen kleinen Bach. Der Schutt der Moräne hat sich allmälig mit Pflanzen bedeckt und in einen grünen Teppich verwandelt, dessen Farbe einen eigenthümlichen Gegensatz zu den ihn umgebenden weißen Firnen bildet. Mein Freund Herr Alphonse de Candolle hat in einem besondern Herbarium die von diesem Punkte stammenden und von verschiedenen Reisenden, welche ihn nach einander zu verschiedenen Zeiten besuchten, gesammelten Pflanzen vereinigt, die ich in der Ordnung des Monatsdatums aneinanderreihe. Ich selbst habe auf dem Courtil den 24. Juli 1846 botanisirt, Herr Percy aus Edinburg den 26. Juli 1836, Mademoiselle d'Angeville den 3. August 1838, Herr H. Metert

Digitized by Google

aus Genf den 8. Auguſt 1837, Herr Alphonſe de Candolle den 12. Auguſt 1838; endlich hat ſich Herr Venance Payot, Naturforſcher aus Chamouni, mehrmals dahin begeben und im Jahre 1858 ein Verzeichniß dieſer Pflanzen herausgegeben. Ich habe ſie faſt ſämmtlich in dem Herbarium des Herrn de Candolle zu Genf geſehen und im Oktober 1854 mit Herrn Müller, Conſervator des Herbariums, Namen und Synonymik derſelben feſtgeſtellt. Man kann dieſe kleine Flora als eben ſo vollſtändig wie die des Faulhorns betrachten, und ich gebe ſie nachſtehend mit der Bemerkung, daß die mit einem Sternchen bezeichneten Arten ſich auch im nördlichen Lappland und die mit Kurſivſchrift gedruckten auf dem Faulhorn finden.

Phanerogamengewächſe vom Jardin des Mer de Glace de Chamouni.

Bemerkung: Die mit einem Sternchen verſehenen Arten finden ſich auch in Lappland, die mit Kurſivſchrift gedruckten auf dem Faulhorngipfel.

Ranunculaceae. **Ranunculus glacialis L.*, **R. montanus Willd.*, R. Villarsii DC.

Cruciferae. *Draba frigida Gaud.*, **Cardamine bellidifolia L.*, C. resedifolia L., Sisymbrium pinnatifidum DC.

Caryophylleae. Silene rupestris var. subacaulis L., **S. acaulis L.*, *Spergula saginoides L.*, Arenaria rubra L., A. serpyllifolia L., A. nivalis Godr., **A. biflora L.*, *Cherleria sedoides L.*, *Stellaria cerastoides* **L. Cerastium latifolium L.*, *C. alpinum DC. var. lanatum.

Papilionaceae. Trifolium alpinum L.

Rosaceae. **Sibbaldia procumbens L.*, *Geum montanum L.*, *Potentilla aurea L.*, *P. glacialis Hall.*, *P. grandiflora L.*, *Alchemilla pentaphylla L.*

Onagrarieae. **Epilobium alpinum* L.

Digitized by Google

Crassulaceae. *Sedum atratum L.*, *S. repens Schl*, *S. annuum L., Sempervivum montanum L., S. arachnoideum L.

Saxifrageae. **Saxifraga stellaris L.*, S. aspera L., *S. bryoides L.*

Umbelliferae. Meum mutellina Gaertn., *Gaya simplex Gaud.*, Bupleurum stellatum L.

Synanthereae. Cacalia alpina Jacq., C. leucophylla Willd., *Tussilago alpina L.*, **Erigeron uniflorus L.*, **E. alpinus* L., *Pyrethrum alpinum Willd.*, **Omolotheca supina Cass.*, *Gnaphalium dioicum L., *G. alpinum Vill., Arnica montana L., Senecio incanus L., *Cirsium spinosissimum Scop.*, Taraxacum laevigatum DC., Leontodon squamosum Lamk., *L. aureum L.*, *Hieracium alpinum L., H. angustifolium Hoppe, H. glanduliferum Hoppe, H. Halleri Vill.

Campanulaceae. *Phyteuma hemisphaericum L.*, Campanula barbata L.

Primulaceae. Primula viscosa Vill.

Gentianeae. Gentiana purpurea L., G. acaulis L, G. excisa Presl.

Scrofulariaceae. *Linaria alpina DC.*, **Veronica alpina L.*, *V. bellidioides L.*, *Euphrasia minima Jacq.*

Plantagineae. Plantago alpina L.

Salicineae. **Salix herbacea L.*,

Junceae *Juncus Jaquini L.*, *J. trifidus L., Luzula lutea DC., *L. spadicea DC.* **L. spicata DC.*

Cyperaceae. *Carex curvula All., C. foetida Vill., C. sempervirens Vill.* C. ferruginea Scop.

Gramineae. **Phleum alpinum L.*, Anthoxanthum odoratum L., **Agrostis rupestris All.*, *A. alpina Scop. Avena versicolor Vill.*, *Poa laxa* Haencke, P. laxa var. fla-

Digitized by Google

vescens Koch, **P. alpina L.*, *P. alpina var. vivipara L.*, *Festuca Halleri All.*

Es sind demnach 87 Planerogamengewächse auf dem Jardin vorhanden; um die Flora vollständig zu haben, muß man noch 16 Moose, 2 Lebermoose und 23 Flechten hinzufügen, wonach die Gesammtzahl der Pflanzen, welche auf diesem von ewigem Eise umgebenen Erdeilande wachsen, 128 betragen würde.

Unter den 87 Planerogamen sind 50, d. h. mehr als die Hälfte mit Kursivschrift gedruckt, wachsen also ebenfalls auf dem Faulhorn. Da dieses ein, den Berner Alpen gegenüberstehender isolirter Gipfel, der Jardin dagegen eine Vegetationsinsel in einem zum Montblanc gehörenden Cirkus ist, beide sich also unter ganz verschiedenen physischen Bedingungen befinden, so darf man daraus schließen, daß diese beiden Floren sehr wohl die alpine Vegetation an ihrer äußersten Grenze unterhalb der sogenannten Linie des ewigen Schnees darstellen. Unter diesen 87 Arten finde ich nur 8, die einen Theil der Flora von Spitzbergen ausmachen, nämlich: Ranunculus glacialis, Cardamine bellidifolia, Cerastium alpinum, Arenaria biflora und Erigeron uniflorus; also etwa dasselbe Verhältniß wie auf dem Faulhorn, doch sind 24 darunter, die sich in Lappland wiederfinden. Kurz, der Gipfel des Faulhorn und der Garten haben 50 Pflanzen mit einander gemein. Das Verhältniß der lappländischen Pflanzen zu denen des Faulhorn ist wie 30:100, zu denen des Gartens wie 28:100, beträgt also etwa ein Drittel auf beiden Punkten; auf dem Gipfel des Faulhorns und auf dem Garten bilden die Pflanzen von Spitzbergen dagegen nur 6 Procent der Gesammtzahl. Wiederholen wir noch, daß keine dieser Pflanzen der arktischen oder circumpolaren Flora angehört. Die subnivale Flora der Alpen entspricht demnach der des nördlichen Lappland, der Umgegend von Altenfjord z. B., und um eine Vegetation analog der von Spitz-

Digitized by Google

bergen zu finden, muß man in den Alpen noch höher über die Grenze des ewigen Schnees hinauf steigen.

Auf dem Gipfel der Gletscher am nördlichen Rücken des Montblanc befindet sich eine kleine Kette einzelnstehender Felsen, welche eine Insel inmitten des sie umgebenden Eismeeres bilden. Sie trennen die Gletscher des Bossons und de Taconnay in ihrem oberen Theile von einander und sind 800 Meter von der Montagne de la Côte und 2 Kilometer von der Pierre de l'Echelle, den nächstliegenden Punkten, wo es Pflanzenwuchs giebt, entfernt. Ihre Richtung ist von Nordnordost nach Südsüdwest. Ihr unteres Ende befindet sich 3050 Meter über dem Meere; die höchste Spitze, von Saussure Fels der glücklichen Rückkehr (Rocher de l'heureux retour) genannt, hat 3470 Meter Höhe. Diese Felsen bestehen aus senkrecht stehenden Platten eines schieferigen Protogyns zwischen denen die Pflanzen Schutz und einen durch die Zersetzung des Gesteins gebildeten Boden finden. Die Montblanc-Besteigungen von Herrn Marckham Shervill den 27. August 1825, Auldjo den 8. August 1827 und Martin Barry den 17. September 1834 hatten die Gesammtzahl der Phanerogamen dieser Gletscherinsel auf 8 gebracht. Ich besuchte sie dreimal, den 31. Juli und den 2. September 1844, sodann den 28. Juli 1846, und erforschte namentlich, nicht ohne Gefahr, die nach Südosten gekehrte Abdachung, welche das Chaos der Gletscherkäse (séracs) des Glacier des Bossons beherrscht. Ich sammelte daselbst 19 phanerogamische Pflanzen ein, Venance Payol erklomm diese Felsen abermals den 30. August 1861 und fand dort noch 5 Arten, welche ich nicht bemerkt hatte. Ich gebe weiter unten das Verzeichniß dieser 24 Pflanzen, wovon 5 mit Kursivschrift gedruckte auch der Flora von Spitzbergen angehören. Auf den Grands Mulets ist, wie man sieht, das Verhältniß der Arten von Spitzbergen wie 21 : 100, und außer der Agrostis rupestris ist keine einzige

Lappland angehörige Pflanze darunter. Diese Flora besteht also ausschließlich aus sehr alpinen Arten, vermischt mit einem Fünftel Pflanzen von Spitzbergen. Die Grands Mulets sind einer der höchsten Aufenthaltsorte eines Nagers, der Schneemaus (Arvicola nivalis Mart.). die sich hauptsächlich von den Pflanzen nährt, deren Verzeichniß wir folgen lassen. Payot hat außerdem auf den Grands Mulets 26 Mooſe, 2 Lebermooſe und 28 Flechten gesammelt, was 80 Arten als Gesammtzahl der Gefäß- und Zellenpflanzen dieser anscheinend aller Vegetation beraubten Felsen ergiebt.

Phanerogamen der Grands Mulets.

Draba fladnizensis Wulf. D. frigida Gaud., *Cardamine bellidifolia L.*, C. resedifolia Saut., *Silene acaulis L.* Potentilla frigida Vill., Phyteuma hemisphaericum L., Pyrethrum alpinum Willd.. *Erigeron uniflorus L.*, Saxifraga bryoides L., S. groenlandica L., S. muscoides Auct., *S. oppositifolia L.*, Androsace helvetica Gaud., A. pubescens DC., Gentiana verna L.

Luzula spicata DC., Festuca Halleri Vill., Poa laxa Haencke, P. caesia Sm., P. alpina var. vivipara L., *Trisetum subspicatum Pal. Beauv.*, *Agrostis rupestris All., Carex nigra All.

Wir wollen nun sehen, ob sich das Gesetz bei der Gruppe des Monte Rosa bestätigt.

Während eines zweiwöchentlichen Aufenthaltes vom 13. bis 26. September 1851 in der Vincenthütte am Südabhange des Monte Rosa und in einer Höhe von 3158 Meter über dem Meere haben die Herren A. und H. Schlagintweit um diesen Punkt herum auf dem Gneis 47 Phanerogamenpflanzen gesammelt, von denen 10 einen Theil der Flora von Spitzbergen bilden, sie sind in dem beigefügten Verzeichnisse mit Kursivschrift gedruckt.

Digitized by Google

Phanerogamen aus der Umgebung der Vincenthütte auf dem Monte Rosa.

Ranunculus glacialis, Hutchinsia petraea R. Br., Thlaspi cepaefolium Koch, T. corymbosum Gaud., T. rotundifolium Gaud., *Cardamine bellidifolia L., Silene acaulis L.,* *Cerastium latifolium L., Cherleria sedoides L., Potentilla alpestris Hall., *Saxifraga aizoides,* S. bryoides, S. biflora All., S. exarata Vill., S. muscoides, *S. oppositifolia,* S. retusa Gouan, S. stellaris, Achillaea hybrida Gaud., Artemisia mutellina Vill., A. spicata Wulf., Aster alpinus, Chrysanthemum alpinum, *Erigeron uniflorus,* Phyteuma pauciflorum L., Myosotis nana, Linaria alpina, Veronica alpina, Gentiana verna, G. imbricata Froehl., Androsace glacialis Hoppe, Primula Dyniana Lagasca, *Oxyria digyna,* *Salix herbacea, *S. reticulata.*

*Agrostis rupestris All., *Trisetum subspicatum,* Festuca Halleri All., *F. ovina,* Poa alpina, P. laxa Haencke, P. minor Gaud., Koetria hirsuta Gaud., Elyna spicata Schrad., *Luzula spicata DC., Carex nigra All.

Das Verhältniß der Pflanzen von Spitzbergen beträgt wie auf den Grands Mulets ein Fünftel und Cerastium latifolium, Salix herbacea, Luzula spicata und Agrostis rupestris sind die einzigen lappländischen, Spitzbergen fremden Pflanzen. Die andern 33 Arten sind ausschließlich alpine.

Auf dem Gipfelpunkt des Passes von Sanct Theodul, welcher aus dem Zermattthal im Wallis in's Val Tornanche in Piemont führt, findet sich noch eine schneefreie, aber auf allen Seiten von ungeheuren Gletschern umgebene Insel. Dort war es, wo Saussure im Jahre 1789 verweilte.

Dieser Punkt liegt 3350 Meter über dem Meere. Ich besuchte ihn den 17. September 1852 mit den Herren Q. Sella und B. Gastaldi und sammelte dort auf den Serpentinschiefern

Digitized by Google

nachstehende Pflanzen, deren Bestimmung Herr Reuter die Güte gehabt zu verifiziren.

Phanerogamen vom Gipfelpunkt des St. Theodul-Passes.

Ranunculus glacialis L., Thlaspi rotundifolium Gaud., Draba pyrenaica L., D. tomentosa Wahl., Geum reptans L., Saxifraga planifolia Lap., S. muscoides Wulf., *S. oppositifolia L.*, Pyrethrum alpinum Willd., *Erigeron uniflorus L.*, Artemisia spicata L., Androsace pennina Gaud., Poa laxa Haencke.

Dieses Verzeichniß ist weit davon entfernt vollständig zu sein, und doch sind unter 13 Pflanzen 3 mit Kursivschrift gedruckte, welche sich auf Spitzbergen wiederfinden. Ich wünschte lebhaft, daß ein junger Botaniker, Schweizer oder Italiener, sich's zur Aufgabe machte, die Flora dieses interessanten Punktes aufzunehmen. Dies würde um so leichter sein, als es dort seit zehn Jahren eine kleine Hütte giebt, worin Herr Dollfuß-Ausset im Jahre 1864 vom 22. August bis 3. September verweilt hat; die höchste Temperatur, welche er im Schatten notirte, betrug 6°,2 und die niedrigste — 16°,0. Man sieht, daß das Klima von einer Strenge ist, die der von Spitzbergen nichts nachgiebt, und es ist sehr wahrscheinlich, daß botanische Ausflüge, mit Aufmerksamkeit in den Monaten Juli, August und September unternommen, eine verhältnißmäßig ansehnliche Zahl einheimischer Arten Spitzbergens und des nördlichen Lapplands liefern würden.

Dieses Gemälde würde unvollständig sein, wenn wir nicht einen Blick auf die Pyrenäen würfen, um zu erfahren, ob die arktische Flora auch hier seit dem Zurückziehen der Gletscher, die in dieser wie in den übrigen Ketten bis in die Ebenen von Frankreich und Spanien hinab sich erstreckten, einige Vertreter zurückgelassen hat.

Die Vegetation der Pyrenäen ist der der Alpen sehr ähnlich.

Digitized by Google

Herr Zetterstedt zählt im Ganzen 68 den Pyrenäen, Alpen und skandinavischen Gebirgen gemeinsame alpine Pflanzen, und eine einzige, die Menziezia (Phyllodoce) caerulaea, die sich nur in Skandinavien und in den Pyrenäen findet.

Ramond hat sich nach fünfunddreißig auf den Pic du Midi von Bagnères während fünfzehn Jahren zwischen dem 20. Juli und 7. October unternommenen Besteigungen befleißigt, sämmtliche Pflanzen des Endkegels, dessen Höhe 16 Meter beträgt, der Gipfel selbst 2877 Meter über dem Meere erhaben ist, und dessen Oberfläche nur einige Aren mißt, zu sammeln; er hat daselbst 71 phanerogamische Pflanzen beobachtet. Das Verzeichniß ist sehr vollständig, denn die späteren Nachforschungen von Botanikern haben es durchaus nicht vermehrt. Herr Charles Desmoulins, welcher die Besteigung den 17. October 1840 unternahm, führt nur die Stellaria cerastoides an, die dem scharfen Auge Ramond's entgangen war. Unter diesen 72 zwischen 2860 und 2877 Meter vegetirenden Pflanzen sind 35, die auch auf dem Faulhorn vorhanden sind,*) es ist der gemeinsame Grundstock der Vegetation der Hochgipfel; 7 (Poa cenisia, Silene acaulis, Oxyria digyna, Erigeron uniflorus, Draba nivalis, Arenaria ciliata und Saxifraga oppositifolia) finden sich zugleich auf dem Pic du Midi unter 43° n. Br. in einer Höhe von über 2860 Meter und auf Spitzbergen unter dem 78° n. Br. am Meeresgestade. In Bezug auf die Gesammtzahl der Arten ist die Flora des Pic du Midi reicher an Pflanzen Spitzbergens als die des Faulhorns, denn ihr Verhältniß ist wie 10:100, statt wie 6 auf dem Alpengipfel. Muß man diesen Unterschied der größeren Erhebung des Pics oder andern mit der ursprünglichen Vertheilung der Pflanzen verbundenen Umständen beimessen? Bei dem gegenwärtigen Stande unseres

*) Es sind die im Pflanzenverzeichnisse des Faulhorn (S. 103) mit Kursivschrift gedruckten Arten.

Digitized by Google

Wissens vermöchte dies Niemand zu sagen. Doch beweist diese Aehnlichkeit in der Vegetation der beiden entfernten Gipfel einen gemeinschaftlichen Ursprung und deutet auf einen gemeinsamen Vegetationsstock hin, der nachher durch Umstände verändert worden ist, die vom Klima, der geographischen Lage und der Vermischung mit Pflanzen benachbarter Länder, ja selbst früherer Floren, deren Reste wir in den jüngsten Erdschichten vorfinden, abhängen. Alle diese Betrachtungen rechtfertigen den Satz, womit ich dieses Kapitel begann: „Die meisten Pflanzen Spitzbergens sind die verlorenen Kinder der europäischen Flora, und eine gewisse Anzahl derselben hat sich seit der Gletscherperiode auf den Spitzen der Alpen und der Pyrenäen und an den feuchten oder torfigen Orten Mitteleuropas erhalten."

Fauna von Spitzbergen.

Säugethiere.

Sprechen wir zuerst von den Landsäugethieren, deren Zahl nur vier beträgt. Der weiße Bär (Ursus maritimus L.) ist das bekannteste darunter. Sommers an den Küsten selten, sieht man ihn fast nur im Norden von Spitzbergen. Parry hat bei seinem Versuche, den Pol durch Beschreiten des Eises zu erreichen, auf dem Bankeis unter 81°30 einen solchen angetroffen. Das Thier ward von den Matrosen getödtet, doch rächten sich die Bären auf ihre Weise. Als Parry und seine Gefährten abermals den 11. August 1827, nachdem sie vierzig Tage auf dem Bankeis gewandert, bei Roßinlet an's Land stiegen, waren die Vorräthe von den Bären vertilgt. Nelson, der die Expedition von Phipps als Midshipman mitmachte, nahm es einst ganz allein mit einem Bären auf, und als man den schmächtigen zarten Jüngling, der später der erste

Digitized by Google

Admiral der Welt werden sollte, fragte, wie er so waghalsig sein könne, sich mit einem so furchtbaren Thiere zu messen, antwortete er einfach: „Ich wollte sein Fell meinem Vater mitbringen.“ Die Herren Torell und Nordenskjöld haben Bären auf ihren Ausflügen nach dem Norden von Spitzbergen gesehen. Der Magen eines dieser Thiere war mit Gras angefüllt. Sie sind also nicht ausschließliche Fleischfresser, obgleich doch Robben und Walrosse ihre gewöhnliche Beute sind. Auch verlassen die Bären fast nie die Eisberge, welche ebenfalls der gewöhnliche Aufenthaltsort der Seehunde und Robben sind.

So selten der weiße Bär ist, so gemein ist der blaue Fuchs (Canis lagopus L.). Im Sommer ist sein Pelz schmutzig braun, im Winter wird es weiß oder dunkel schieferblau. Es ist im Norden ein sehr gesuchtes Rauchwerk, um es aber in seiner ganzen Schönheit zu bekommen, muß man das Thier während des Winters tödten. Beim Einlaufen in die Bai von Bellsound auf Spitzbergen den 25. Juli 1838, wurden wir durch den Anblick großer russischer Kreuze in Triangelform, die am Meeresstrande aufgepflanzt waren, überrascht, in der Nähe befand sich eine Hütte und am Ufer ein kleines verlassenes Fahrzeug. Diese Kreuze bedeckten die Leichname armer russischer Leibeigener, welche den Winter auf Spitzbergen hatten zubringen müssen, um blaue Füchse zu jagen. Einige waren am Skorbut gestorben, die andern waren am Leben geblieben. Später vernahmen wir, daß sie von Archangel hergekommen und, da sie nicht mehr zahlreich genug waren, um ihr Boot zu bemannen, in einem Nachen sich einem norwegischen Schiffe, das in Sicht kam, angeschlossen hätten. Um die Hütte herum sahen wir die Reste der Fallen, welche sie gestellt hatten, um blaue Füchse zu fangen. Diese Thiere graben tiefe Gänge mit mehren Mündungen und stopfen den Kessel, welchen sie bewohnen, mit Moos aus. Im

Digitized by Google

Sommer gewähren die Vögel, welche zum Legen und zum Aufziehen ihrer Jungen nach Spitzbergen kommen, diesen Füchsen eine reichliche Nahrung, alsdann werden sie sehr fett. Wir schlossen dies aus mehren Individuen, welche von den Offizieren der Recherche erlegt wurden. Im Winter fasten diese Thiere, und ihr Hunger ist dann der Art, daß sie sich an Allem vergreifen. Als Behring auf den Inseln der Meerenge, welche seinen Namen trägt, Schiffbruch litt, suchten die blauen Füchse den Schlafenden die Sohlen von den Stiefeln zu reißen, und auf der Insel Jan Mayen waren die Herren Vogt und Berna genöthigt, mit Flintenschüssen ihre Kleider und Vorräthe vor ihnen zu vertheidigen.

Ein einziger kleiner Nager, die Feldmaus der Hudsonsbai, bewohnt Spitzbergen. Ihr Winterkleid ist weiß, das des Sommers veränderlich; sie vertritt auf Spitzbergen den durch seine Wanderungen so berühmten Lemming Norwegens.

Das wilde Renthier, der Hirsch des Nordens (Cervus tarandus L.), ist auf Spitzbergen nicht sehr selten. Sommers findet es am Meeresstrande das Kraut, welches seine eigentliche und gewöhnliche Nahrung bildet, und Winters scharrt es den Schnee, unter dem es Flechten und Moose entdeckt; dann aber magert es ungemein ab, um während der schönen Jahreszeit wieder fett zu werden. Das Renthier ist das einzige Thier auf Spitzbergen, dessen Fleisch zugleich angenehm und nahrhaft ist, es hat viel Aehnlichkeit mit dem des Rehes. Das Renthier genügt allen Bedürfnissen der Lappen, deren Existenz einzig und allein auf den zahlreichen Heerden beruht, die sie Sommers auf den Inseln einpferchen oder auf den Bergen ihrer Heimath weiden, während sie sie Winters um ihre Dörfer versammeln, wo die Erde Flechten im Ueberfluß hervorbringt, welche dieselbe mit ihren breiten schwefelfarbigen Flecken bedecken. Im Winter werden diese Flechten unter dem Schnee durch

Digitized by Google

das durchsickernde Wasser, im Herbst und Frühjahr durch den schmelzenden Schnee selbst erweicht; das Renthier scharrt sie auf und kann ihr zähes, weich gewordenes Gewebe leichter zwischen den Backzähnen zermahlen. Auf Spitzbergen zeigen sich die Renthiere nicht in großen Rudeln, sondern in kleinen vereinzelten Gruppen; sie sind sehr scheu, mißtrauisch und schwer nahbar, auch kommt es selten vor, daß man ihrer viele auf einmal erlegt. Das Renthier hat weiter keinen Feind als den weißen Bären, und dieser jagt fast gar nicht auf dem festen Lande, auch könnte er nur durch Ueberfall ein so mißtrauisches und schnellfüßiges Thier, wie das Renthier, erreichen.

In den nordischen Gegenden ist das Meer stets mehr bevölkert als das Land. Diese Regel hält auch für die Säugethiere Stich. Nur vier darunter sind Landthiere, zwölf dagegen Seethiere. Betrachten wir zuerst die Robben oder Seehunde. Von Fischen lebend, nähern sie sich in ihrer Lebensweise den Ottern, deren Aussehen und äußere Bildung die gewöhnlicher Fleischfresser ist. Die Robben bilden den Uebergang zwischen diesen Thieren und den Walthieren. Ihre ruderförmigen Glieder gestatten ihnen nicht, sich am Lande zu bewegen; nur mühsam können sie sich fortschleppen, doch tauchen und schwimmen sie bewunderungswürdig mit Hülfe der Hinterbeine, welche, in der Verlängerung des Körpers liegend, durch Stellung und Form an den Schwanz der Walfische, der Delphine und Meerschweine erinnern. Drei Arten von Robben bewohnen die Küsten von Spitzbergen*) und leben von Fischen, Weich- und Krustenthieren. Gewöhnlich halten sie sich in den ruhigen Buchten auf, wo die Nahrung reichlicher ist, und dort künden ihnen alljährlich die russischen

*) Phoca barbata fabr., P. groenlandica Fabr, P. hispida Erxleben (P. foetida Fabr.).

Digitized by Google

und norwegiſchen Fiſcher einen unverſöhnlichen Krieg an. Kein Thier verdient dieſe Verfolgung weniger. Man verfolgt es nur, um ſich ſeines Felles zu bemächtigen und aus ſeinem Speck Thran zu gewinnen; es ſelbſt, friedlich und harmlos, ſucht ſich dem Menſchen zu nähern, ſeine großen unvergleichlich ſanften Augen ſcheinen ſein Wohlwollen oder wenigſtens ſein Mitleid anzuflehen. Als ich ganze Stunden lang vor dem Gletſcher der Magdalenenbai zubrachte, um die Temperatur der Meerestiefe aufzunehmen, kam jedesmal ein Seehund heran, ſchwamm um den Nachen herum, ſteckte den Kopf über's Waſſer und ſchien errathen zu wollen, welchen Beſchäftigungen ſich die für ihn neuen Weſen, welche ſeine Einſamkeit ſtörten, hingäben. Ich hütete mich wohl, ihn zu verſcheuchen, und mit jedem Tage kam er näher heran. Er mußte wohl meinen, der Menſch ſei kein bösartiges Thier; zutraulich geworden, wollte er die Korvette etwas zu nahe betrachten und ward durch einen Flintenſchuß getödtet. Einige Tage darauf verließen wir die Magdalenenbai, ohne Zeit gehabt zu haben, dieſes Thier zu bedauern, das durch ſeine Gegenwart dieſe eiſigen Gewäſſer belebte und die langen Stunden, welche die Anforderungen der Phyſik mich mit einigen Matroſen vor der die Bucht abſchließenden Eiswand zuzubringen zwangen, verkürzte. Es handelte ſich darum, zu wiſſen, ob das Seewaſſer unter die Temperatur von Null herabſinkt, ohne zu gefrieren. Einige Zahlen ſind das Endergebniß dieſer langen und mühſamen Arbeit. Ich ſtelle mir vor, der Seehund würde wohl innerlich gelacht haben, wenn er gewußt hätte, weshalb dieſer ſo weit hergekommene Menſch ſich ſo lange in einem Boote vor einem Gletſcher von Spitzbergen durchkälten ließ.

Im Winter iſt die Robbe anderen Gefahren ausgeſetzt; die Fjorde frieren zu, und das Bedürfniß des Athemholens führt ſie dann in die Nähe der Löcher und Spalten, welche die Eisrinde hie und da darbietet. Will ſie aber aus dem Waſſer auftauchen,

Digitized by Google

ſo iſt der Eisbär da, der ihr anpaßt und ſie mit ſeinen furchtbaren Fängen packt, die Robbe taucht von neuem unter, glücklich, wenn ſie ein anderes Loch antrifft, durch welches ſie den Kopf aus dem Waſſer ſtecken und einen Augenblick Athem ſchöpfen kann. Findet ſie weiter keine Oeffnung in der Nähe, ſo wird ſie entweder vom Bären verſchlungen, oder erſtickt unter dem Eiſe.

Gewiſſe Arten von Robben ſind nicht an die Scholle gebunden, ſondern fahren auf den Eisbergen herum, welche der Wind und die Strömungen nach allen Seiten auf dem Eismeere vor ſich her treiben. So hat Herr Torell Scharen von grönländiſchen Robben (Phoca groenlandica) auf Eisbergen zwiſchen der Bäreninſel und Spitzbergen geſehen. Auf letzterer Inſel fehlte die grönländiſche Robbe gänzlich, während die bärtige Robbe (Phoca barbata) ſehr gemein war; ſie hielt ſich auf dem Eiſe auf, welches die Baien und Fjorde erfüllte; als dieſes aber im Juli dem offenen Meere zutrieb, wanderte die Robbe ihrerſeits mit, und man traf nur noch die ſtinkende Robbe an.

Das Walroß (Trichechus rosmarus) iſt ein anderes, derſelben Familie wie die Robben angehöriges Thier. Es iſt eins von jenen Weſen, die der Menſch unförmlich nennt, weil ſie in keine der Formen hineinpaſſen, womit wir gegenwärtig die Vorſtellung der Schönheit verbinden. Der kaum vom Rumpfe geſchiedene Kopf iſt mit zwei ungeheuren, rückwärts gekrümmten Hauern, welche aus dem Rachen hervorkommen, verſehen. Der walzenförmige Leib erreicht zuweilen fünf Meter Länge und drei Meter Umfang. Seine Glieder gleichen denen des Seehundes. Zu Lande bewegt ſich das Walroß in Anbetracht ſeines Körpergewichts noch ſchwerfälliger als die Robbe, ſchwimmt aber bewunderungswürdig, lebt truppweiſe an den Küſten oder fährt auf den Eisbergen herum. Es lebt von Weich-

Digitized by Google

thieren, unter denen zwei doppelschalige Muschelthiere (Mya truncata und Saxicava rugosa) seine Hauptnahrung ausmachen. Man getraut sich nicht, die Walrosse auf See anzugreifen, denn sie vertheidigen sich gegenseitig, fallen die Boote an und bringen sie zum Umschlagen, indem sie sich an derselben Seite mit Hülfe der langen Hauer, womit ihr Oberkiefer bewaffnet ist, anhängen. Zu Lande, wo sie sich kaum fortschleppen können, tödtet der Mensch sie feiger Weise mit Speer- und Harpunenwürfen. Ihr Fell, das zu Hängriemen an Wagen dient, ihre Zähne, der Thran aus ihrem Speck sind der Gewinn, welcher die Habsucht der Jäger anstachelt. Auch sind die Walrosse an den Westküsten Spitzbergens sehr selten geworden. Ich habe nur ein einziges gesehen, welches eingeschlummert auf einem Eisberge dahinfuhr. Ein Flintenschuß weckte es, doch war es nicht verwundet worden und verschwand sofort unter Wasser. Diese Thiere sind gewöhnlicher auf der Ostküste Spitzbergens, welche meist durch Bankeis blockirt ist. In den Jahren, wo diese Eisbank bricht, begeben sich die Jäger in diese Gegenden; die Walrosse haben sich friedlich vermehrt und nun wird entsetzlich darunter aufgeräumt.

Alle übrigen Seesäugethiere Spitzbergens gehören den Walen oder Cetaceen an. Aeußerlich gleichen diese Thiere den Fischen, von denen sie nichtsdestoweniger grundverschieden sind, denn sie bringen lebendige Junge zur Welt, die das Weibchen lange Zeit säugt, sie athmen durch Lungen und haben nur zwei Floßfedern oder vielmehr zwei Brustruder, deren Bau dem der Vorderglieder eines Säugethiers und nicht eines Fisches entspricht. Auf dem Rücken bemerkt man oft eine Rückenflosse. Die Hinterglieder fehlen völlig. Der Schwanz, meist gespalten, ist horizontal und nicht wie bei den Fischen vertikal; derselbe ist ein mächtiges Bewegungswerkzeug, welches nach Art der Schraube bei Dampfschiffen thätig ist. Bei den meisten Cetaceen

Digitized by Google

kommt der Kopf dem vierten Theile, ja zuweilen dem Drittel der Länge des Thieres gleich, und alle die, von denen die Rede sein wird, sind den Naturforschern unter dem Namen Spritz-Wale bekannt. Der hintere und obere Theil ihres Kopfes ist nämlich mit einer Oeffnung versehen, die mit dem Schlunde und den Nasengruben in Verbindung steht; durch diese Oeffnung stoßen diese Thiere mit Macht die Luft aus, welche in ihre Lungen gedrungen ist, oder das Wasser, welches ihren Rachen anfüllt. In letzterem Falle schießt ein Strahl über ihrem Haupte in die Höhe. Schon von weitem erkennt man die Walfische an diesem Wasserstrahle, den man bis zu einer Höhe von 12 Meter hat aufsteigen sehen. Alle diese Wale sind Fleischfresser, und ihr Maul ist mit gleichartigen, spitzigen Zähnen oder mit Barten, gewöhnlich Fischbein genannt, besetzt.

Fangen wir bei den Delphinen an, die bezüglich die kleinsten unter den Walthieren sind. Der weiße Delphin, Beluga von den Russen genannt (Delphinapterus leucas Pallas), ist ein Thier von schmutzigweißer Farbe und 4 bis 6 Meter Länge; es schwimmt, indem es nach Art der Meerschweine Purzelbäume im Wasser schlägt und mit Macht bläst, um die Luft durch das Spritzloch auszustoßen, welches sich senkrecht über der Schnauze öffnet; Rückenflossen hat es nicht. Zwei von ihnen strichen eines Tages an einem Bote vorbei, worin ich mich mit einigen Matrosen befand; wir begriffen Alle, daß ein einziger Schlag mit ihrem mächtigen Schwanze hingereicht haben würde, dasselbe umzuschlagen.

Der Tummler oder Butzkopf (Phocaena orca Cuv.) ist ein gewaltiger Delphin, dessen Rückenflosse einem Säbel gleicht; er erreicht 6 bis 8 Meter und lebt in Scharen beisammen, die, wie man sagt, den Walfisch angreifen. Er schwimmt mit solcher Geschwindigkeit, daß es unmöglich ist, ihn zu harpuniren, man tödtet ihn mit Flintenschüssen.

Digitized by Google

Die Narwale*) sind große, 4 bis 6 Meter lange Cetaceen, mit einem Zahn bewaffnet, der 2 bis 3 Meter mißt und über die Schnauze in der Verlängerung des Körpers hinausragt. Dieser eine Zahn sollte eigentlich doppelt sein, doch verkümmert einer fast immer und nur der andere entwickelt sich; er ist spindelförmig in einer Spirale gedreht und von elfenbeinartiger Masse, wie der, welchen die Fabel auf das Haupt des phantastischen Einhornes gesetzt hat. Beim Weibchen verkümmern beide Zähne und treten nicht aus der Zahnhöhle hervor. Trotz der furchtbaren Lanze, womit der Narwal bewaffnet ist, ist er ein harmloses Thier, denn er nährt sich von kleinen Fischen und Mollusken. Eine andere Cetacee welche sich den Walfischen nähert, ist der Schnabelwal (Hyperoodon borealis Nils, H. rostratus Wesm.); er hat nicht den Zahn des Narwal, sondern einfach eine vorstehende Schnauze. Es ist ein Thier, das nie über 8 Meter Länge hinauskommt und dessen Fell schlicht schwarz über den ganzen Leib ist. Die Rückenflosse erhebt sich zu Anfang des hintern Drittels des Körpers, die Zähne sind kaum sichtbar und fallen frühzeitig aus, die Zunge ist mit dem Unterkiefer zusammengewachsen. Dieses Thier nährt sich ebenfalls von Fischen, Weichthieren und Holothurien.

Man hat oft die Bemerkung gemacht, daß die größten Thiere der Schöpfung die Cetaceen der Polarmeere im Allgemeinen und die Walfische im Besondern sind. Zwei Arten besuchen gewöhnlich die Striche von Spitzbergen. Die erste ist der faltenbäuchige nordische Finnfisch (Balaenoptera boops L.) Es ist das längste aller Thiere, denn es giebt ihrer, die 34 Meter vom Kopf bis zum Schwanz messen, die meisten messen 25 bis 30 Meter. Seine Dicke aber steht nicht im Verhältniß

*) Monodon monoceros L.

Digitized by Google

zur Länge, denn dieser Finnfisch ist das am wenigsten plumpe unter den Cetaceen. Der Leib, gleichsam walzenförmig, geht in einen verlängerten Kopf über, der beinahe den vierten Theil der Gesammtlänge des Thieres bildet. Längsfalten, deren Gebrauch unbekannt ist, ziehen sich vom Rande des Kiefers bis zum Nabel hin, und auf dem Rücken erhebt sich eine große aus Fett gebildete Flosse, welche ihm den Namen Finnfisch oder Flossenwal eingetragen hat. Sein Rachen ist mit Barten besetzt; er nährt sich von kleinen Fischen und Mollusken. Scheuer als der Walfisch, ist er schwerer zu harpuniren. Sein Fell giebt wenig Thran, weshalb ihn die Walfischfänger auch minder eifrig und nur in Ermangelung gemeiner Walfische verfolgen. Mehre zur Winterszeit an den Strand des Ozeans getriebene Individuen sind von verschiedenen Autoren beschrieben worden. Diese Umstände beweisen, daß der nordische Finnfisch weite Reisen in die gemäßigten Theile des Atlantischen Meeres unternimmt.

Die Meere von Spitzbergen ernähren noch eine andere, der vorigen sehr ähnliche Art von Finnfisch, die einige Naturforscher aber durch den Namen Riesenfinnfisch*) davon unterscheiden. Es giebt auch noch eine dritte, die kleinste von allen, nämlich den spitzmäuligen Finnfisch,**) ein Wal von nur 10 Meter Länge; gleich den beiden andern weist er Brust- und Bauchfalten auf. Seine Barten, statt schwarz wie die der anderen Finnfische und des Walfisches, sind von gelblich weißer Farbe. Er führt dieselbe Lebensweise wie seine Vettern.

Wir haben jetzt nur noch den gemeinen Walfisch,***) das größte und dickste unter den Thieren der Schöpfung der Gegenwart, zu besprechen. Er unterscheidet sich von den Finnfischen durch

*) Balaenoptera gigas Eschr.
**) Balaenoptera rostrata Fabr.
***) Balaena mysticetus L.

Digitized by Google

das Fehlen der Rückenflosse und der Falten unter dem Bauche, von den Schnabelwalen dadurch, daß sein Rachen mit Barten und nicht mit Zähnen besetzt ist. Der nordische Walfisch erreicht oft 20 Meter Länge, sein Kopf bildet ein Drittel der Länge des Thieres. Sein durchschnittliches Gewicht kann auf 100,000 Kilogramme geschätzt werden. Die Flossen haben 3 Meter Länge bei 2 Meter Breite. Das Fell mit dem Speck besitzt eine Dicke von 20 bis 50 Centimeter. Die Barten, womit sein Rachen besetzt ist, haben 3 bis 5 Meter Länge. Dieses riesige Wesen nährt sich nur von kleinen Seethieren, wie Medusen, Krustenthieren, Tintenfischen, vor allem von der Clio borealis, einem kleinen Weichthiere mit zwei Flossen, von denen es in den nordischen Meeren wimmelt. Der Walfisch öffnet seinen breiten Rachen, indem er pfeilgeschwind dahinschießt; die in diesem gähnenden Schlunde gefangenen Thierchen können dann, durch die Barten festgehalten, nicht wieder heraus, nun schließt das Ungethüm den Rachen, stößt das Wasser durch seine Spritzlöcher aus und verschluckt darauf die Tausende von kleinen zwischen seinen Kiefern gefangenen Seethiere.

Ehemals war der Walfisch an den Westküsten Spitzbergens, namentlich zwischen dem 78. und 80. Grade, sehr gemein. Flotten von holländischen, englischen und französischen Schiffen begaben sich jährlich in diese Gegenden, und allesammt kehrten mit Thran und Fischbein beladen wieder heim. Als der Walfisch seltener wurde, verfolgte man ihn bis in das Treibeis, wo das Meer stellenweise oft frei ist; die holländischen Walfischfänger fürchteten nicht, alle Segel auszusetzen und das feste Eis mit dem Panzer, welcher das Vordertheil ihrer Schiffe bekleidete, zu spalten; in diesen Binnenseen verfolgten sie dann die Walfische, welche sich vor ihren Würfen gedeckt glaubten. Um abermals durch das Treibeis durchzukommen und das offene Meer zu gewinnen, verließen sie sich auf Wind und Strömung. Nur

Digitized by Google

die zur Aufsuchung John Franklin's ausgesandten Seefahrer haben es der Kühnheit dieser verwegenen Seeleute gleichgethan. Indeß nahm die Zahl der Walfische mit jedem Jahre ab. Das Weibchen giebt nämlich nur Einem Jungen nach einer Tragezeit von zehn Monaten das Leben, und die auf Spitzbergen gejagten Walfische haben sich an die Küsten Grönlands und in die Baffinsbai geflüchtet, wo die Walfischfänger sie gegenwärtig bis unter den 78. Breitegrad in der Lancaster- und Melvillestraße aufsuchen.

Vögel.

Im Sommer ist die Zahl der Vögel, welche Spitzbergen aufsuchen, unberechenbar, das Verzeichniß der Arten dagegen sehr kurz; dasselbe übersteigt nicht 22, von denen nur 2 Landvögel sind; die andern sind See- oder Wasservögel. Eine einzige Art, das Schneehuhn des Nordens, wandert nicht, alle andern sind Zugvögel.

Vögel Spitzbergens.

Sperlinge. Emberiza nivalis L.

Hühnervögel. Lagopus hyperborea (Tetrao lagopus L.)

Strandläufer. Charadrius hiaticula L., Tringa maritima Brunn; Phalaropus fulicarius L.

Schwimmvögel. Sterna arctica Temm., Larus eburneus Phipps., L. tridactylus L., L. glaucus Brunn., Lestris parasitica Nils., Procellaria glacialis L., Anser bernicla L., A. leucopsis Bechst., A. segetum Gmel., Anas glacialis L., Somateria mollissima L., S. spectabilis L., Colymbus septentrionalis L., Uria grylle L., U. Brunnichii L., Alca alle L., Mormon arcticus L.

Wenn die Anzahl der Arten beschränkt ist, so ist die der Individuen dagegen so beträchtlich, daß ihre Gegenwart die stillen und öden Küsten Spitzbergens belebt. Bei der ersten

Digitized by Google

Landung hat man Mühe, sich von diesem erstaunlichen Zusammenströmen Rechenschaft zu geben. Die Erde ist mit Schnee bedeckt, die Vegetation sehr arm, Insekten nur in 15 Arten vertreten. Eine kleine Zahl von Torfmooren zwischen den Bergen und dem Meere nähren weder Würmer, noch Mollusken, noch Fische, dagegen wimmelt das Meer von Thieren, namentlich von Mollusken und Krustaceen. Hier ist die Zahl der Arten gleichermaßen beschränkt, man kennt nur 10 Arten von Fischen an den Küsten von Spitzbergen. Der Polarschellfisch ist der gemeinste von allen.

Eine große Anzahl von Seevögeln, welche den Winter über unsere Küsten bewohnen, zieht zum Eierlegen nach Spitzbergen, wo sie sicher sind, reichliches Futter und Ruhe zu finden. Nicht alle legen und brüten ohne Unterschied an allen Punkten der Küste. Die einen, wie die Gänse, gefallen sich an den Gestaden des festen Landes, andere, wie die Eidervögel und Raubmöven lieben die kleinen, niedrigen und mit Wassertümpeln übersäeten Inseln; die meisten flüchten sich auf die Felsen, welche unmittelbar in's Meer hinausragen. Die Zahl derselben ist so groß, daß diese Felsen unter dem Namen der Vogelberge bekannt sind. Die Abdachungen dieser Felsen, aus hinter- und übereinander liegenden, den Gallerien und Logen eines Schauspielhauses ähnlichen Schichten gebildet, sind mit Weibchen bedeckt, die, über ihre Eier geduckt, den Kopf dem Meere zugewandt, eben so zahlreich, eben so gedrängt wie die Zuschauer in einem Theater am Tage einer ersten Vorstellung dasitzen. Vor dem Felsen bilden die Männchen eine wahre Wolke von Vögeln, die in die Lüfte steigen, die Fluten bestreichen und untertauchen, um die Krustenthierchen zu fangen, welche die Hauptnahrung der Brütenden bilden. Die Unruhe, das Wirbeln, der Lärm, das Geschrei, das Quaken, das Pfeifen dieser tausend und aber tausend Vögel, so verschieden an Größe,

Digitized by Google

Farbe, Gang und Stimme zu beschreiben, ist unmöglich. Der Jäger, betäubt und verdutzt, weiß nicht, wo er in diesem lebendigen Strudel Feuer geben soll, er vermag den Vogel, auf den er anlegen will, nicht zu unterscheiden, geschweige ihn zu verfolgen. Des Dinges müde, zielt er mitten in die Wolke hinein, der Schuß geht los. Nun aber steigt der Aufruhr aufs höchste. Schwärme von Vögeln, die auf dem Felsen saßen oder auf dem Wasser schwammen, fliegen jetzt ebenfalls auf und mischen sich unter die übrigen, endloses, mißtönendes Gekreisch erhebt sich in den Lüften. Weit entfernt, sich zu zerstreuen, wirbelt die Wolke nur noch toller. Die Seemöven, die vorher unbeweglich auf kaum über die Wasserfläche hervorragenden Klippen saßen, flattern geräuschvoll hin und wieder, die Seeschwalben umkreisen das Haupt des Jägers und schlagen ihn mit den Fittigen in's Gesicht. Alle diese so verschiedenen Arten, welche hier auf einem, mitten in den Wogen des Eismeeres vereinzelt dastehenden Felsen friedlich vereint sind, scheinen dem Menschen vorzuwerfen, daß er bis an's Ende der Welt das große Werk der Natur, die Fortpflanzung und Erhaltung der Thierarten, zu stören komme. Die Weibchen allein, durch die Mutterliebe festgebannt, begnügen sich damit, ihre Klagen mit denen der erzürnten Männchen zu vereinen, unbeweglich bleiben sie auf ihren Eiern sitzen, bis man sie gewaltsam davon nimmt oder bis sie, getroffen, auf diesem Neste fallen, das die Hoffnungen und Freuden der Familie barg.

Die Vögel sitzen nicht auf's Gerathewohl auf den Felskränzen an einander gereiht. Im Schauspielhause stellt der Reichthum zwischen den Zuschauern eine Klassifikation her, die wahrscheinlich ganz anders ausfallen würde, wenn sie sich auf Geschmack oder Bildung stützte, in ähnlicher Weise sind auf einem Vogelberge die ornithologischen Arten nicht bunt durch einander gemischt. Es giebt solche, wo der nordische Sturmvogel (Pro-

cellaria glacialis), der kühnſte unter den Seevögeln herrſcht. Herr Malmgrén hat einen derartigen Felſen unter 80° 24′ n. Br. geſehen. Die Lummen (Uria grylle) nahmen die untern Sitze ein, die Sturmvögel die Mittelſtufen über einer Höhe von 250 Meter und ganz oben die Silbermöve. Auf einem andern Felſen war es die weiße Möve (Larus eburneus), welche die Mehrzahl bildete, höher hinauf befand ſich die dreizehige Möve und endlich, wie oben, die Silbermöve. Auf gewiſſen Felſen ſind es die Fettgänſe (Alca torda), welche alle Vorſprünge bis zur Höhe von 30 bis 60 Meter beſetzt halten, darüber die Lumme (Uria grylle) in großer Anzahl, dann der nordiſche Larventaucher (Mormon arcticus) und endlich das kleine Taucherhuhn (Uria Brunnichii), das ſich in zahlloſen Schwärmen auf Spitzbergen findet.

Auf dieſen ſenkrechten Felſen ſind die Vögel ſicher vor den Verfolgungen ihres grauſamſten Feindes, des blauen Fuchſes, der eben ſo lüſtern nach den Eiern als nach den Müttern iſt. Anders würde es ſich bei denen verhalten, welche auf den niedrigen Inſeln, die das Eis mit dem feſten Lande verbindet, niſten; auch wiſſen dies die Eidervögel recht gut, denn ſie laſſen ſich nie daſelbſt nieder, es ſei denn, daß die Inſel ganz vom Waſſer umgeben iſt; ohne dies würden ſämmtliche Weibchen eine Beute der Füchſe. Das Neſt liegt nämlich in einer Linie mit dem Boden, iſt in den Sand geſcharrt und mit dem koſtbaren Flaum, den wir unter dem Namen Eiderdunen kennen, gepolſtert. Dieſe Federn entreißt das Weibchen dem eigenen Bauche. Der Menſch beutet dieſen Trieb des Eiderweibchens aus. Die ganze norwegiſche Küſte entlang bilden die Inſeln, wohin die Eidervögel zum Brüten kommen, hoch im Preiſe ſtehende Beſitzungen. Ein auf der Inſel wohnhafter Aufſeher ſchützt die Eidervögel, die ſich nicht ſcheuen, ihr Neſt bis

Digitized by Google

dicht vor die Schwelle seines Hauses zu bauen. Einen Schuß auf einer dieser Inseln abzufeuern, ist ein mit schwerer Geldstrafe belegtes Vergehen. Zweimal nimmt der Hüter die Eiderdunen, womit das Nest ausstaffirt ist, weg, nachdem er das Weibchen sacht entfernt hat, wenn es aber zum dritten Male den Flaum aus seinem Bauche reißt, so läßt er es in Ruhe seine Brutzeit vollenden, denn er weiß, daß es im nächsten Jahre zurückkommt, um ihm einen abermaligen Tribut zu bringen.

Die Schwimmvögel herrschen unter den Vögeln Spitzbergens vor, gerade weil sie sämmtlich von Seethieren leben. Die drei einzigen Strandläufer, der Regenpfeifer, der schwärzliche Strandreiter und der Wassertreter leben am Meeresstrande und in der Nähe der kleinen Teiche. Die beiden ersteren nähren sich von der im Moose häufigen Larve einer Mücke, einer Art von Regenwurm oder von kleinen auf der Oberfläche des Meeres in der Nähe des Gestades schwimmenden Krustenthieren, der dritte geht einer kleinen kugelförmigen Alge nach, die zur Gattung Nostoc zu gehören scheint. Kein insektenfressender Vogel könnte auf Spitzbergen ausdauern, wo es weder Käfer, noch Schmetterlinge, Wanzen oder Heuschrecken giebt.

Das Schneehuhn, der Schneeammerling und die drei Arten von wilden Gänsen sind die einzigen grasfressenden Arten, auch sind diese Arten außer der Ringelgans (Anser bernicla) selten. Das Schneehuhn überwintert auf Spitzbergen, und sein Dasein während starrer Kälte ist wie das des Renthiers ein Räthsel. Unter den Schwimmvögeln spielen die Möven die Rolle der Raubvögel; sie sind es, die sich besonders von Fischen nähren, das Aas der Cetaceen zerfleischen und sich in unermeßlicher Zahl auf das, während des Zerlegens am Schiffe festgebundene Walfischfell stürzen. Die Raubmöve (Lestris parasitica) fällt die übrigen Vögel an, zwingt

Digitized by Google

sie, die Nahrung, welche sie verschlungen haben, von sich zu geben, und fängt sie beim Herabfallen in der Luft auf. Die Sturmvögel gehen ihrer Beute auf offenem Meere nach und folgen oft den Schiffen. Die andern Vögel schwimmen auf der Oberfläche der Gewässer und tauchen unter, um ihren Unterhalt darin zu finden; sie sind es, die die Küsten von Spitzbergen beleben. Anfangs zutraulich, fliehen sie bei der Annäherung der Menschen nicht; die Taucher umschwimmen die Boote, die Seeschwalben streifen in ihrem pfeilschnellen Fluge den Kopf der Ruderer, die ersten Flintenschüsse aber machen diese Vertraulichkeiten ein Ende, und nach Verlauf mehrer Tage werden diese sonst so zutraulichen Vögel scheu und ängstlich wie die der civilisirten Länder.

Fische und wirbellose Thiere.

Ich werde bei den übrigen Klassen des Thierreichs nicht lange verweilen, ich habe beiläufig bereits bei Gelegenheit der niederen Thiere, von denen sich die Cetaceen nähren, von ihnen gesprochen. Bei diesem strengen Klima herrscht immer dieselbe Armuth an Arten und derselbe Reichthum an Individuen. Kein einziges Reptil kommt auf Spitzbergen vor. Die Fische, zehn Arten, den Drachenköpfen, Schleimfischen, Salmen und Schellfischen angehörend, werden immer weniger gemein, je mehr man sich dem Norden nähert; der Polarschellfisch ist der einzige, der reichlich vorhanden ist.

Die Strandmollusken sind selten; Herr Torell hat nur die Littorina groenlandica bemerkt. Manche schwimmende oder in der Tiefe lebende Arten aber sind sehr verbreitet, namentlich ein Flossenfüßer, die Clio borealis, welche den Walfischen als Hauptnahrung dient, und andere, den Klassen der Kopflosen, der Arm- und Bauchfüßer angehörende Weichthiere. Ich gebe in der An-

Digitized by Google

merkung das Verzeichniß derer, welche Herr Torell angezeigt hat,*) sie finden sich sämmtlich in den Gletscherablagerungen Schwedens.

Wenn man die Küste Spitzbergens erforscht, so möchte es scheinen, als ob das Meer kein einziges Krustenthier ernährte, öffnet man aber den Kropf der Seevögel, so findet man ihn mit den Ueberresten dieser Thiere angefüllt, und man ist daraus gezwungen zu schließen, daß die Krustaceen im Eismeere in Menge vorhanden sind. Herr Goes zählt sechs Arten auf, die zu einer einzigen Familie, der der zehnfüßigen Krustaceen mit gestielten Augen zählen,**) der auch die Krabben, Landkrabben und Eremitenkrebse angehören.

Wir haben bereits bemerkt, daß es nur fünfzehn Insektenarten auf Spitzbergen giebt, nämlich mehrere Arten von Springschwänzen, Zweiflüglern, Hautflüglern und eine Art von Wassermotten oder Netzflügler. Die Spinnen sind durch vier oder fünf Arten von Acarus vertreten.

Die niedern, der Klasse der Strahlthiere angehörenden Geschöpfe sind noch nicht gehörig bekannt, doch weiß man, daß sich darunter schon von Friedrich Martens abgebildete Seesterne, ferner Medusen- und Melonenquallen befinden, die in gewissen Strichen so zahlreich sind, daß die Farbe des Seewassers dadurch verändert wird und nach dem Zeugnisse Scoresby's, der stundenlang auf diesem green-water, wie er es selbst nennt, herumfuhr, von blau in gelbgrün übergeht.

Hier endet unsere physische Schilderung Spitzbergens. Gleich von vornherein bemerkten wir, daß dieses Inselmeer das Bild einer der unsrigen vorangegangenen geologischen Epoche, der-

*) Mya truncata, Saxicava rugosa, Pecten islandicus, Cardium groenlandicum, Arca glacialis, Astarte corrugata, Leda pernula, Yoldia arctica, Natica clausa, N. Johnstonii, Tritonium norvegicum, T. cyaneum, T. clathratum, Trichotropis borealis, Terebratella Spitzbergensis.

**) Hyas araneus L., Pagurus pubescens Kroey. Hippolyte Gaimardi M. Edw., H. Phippsi Kroey, H. Sowerbyi Leach u. H. polaris Sab.

Digitized by Google

jenigen darbiete, wo ein Theil Europas und Amerikas unter ungeheuern Gletschern, ähnlich denen, welche gegenwärtig die Thäler Spitzbergens anfüllen und die Ebenen Grönlands bedecken, schlummerte. Die erratischen Blöcke Norddeutschlands, die geglätteten und gestreiften Felsen Skandinaviens, Finlands, Schottlands und des nördlichen Amerikas sind die stummen Zeugen dieser ehemaligen Ausdehnung jener Haube von Polareis. Die arktischen Pflanzen, welche noch in den Sümpfen und auf den Hochgebirgen Europas fortkommen, sind lebendige Zeugen derselben. Auch die Thiere bezeugen diese ehemalige Ausdehnung. So bewies schon im Jahre 1846 Edward Forbes, daß die Muschelthiere, welche sich in den erratischen Ablagerungen in Schottland, im Norden Englands, in Irland und auf der Insel Man finden, Muschelthiere seien, welche arktischen Arten angehörten, die gegenwärtig in den die Küsten Englands bespülenden Meeren unbekannt, größtentheils an den Küsten Labradors leben. Das Meer, welches England umgab, besaß eine niedrigere Temperatur, als seine jetzige ist. Damals waren die britischen Inseln noch nicht völlig aufgetaucht und hingen mit Island und dem europäischen Festlande zusammen. In Schweden trifft man Schichten mit Fossilien an, welche zuweilen eine Dicke von 12 Meter erreichen und 200, ja 250 Meter über dem Meere liegen. Die zu Udevalla bei Gothenburg sind die berühmtesten; die in denselben enhaltenen Muscheln weisen auf eben so kalte Gewässer hin, wie die sind, welche die Küste des westlichen Grönlands bespülen. In Rußland haben die Herren Murchison und de Verneuil an den Ufern der Dwina arktische Muschelbetten gefunden. In Amerika an der St. Lorenz-Mündung hat man Arten erkannt, die eins sind mit denen, welche der Eiszeit Schwedens angehören. Eine in den arktischen Meeren sehr gemeine Art, die **Mya truncata**, findet sich in fossilem Zustande in den jüngsten Schichten

Siciliens, das Thier selbst aber ist gänzlich aus dem Mittelländischen Meere verschwunden. Ein schwedischer Gelehrter, den wir unter den Erforschern Spitzbergens genannt haben, Herr Torell, hat diese in den oberflächlichsten Schichten Englands und Schwedens gefundenen arktischen Muscheln aufgezählt und sie selbst mit den noch lebenden Individuen der arktischen Gegenden im Allgemeinen und Spitzbergens im Besondern, verglichen.*)

Wir haben gesehen, daß eine gewisse Anzahl von Pflanzen sich nach dem Zurückziehen der großen Gletscher in Mitteleuropa gehalten hat. Gewisse Thierarten bieten uns dasselbe Schauspiel dar. In den die britischen Inseln umgebenden Meeren fischt man in Tiefen von 160 bis 200 Meter Mollusken auf, die gegenwärtig nur noch in den arktischen Meeren leben; mehre sind selbst indentisch mit denen, welche sich in den Schichten der Eiszeit, die in Schottland und im nördlichen England unter dem Namen Drift bekannt sind, vorfinden. Die oberflächliche Schicht des im Rheinthal zwischen Basel und Straßburg Löß genannten Bodens hat uns ebenfalls Arten von Schnirkelschnecken (Helix) aufbewahrt, die man lebend nur auf den Gipfeln der Alpen antrifft. Während der Periode, wo die Schweizer Ebenen mit einem ungeheuren Eismantel, welcher alle umliegenden Gegenden erstarren machte, bedeckt waren, vermochten diese Schnirkelschnecken zu leben und sich im Rheinthal fortzupflanzen; gegenwärtig treffen sie nur noch auf den Hochgebirgen das ihrer Organisation zusagende Klima an.

Es giebt noch überraschendere Thatsachen; ein schwedischer Naturforscher, Herr Lovén, hat in bedeutender Tiefe in den großen schwedischen Seen, dem Wenner- und Wettersee, Krustaceen**)

*) Hier die Namen einiger dieser Arten: Pecten islandicus, Arca glacialis, Terebratella Spitzbergensis, Yoldia arctica, Tritonium gracile, Trichotropis borealis, Piliscus probus, Scalaria Eschrichtii.

**) Mysis relicta, Gammarus loricatus, Idothea entomon, Pontoporeia affinis.

Digitized by Google

aufgefischt, die nicht nur arktische Arten, sondern obenein Seearten sind, die entweder dem Eismeere oder dem Bottnischen Meerbusen angehören. Die Gegenwart dieser Thiere beweist, daß zur Eiszeit diese Seen mit dem Baltischen Meere in Verbindung standen und tiefe Fjorde bildeten, wie die, welche jetzt die Westküsten Skandianaviens einschneiden. Allmälig hob sich die Halbinsel, wie sie noch heute thut, die Fjorde wurden Seen, die von oberflächlichen Wasserläufen und unterirdischen Quellen gespeist wurden. Die meisten dieser Seethiere kamen um, einige aber gewöhnten sich allmälig daran, in einem weniger salzigen Wasser zu leben, und hielten sich bis heute. Die Austern und viele Thiere der Salzteiche bieten uns dasselbe Schauspiel dar. Danach organisirt, Gewässer zu bewohnen, deren Salzgehalt im Laufe des Jahres je nach den Regenfällen oder der Ausdünstung bedeutend abweicht, gewöhnen sie sich schließlich an das Süßwasser. Ein plötzlicher Wechsel würde für sie verhängnißvoll sein, ein schonender Uebergang aber gestattet ihrem Organismus, sich an eine neue Lebensweise zu gewöhnen. Ebenso wechselt der Salzgehalt der Fjorde, je nachdem die Flüsse und Bäche, vom Schmelzen des Schnees oder durch anhaltende Regen angeschwollen, ihnen eine bedeutende Menge süßen Wassers zuführen oder, während alle Zuflüsse durch die Winterfröste gehemmt sind, die Stürme vom Meere her das Salzwasser bis tief in die entlegensten Kanäle hineintreiben. Man begreift also, daß die Krustenthiere, deren Vorfahren diese Fjorde, welche gegenwärtig durch die beiden großen schwedischen Seen ersetzt worden sind, bevölkerten, in den bedeutenden Tiefen dieser Süßwasserflächen verborgen geblieben sind, lebendige Zeugen der Senkung Skandinaviens unter das Eismeer, das es damals umgab, und seiner langsamen und allmäligen Erhebung seit jener Zeit.

Ueberall an den Küsten Schwedens und Norwegens trifft

Digitized by Google

man über dem jetzigen Gestade offenbare Spuren ehemaliger Gestade an, die nicht nur die Erhebung der Küste festzustellen, sondern auch zu messen gestatten. Diese alten Meerspiegellinien entsprechen arktischen Muschelbetten, und die Geologie in Uebereinstimmung mit der Zoologie weist uns zugleich das Vorhandensein einer Eiszeit und das beständige Schwanken der Erdrinde nach, welches fast im ganzen Lande durch die Erhebung oder Senkung der Küsten auf den Inseln und Festländern bezeugt wird.*)

Die in der Nähe des Südpols liegenden Länder bieten uns gleich denen des Nordpols das ungeschwächte Bild der Eiszeit dar. Die von Dumont d'Urville und James Roß entdeckten Gestade von Sabrina, Adelaide nnd Victoria sind wie Spitzbergen und Grönland unter Gletschern begraben. Das Meer ist besäet mit Legionen von Eisbergen, welche die Strömungen nach Norden fortreißen. Auf Neuseeland hat Hochstetter auf dem kurzen Abhange der Centralkette Gletscher schon in einer Höhe von nur 200 Meter über dem Ozean und umgeben von einer reichen Vegetation baumstämmiger Farne angetroffen. Ueberall trägt die Insel unzweideutige Spuren einer Epoche an sich, wo diese Gletscher bis zum Meere herunterreichten. Die Kältezeit hat demnach auf dem ganzen Erdboden geherrscht, und es wäre eitle Mühe, sie durch örtliche Veränderungen in der Gestaltung von Meer und Land erklären zu wollen. Eine allgemeine Ursache kann einzig und allein Rechenschaft von einem Phänomen geben, das, von den beiden Polen des Erdballs ausgehend, sich über die Hälfte jeder der beiden Hemisphären ausgebreitet hat.

---

*) Siehe über diesen Gegenstand die Abhandlung Bravais' über die alten Meerspiegellinien (Voyages an Scandinavie de la corvette la Recherche. Géographie physique. t. I. p. I.) und eine Studie von Herrn E. Reclus (Revue des deux mondes 1. janvier 1865).

Digitized by Google

Hier endet diese lange und ernste Untersuchung. Haben wir uns in der Voraussetzung getäuscht, daß der Leser uns unermüdet folgen würde, während wir vor seinen Augen das rauhe Bild der nördlichsten Länder und Meere Europas entrollten, des Aufenthaltsortes von Pflanzen und Thieren, welche Sommers ohne Wärme zu leben und Winters einer selbst für die trägste Einbildungskraft erschreckenden Kälte Widerstand zu leisten vermögen? Männer, ja Helden, wie Barentz, Franklin, die beiden Roß, Richardson, Parry, Maclure, Maclintock, Inglefield, Belcher, Penny, Bellot, Kane, Hayes haben ihr getrotzt; allein sie waren von Gefühlen beseelt, welche den Menschen über alle Schwierigkeiten emporheben und ihn gegen alle Gefahren gleichgültig machen, vom heiligen Feuer der Wissenschaft und der Liebe für wahren Ruhm, jenen Ruhm, der darin besteht, nicht, seinen Nebenmenschen zu tödten, sondern der Menschheit zu dienen und sie zu zieren.

Digitized by Google

Das Nordkap von Lappland.

Am 13. August 1838 reiste ich von Hammerfest ab, um das Nordkap zu besuchen. Zwei Böte enthielten die Mehrzahl der Offiziere von der Korvette Recherche, welche die Mitglieder des wissenschaftlichen Nordausschusses nach Lappland geführt hatte und sie weiter nach Spitzbergen führen sollte. Beim Auslaufen aus dem Hafen betraten wir unmittelbar den breiten zwischen den Inseln Qualoe und Soroe liegenden Kanal, und nicht lange, so befanden wir uns fast auf offener See. Die Luft war still, ja zu still, denn wir kamen nur vermöge unserer Ruder vorwärts, und während die leichte norwegische Barke pfeilgeschwind über das Wasser hinglitt, hatte die schwerfällige Schaluppe der Korvette Mühe ihr zu folgen. Abends stiegen wir bei Rolfsoe an's Land; es ist dies eine von mehren Fischern bewohnte Insel. Wir brachten einige Stunden daselbst zu, um den erschöpften Matrosen Ruhe zu gönnen, und ich hatte Muße, dort mehre Pflanzen unserer Ebenen und Gebirge zu sammeln, welche auf diesem Eiland ihre nördliche Grenze erreichen.

Rolfsoe verlassend, wandten wir uns östlich, um den Havoesund zu durchschneiden, einen engen Kanal, der die Insel Havoe von der äußersten Spitze des europäischen Festlandes trennt.

Digitized by Google

Ein Kaufmann, Namens Ulich, deſſen Vater den König Louis Philipp während ſeiner Reiſe nach Lappland aufgenommen hatte, wohnt allein auf dieſer einſamen Inſel. Sein weißes mit grünen Fenſterläden verſehenes Haus iſt von Wieſen umgeben und liegt auf einer kleinen Anhöhe, welche das Ufer beherrſcht. Zahlreiche Magazine faſſen den Rand des Meeres ein, und die Fiſcherbarken kommen hierher, um ihre Fiſche auszuladen und dagegen Waaren aller Art einzutauſchen. Am Eingange der Meerenge befindet ſich eine hübſche Kirche, wo Reiſeprediger den lutheriſchen Kultus für die Bewohner der Umgegend feiern. Dieſe kommen in Böten von den entlegenſten Punkten des Archipels herbei, wohnen dem Gottesdienſte bei, plaudern von ihren Geſchäften und berauſchen ſich leider auch an ſtarken Getränken. Dieſe auf einer Inſel oder auf einem öden Vorgebirge liegenden Kirchen und Kaufmannshäuſer überraſchen den Reiſenden immer, der zum erſten Male Norwegen beſucht. Man begreift nicht, mit welchem Handel ſich ein Kaufmann befaſſen kann, der die Einſamkeit bewohnt; dieſer Kaufmann iſt aber gleich der Kirche der gemeinſame Mittelpunkt dieſer zerſtreuten Bevölkerung. Die Lappen, Hirten und Nomaden, den Sommer über an der Küſte und auf den benachbarten Inſeln mit ihren Rennthierheerden umherirrend, bringen ihm die Felle und Geweihe der Thiere, die ſie zu ihrem Lebensunterhalt geopfert haben. Seßhafte und Fiſchfang treibende Lappen wohnen im Hintergrunde eines entlegenen Fjords, wo ſie von dem Gewinn ihres Fanges leben, deſſen Ueberſchuß ſie verkaufen. Die Quäner oder eingewanderte Finnen dienen als Arbeiter. Die Ruſſen, welche von Archangel des Fiſchfangs halber in die Gewäſſer Spitzbergens und des Nordkaps kommen, und die Norweger, welche ſich demſelben Erwerbszweige hingeben, treiben Handel mit ihm. Dieſe an der Küſte zerſtreuten Händler kaufen den Fiſch in Kleinen ein und ſchicken ihn an die

Digitized by Google

Kaufherren in Hammerfest und Bergen, welche ganze Schiffsladungen voll Stockfisch nach allen Welttheilen versenden. Der Kaufmann auf der Insel Havoe trägt dagegen Sorge für den Bedarf der armen Bevölkerung in seiner Umgebung und verkauft ihnen alle zu ihrem Nomadenleben nothwendigen Gegenstände.

Herr Ulich hatte nichts vernachlässigt, seine Einsamkeit zu verschönern; er pflegte einen kleinen Garten, wo er mir sehr schönen Welschkohl und Kohlrabi, sowie Erbsen zeigte, welche 3 Decimeter Höhe hatten und zuweilen eßbare Schoten liefern, ferner Möhren, deren Wurzeln die Dicke eines Zeigefingers erreichen, Runkelrüben vom selben Umfange, Lattich, Kresse und Blumenkohl, welche nur alle fünf oder sechs Jahre etwa einschlagen. Man wird sich darüber nicht wundern, wenn man weiß, daß die mittlere Jahrestemperatur 1 Grad C. unter Null beträgt, die Temperaturen der verschiedenen Jahreszeiten sind annähernd folgende:

Winter	— 8°	Sommer	+ 6°
Frühling	— 5°	Herbst	+ 2°

Im Winter fällt das Thermometer bisweilen auf — 15 Grad, selten aber darunter, im Sommer beträgt das Maximum im Allgemeinen + 15 Grad, der größte Umfang der thermometrischen Oscillation beträgt demnach 30 Grad C.

Dem Hause des Herrn Ulich gegenüber erhebt sich ein Vorgebirge, es ist das am weitesten hinausgeschobene des europäischen Kontinents. Der Gipfel liegt 316 Meter über dem Meere, doch besitzt es weder die Erhabenheit, noch die Berühmtheit desjenigen, welches den Namen Nordkap trägt und die Insel Mageroe, die nördlichste Europas, abschließt. Auf den Abhängen dieses festländischen Nordkaps beobachtete ich die Pflanzen aus der Umgegend von Hammerfest, verkrüppelte gemeine Birken, die Zwergbirke im Ueberfluß sowie einige Gruppen der lappländischen Weide. Auf der Spitze desselben befindet sich ein kreisförmiges, aus

Digitized by Google

übereinander gehäuften Steinen gebildetes Signal, welches der Grundmauer eines Thurmes gleicht. Die phanerogamiſchen Pflanzen waren von dieſem Kap, das unaufhörlich von den Winden, die es von allen Punkten des Horizonts frei beſtreichen, gepeitſcht wird, verſchwunden, doch war die Erde buchſtäblich weiß von Flechten; ſie überziehen den ganzen Boden, ja ſelbſt die vertrockneten Zweige der Stauden, welche ſich daſelbſt feſtzuſetzen verſucht hatten. Dieſer Anblick rief mir das ſchöne Gemälde zurück, womit Linné die Prolegomena zu ſeiner Flora Lapponica beſchließt: „Das Palmengeſchlecht herrſcht auf den heißeſten Theilen des Erdballs, die Tropenzonen werden von ſtrauchartigen Gewächſen bewohnt, ein reicher Pflanzenkranz umzieht die Geſtade des mittägigen Europas, Scharen grüner Gräſer bedecken Holland und Dänemark, zahlreiche Moosgeſchlechter haben ſich in Schweden angeſiedelt, die bleichen Algen aber oder die weißen Flechten ſind es, die allein im kalten Lappland, dem entlegenſten der bewohnbaren Länder, fortkommen. Die letzten unter den Pflanzen bedecken das letzte unter den Ländern.“

Die Havoeſtraße verlaſſend, kamen wir an einer niedrigen Inſel, der grünen Maſoe, vorbei, die ehemals bewohnt war, jetzt aber verlaſſen iſt, und begaben uns Abends in einer kleinen Bucht derſelben, Gieſtvaer genannt, zur Ruhe, wo ein armer Krämer und mehre Fiſcher wohnen. Daſelbſt verbrachten wir einen Theil der Nacht und brachen am folgenden Morgen zum Nordkap auf. Alsbald entdeckten wir die Stappen, ſchwarze Klippen, die ſich wie Thürme aus dem Schoße der Wellen emporheben. Eine Menge Seevögel, Möven, See- und Raubmöven, flogen umher. Letztere, wahre Freibeuter der Lüfte, machen Jagd auf ſchwächere Vögel als ſie ſelbſt, zwingen ſie, ſich zu übergeben und die Fiſche und Kruſtenthiere, die ſie zu ſich genommen, wieder auszuſpeien. Im Augenblicke, wo das erſchöpfte Thier ſie von ſich giebt, ſtürzt ſich die Raubmöve auf

Digitized by Google

dieſe ekle Beute und fängt ſie auf, bevor ſie ins Meer fällt. Mehr als einmal waren wir Zeugen dieſer Kämpfe, wo das Opfer einen Tribut zu zahlen ſcheint, um den Verfolgungen eines läſtigen Zudringlings zu entgehen. Inzwiſchen nahm der Wind zu und trieb die Wogen des Eismeeres in die Höhe; dieſes unruhige und gepeitſchte Meer zeigte uns die Nähe jenes von den Schiffern ſo gefürchteten Vorgebirges an, das man Nordkap nennt, aber eben ſo gut Kap der Stürme nennen könnte. In der That iſt das Meer in dieſen Strichen niemals ruhig, ſelbſt beim ſtillſten Wetter nicht, denn die Schlagwellen aller der auf dem Atlantiſchen, auf dem Eis- und Weißen Meere wüthenden Stürme brechen ſich am Fuße dieſes Vorſprunges, der zwiſchen den ungeheuren Kontinenten von Nordamerika und Nordaſien in den Ozean hinausragt. Der widrige Wind zwang uns zu laviren, und ſo hatten wir lange das ernſte und erhabene Schauſpiel dieſer Felſenmaſſe vor uns. Langgeſtreckt wie der Bug eines Schiffes, ſcheint ſie den ohnmächtigen Meeresfluten entgegenzutreten, die ſich ſeit uralten Zeiten an ihr brechen. Endlich legten wir noch eine Strecke mit Laviren zurück und gingen öſtlich vom Nordkap in einer kleinen Bucht vor Anker, welche von ihrer Geſtalt den Namen Hornvig oder Hornbai erhalten hat.

Wie angenehm war ich überraſcht, als ich mich, ans Land ſteigend, auf der üppigſten ſubalpinen Matte, die ſich denken läßt, befand. Das hohe und dichte Gras ging mir bis an die Kniee, und am äußerſten Ende Europas begegnete ich den Pflanzen, welche ich ſo oft in den Schweizer Alpen bewundert hatte; ſie waren es, eben ſo kräftig, ebenſo prächtig und dabei größer als auf ihren heimiſchen Bergen.*) Zur Rechten erhob

* Ich nenne hier die hauptſächlichſten für Liebhaber der Pflanzenkunde: Trollius europaeus, Bartsia alpina, Archangelica officinalis, Alchemilla alpina, Geranium sylvaticum, Viola biflora, Hieracium alpinum, Oxyria reniformis, Arabis alpina, Polygonum viviparum, Phleum alpinum, Poa alpina.

Digitized by Google

ſich die imponirende Maſſe des Nordkaps, ſchwarz, ſchroff, unzugänglich. Ein ſteiler, aber grünender Abhang vor uns geſtattete, den Gipfel in Windungen um die Baſis des Vorgebirges zu erreichen. Begierig ſammelte ich alle Pflanzen, welche ſich meinen Blicken darboten, es ſchien mir, als ob ſie ein beſonderes Intereſſe beſäßen, weil ſie ſo zu ſagen die kühnſten und kräftigſten unter ihren europäiſchen Schweſtern waren.*) Es machte mir Vergnügen, darunter Pflanzen aus der Umgegend von Paris anzutreffen, ſie ſchienen mir wie ich ſelbſt auf dieſem ſchwarzen, von den Fluthen gepeitſchten Felſen heimatlos zu ſein. Ich hätte ſie gerne gefragt, warum ſie die Ränder der Fluren und den friedlichen Schatten des Gehölzes von Meudon, wo ſie die Huldigungen der Pariſer Botaniker empfangen, verlaſſen hätten, um traurig unter Fremden zu leben, denn die alpinen Pflanzen waren in der Mehrzahl. Auf der Höhe des Abhanges befand ich mich auf einer nackten, entblößten und mit Waſſerlachen bedeckten Hochebene. In der Ferne rollt ſich unabſehbar Fläche auf Fläche ab, große wellenförmige Strecken mit geringen Unebenheiten, durch Seen oder moorige Gründe unterbrochen. Alles iſt kalt, ſtarr, öde. Während auf der ſchönen Matte, die ich beſchrieben habe, Ruhe herrſchte, fegte ein wüthender Nordwind die Hochebene des Kaps und hinderte uns faſt am Gehen. Nichtsdeſtoweniger drangen wir vor und gelangten bis an den äußerſten Rand. Nie werde ich die düſtere Größe des Schauſpiels vergeſſen, das ſich meinen Augen darbot. Vor uns dehnte ſich das Eismeer, deſſen Grenzen am Pole liegen, aus und wogte unter einer dichten Wolkenſchicht, die auf ihm zu laſten ſchien; zur Linken eine lange und niedrige,

*) Ich nenne Cerastium arvense, Capsella bursa-pastoris, Veronica serpyllifolia, Taraxacum dens-leonis, Solidago virga aurea, Rumex acetosa, Chaerophyllum sylvestre, Spiraea ulmaria, Parnassia palustris, Anthoxanthum odoratum.

Digitized by Google

mit Schaum geſäumte Landzunge, zur Rechten einige namenloſe Inſeln. Als ich mich über den Rand des Abgrundes beugte, welcher das Kap begrenzt, ſah ich am Fuße des Abhanges in einer Tiefe von 1000 Fuß das Meer ſich brechen. Von dieſer Höhe geſehen, bildeten die ungeheuren in gerader Linie von Grönland, Spitzbergen oder Nova Semlja kommenden Wogen bei der Brandung nur einen dünnen Schaumſtreifen, gleich den krauſen Wellen eines kleinen Sees, die von einem leiſen Windhauche ſanft ans Ufer getragen werden.

Der höchſte Gipfel des Nordkaps befindet ſich meinen Beobachtungen gemäß 308 Meter über dem Meere, derſelbe wird von einem kleinen Felſen überragt, auf den die Reiſenden ihren Namen einkritzeln. Ich las darauf mit Achtung den Parrot's, berühmt durch ſeine Reiſen in den Alpen, im Ararat und Kaukaſus. Selbſt dieſer letzte Felſen iſt nicht ganz von Pflanzenwuchs entblößt, tellerförmige Fleckchen von Parmelien und Ombilikarien, ſchwarz, wie der Felſen ſelbſt, hatten ſich an dieſen angeklammert, und ein kleines mikroſkopiſches Moos (Orthotrichum Floerkianum) war in den Spalten verſteckt. Auch auf dem Plateau gab es ein paar dürftige, vom Winde zerzauſte und am Boden gelagerte Pflanzen, welche hinter den Bodenfalten Schutz ſuchen vor den beſtändigen Windſtößen, die das Nordkap umſauſen.

Digitized by Google

Ein wiſſenſchaftlicher Winteraufenthalt in Lappland.

Den 13. Juni 1838 verließ die Korvette Recherche den Hafen von Havre, um ſich nach Norden zu begeben. Sie trug eine Kommiſſion an Bord, die vom Könige und dem Marineminiſter beauftragt war, wiſſenſchaftliche Beobachtungen jeglicher Art anzuſtellen, damit auch der Name Frankreichs unter den zahlreichen Polarexpeditionen nicht fehle, an denen bisher nur Holland, England und Rußland Theil genommen hatten. Den 27. Juni legte die Korvette bei Drontheim, der ehemaligen Hauptſtadt Norwegens, an, wo ſie noch einige ſchwediſche, norwegiſche und däniſche Gelehrte an Bord nahm, welche von ihren Regierungen dazu auserſehen waren, an der Reiſe Theil zu nehmen. Wenige Tage darauf entfernte ſich die Recherche von Drontheim und ſteuerte auf Hammerfeſt zu, eine kleine Stadt von 500 Einwohnern am äußerſten Ende der ſkandinaviſchen Halbinſel, in der Provinz Weſtfinmarken gelegen.

Den 13. Juli lief die Korvette in den Hafen von Hammerfeſt ein, den ſie beinahe unmittelbar darauf wieder verließ, um ſich nach Spitzbergen zu begeben. Nichts hemmte die Fahrt.

Digitized by Google

Von einem beständigen Tage begünstigt, schnitt das Schiff ohne Unfall durch das Ende einer Bank von Eisbergen und ankerte den 25. Juli in der Bai von Bellsund unter 77° 30′ n. Br. Nach einem für die Wünsche der Naturforscher und Physiker zu kurzem Aufenthalte ging die Recherche auf's neue unter Segel und den 12. August im Hafen von Hammerfest vor Anker. Hier theilte sich die Kommission; mehre Mitglieder überstiegen die Kette der skandinavischen Alpen und kehrten über Stockholm und Kopenhagen nach Frankreich zurück, andere direkt mit der Recherche. Endlich blieben nur die Herren Lilliehöök und Silfeström, schwedische Physiker, Lottin und Bravais, französische Marineofficiere, und Bevalet als Zeichner zurück, um in Lappland zu überwintern und sich einer Reihe von Beobachtungen über die Meteorologie und Physik des Erdballs zu widmen. Nachdem sie die benachbarten Gegenden besucht hatten, entschieden sie sich, ihre Wohnung zu Bossekop, einer kleinen Handelsniederlassung aufzuschlagen, die an einem tief ins Land dringenden Fjord gelegenen ist. Die Norweger bezeichnen mit dem Namen Fjorde jene schmalen und krummen Meerbusen, welche die Westküste ihres Landes zerschneiden. Bald gleichen sie großen Seen, bald ist man geneigt, sie für von Menschenhand gegrabene Kanäle anzusehen. Ihre Tiefe ist oft beträchtlich, doch sind sie durch hohes Land geschützt, und die Schlagwellen des Ozeans verlaufen sich in ihren langen Verzweigungen.

Mehrere Beweggründe mußten die Wahl der Station Bossekop als eines der Meteorologie gewidmeten Winteraufenthaltes entscheiden. Die im Norden dieser Niederlassung liegenden Berge sind weder hoch, noch nahe genug, um den Anblick der Nordlichter zu verhindern. Da das Meer ziemlich entfernt ist, so ist der Himmel nicht wie zu Hammerfest mit beständigem Nebel bedeckt. Andererseits gestattete der Fjord Ebbe und Flut, die

Digitized by Google

Phänomene der Luftspiegelung und die Temperatur der Gewässer zu beobachten. In Hammerfest fällt das Thermometer selten auf 15 Grad unter Null, bei Bossekop konnten unsere Gelehrten auf niedrigere Temperaturen rechnen und die sie begleitenden physischen Phänomene beobachten. Endlich begünstigten die Nähe eines Waldes, eines großen Flusses, hoher Berge und ziemlich ausgedehnter Ebenen alle die Experimente, welche sie anzustellen beabsichtigten.

Versuchen wir, bevor wir mit der Erzählung ihrer Arbeiten beginnen, eine Vorstellung von den noch wenig bekannten Gegenden zu geben, welche der Schauplatz derselben waren; denn der Gelehrte sucht sich wie der Maler ein neues und noch wenig erforschtes Stück Erde aus, wo er mit vollen Händen ernten kann, statt auf der Spur seiner Vorgänger Nachlese zu halten.

Hammerfest verlassend, bringt der Reisende, welcher sich nach Süden wendet, durch ein enges Gat in den Fjord von Alten. Eine Zeit lang bemerkt er nur grünende Abhänge, deren dichtes Gras bis ans Ufer hinabzieht und sich mit den Tangen vermischt. Bald aber erheben sich schroffe Felsen um ihn herum, und ihr von dem klaren Gewässer zurückgeworfenes Bild scheint die Höhe der Steilufer zu verdoppeln. In spärlichen Zwischenräumen verrathen leichte Rauchsäulen die Hütte eines einsamen Lappen. Ein am Strande aufgelaufener Nachen und einige an der Sonne trocknende Schellfische, an langen Stangen aufgehängt, künden den Aufenthalt eines armen norwegischen Fischers an. Im Allgemeinen aber ist das Ufer verlassen, und der traurig umherschweifende Blick entdeckt nicht einmal einen Baum, der mit seinem regelmäßigen Wiegen diese regungslose Natur belebte. Tiefes Schweigen, nie vom Rascheln des Laubes unterbrochen, herrscht in dieser Einöde. Nur selten fliegen plumpe Eidergänse, in einsamen Seitenbuchten

Digitized by Google

verſteckt, geräuſchvoll auf und zerſtreuen ſich in der Ferne, auf den Gewäſſern hingleitend, oder ein ſchäumender Waſſerfall brauſt inmitten der Felſen. Eine Weile vernimmt man ſein eintöniges Rauſchen, dann beim Umbiegen um ein Vorgebirge bricht es plötzlich ab und gleicht nur noch einem fernen Murmeln, das ſich endlich in Schweigen verliert. Oft löſt ſich ein ſchwarzes und kahles Kap von der Küſte ab und ſcheint den Hintergrund des Meerbuſens zu verſperren; allein je mehr ſich das Boot nähert, deſto mehr öffnet ſich die Durchfahrt vor ihm und ein weites Becken nimmt es in ſeine ruhigen Gewäſſer auf. Hat man endlich einen großen, aus ſonderbar gewundenen Schichten gebildeten Felſen umſchifft, ſo läßt der Wind nach, das erſchlaffte Segel hängt am Maſt herunter und der Nachen ſteht von ſelbſt im Hintergrunde einer Bai von geringer Tiefe ſtill, deren anmuthige Krümmung ſich am Ufer entfaltet. Einige Magazine umgeben den Landungsplatz, und die am Abhange eines langen Hügels zerſtreuten Wohnungen ſcheinen den Reiſenden einzuladen, ſich daſelbſt ein Unterkommen zu ſuchen. Es iſt das Dorf Boſſekop. Der Diſtriktsvorſteher und ein paar norwegiſche Kaufleute, welche mit den Lappen Handel treiben, bewohnen dieſe beſcheidenen Holzhäuſer. Hinter dem Dorfe dehnt ſich ein großer Kiefernwald aus, unter deſſen Schatten Wachholder, Haidekräuter, Heidelbeeren und andere die Kälte liebende Pflanzen wachſen. Durchſchreitet man den Wald in öſtlicher Richtung, ſo gelangt man wieder an die ſtets ruhigen und klaren Gewäſſer des Fjords. Gegen Süden ſind Torfmoore, auf denen einige verkrüppelte Kiefern ſich hervorwagen, aber unter dem feindlichen Einfluſſe dieſes ſchwammigen und feuchten Bodens in buſchförmigem Zuſtande verharren. Weiterhin entdeckt man den Altenfluß, welcher zwiſchen den ſandigen Ufern, die er ſich ſelbſt geſchaffen, majeſtätiſch dem Eismeere zuſtrömt. Ueberall am Horizonte hohe ſchnee-

Digitized by Google

bedeckte Berge und bei jeder Wegbiegung unerwartet der Fjord, dessen bläuliche Gewässer sich zwischen die Flächen des Bildes drängen. In den seltenen Augenblicken, wo die Sonne nicht durch Wolken verhüllt wird, ist diese Landschaft denjenigen vergleichbar, welche die Seen der Schweiz und des südlichen Norwegens einrahmen. Wie schön dünkte sie mich, als nach der Rückkehr von Spitzbergen mein so lange vom Anblick schwarzer Felsen und schneebedeckter Ufer betrübtes Auge sich an diesem lachenden Anblick erquicken konnte! Wie mir die Bäume hoch und dicht, der Rasen grün, die Luft milde und mit harzigem Duft der Kiefern lieblich erfüllt schien! Aber leider hüllt zumeist ein Nebelschleier die ganze Gegend ein, oder ein lichtloser Tag entfärbt das Bild; denn die stets dicht am Horizont verweilende Sonne vermag mit ihren bleichen Strahlen die Wolken, welche der Seewind beständig auf den Bergen ansammelt, nicht zu durchbrechen.

Beim Heraustreten aus dem Kiefernwalde überrascht ein kleines, von gut bebauten Gerstefeldern umgebenes Dorf den Reisenden gar angenehm. Diese Felder sind die vorgerückten Posten des europäischen Ackerbaues. Man muß einen ganzen Grad die Westküste Norwegens entlang gen Süden zurückgehen, um ähnliche Kulturen wiederzufinden. Das Dorf heißt Elvebaken und verdankt seiner glücklichen Lage ein verhältnißmäßig gelindes Klima und seine ausnahmsweisen Ernten. Sandige Hügel schützen es gegen die kalten Ostwinde, und das Schwemmland, welches seinen Boden bildet, verschluckt schnell den Regen oder erwärmt sich binnen wenigen Augenblicken an den schwachen Strahlen der nordischen Sonne. Jedoch reift selbst in den besten Jahren das Korn nur unvollkommen, und die Ernte findet nie vor Mitte Septembers statt.

Wendet man sich westlich, so zieht sich der Fjord abermals zurück und endet in dem kleinen Busen von Kaafjord, wo ein

Digitized by Google

bedeutendes Kupferbergwerk umgeht. Vor zwölf Jahren noch war dieſe Gegend öde und verlaſſen. Ein Lappe findet bei der Renthierhut einen glänzenden Stein, den er dem engliſchen Konſul zu Hammerfeſt bringt. Es war ein reichhaltiges Kupfererz, welches 50 Prozent Metall enthielt. Der Konſul, Mr. Crowe, reiſt nach England, bringt die nöthigen Fonds zuſammen und hat lange Zeit dieſem unerſchöpflichen Bergwerke vorgeſtanden. Fünfhundert Arbeiter brechen das Erz aus, pochen es und verwandeln es darauf in Barren. Schiffe kommen, mit Steinkohlen beladen, von England und kehren mit Kupfer beladen wieder zurück. Dieſe Nachbarſchaft war für unſere Gelehrten äußerſt werthvoll, denn ſie fanden in dem Chef des Etabliſſements und den beiden Ingenieuren, den Herren Thomas und Ihle, eifrige Mitarbeiter, welche die durch die Abreiſe der Beobachter von Boſſekop unterbrochene Reihe meteorologiſcher Beobachtungen fortſetzten.

Alte Meerſpiegellinien.

Der Altenfjord, deſſen allgemeines Ausſehen wir beſchrieben haben, war der erſte Schauplatz der Unterſuchungen des Herrn Bravais, einem der thätigſten Mitglieder der Kommiſſion. In der Nähe von Hammerfeſt hatte er an den Gebirgsabhängen zwei parallele und horizontale Vorſprungslinien bemerkt. In Anbetracht ihrer Form allein glichen ſie den Steilrändern eines Kanals, und ihre Stellung in halber Höhe des Abhanges erinnerte an die Staffeln bei Feſtungswerken. Ein in der Nähe liegender See war von ähnlichen bedeutend über ſeinem Spiegel erhabenen Rändern umgeben, und tauſend Anzeichen, deren Aufzählung zu weit führen würde, zeigten klar und deutlich, daß dieſer See ehemals eine Bucht war, während ſich ſeine Gewäſſer jetzt ins Meer ergießen, indem ſie einen etwa 5 Meter hohen Waſſer-

Digitized by Google

fall bilden. Bravais' erster Gedanke war, die Höhe dieser eigenthümlichen Ränder über dem Meeresspiegel zu messen; um dies jedoch mit Erfolg zu thun, war ein Ausgangspunkt vonnöthen, der sich nicht veränderte. Ebbe und Flut des Eismeeres, ohne eben so stark wie an den Küsten der Normandie aufzutreten, betragen doch eine Aenderung des Niveau's je nach der Tagesstunde von 2 bis 4 Meter. Das mittlere Niveau des Meeres auf allen Punkten des Fjords zu bestimmen, war ein Ding der Unmöglichkeit; für denjenigen aber, der sich nicht auf eine engbegrenzte Spezialität beschränkt, reichen sich sämmtliche Wissenschaften gegenseitig die Hand, und in diesem Falle hat die Botanik die Mittel geliefert, eine schwierige Frage der praktischen Geometrie zu lösen. Die Umrisse der Fjorde Norwegens sind sämmtlich mit Blasentang bekleidet, einer Meerpflanze, die mit luftgefüllten Bläschen versehen ist, vermöge deren sie auf der Oberfläche des Wassers schwimmt, es ist der Fucus vesiculosus der Botaniker. Nun hängt das Dasein dieses Tanges von der Bedingung ab, täglich eine genügende Weile unter Wasser getaucht zu bleiben; daraus folgt, daß er eine unveränderliche und parallele Linie mit der Oberfläche des Wassers bilden muß. Oberhalb dieser Linie verweilt das Meer nicht lange genug zum Fortkommen dieser Pflanze, so daß die Alge plötzlich bei einer haarscharf bezeichneten Grenze aufhört. Es ist ein hübscher Anblick, den Fjord bei Ebbe von einem gelbbraunen Rahmen eingefaßt zu sehen, welcher gegen das Grün der Wiesen und die schwarze Farbe der Felsen absticht. Genaue Messungen, zu Hammerfest wie zu Bossekop angestellt, bewiesen, daß diese Linie 6 Dezimeter über dem durchschnittlichen Niveau des Meeres liegt.

Nachdem der Ausgangspunkt einmal bestimmt worden, war es ein Leichtes, die Höhe der ehemaligen Ränder über der Fucuslinie mit Hülfe des Barometers oder einer Wasserwage

Digitized by Google

zu messen. In einem Boote die Krümmungen des Fjords bestreichend, erkannte Bravais bald ähnliche Ränder wie zu Hammerfest. In den zurücktretenden Theilen des Ufers aber, im Hintergrunde der Seitenbuchten, bei Bach- oder Flußmündungen, stellten sich diese Ränder statt als einfache Staffeln unter der Form von Terrassen dar, die oberhalb durch eine horizontale Fläche und vorn durch eine regelmäßige Böschung, die sich dem Meere zusenkte, begrenzt wurden. Diese Böschung ward zuweilen durch parallele Stufen, ähnlich denen, von welchen die Rede gewesen, unterbrochen. Aus einem feinen und gleichartigen Sande bestehend, bieten diese großen Terrassen eine solche Regelmäßigkeit dar, daß man versucht ist, sie für wirkliche Redouten, für Festungswerke zu nehmen, bestimmt, den Eingang zu den Thälern zu vertheidigen, die sie von der Seeseite vollständig schließen. Wo das Ufer durch steile Gestade gebildet wird, da entdeckt das Auge oft schwarze, unter sich parallele Linien, und erhebt man sich vom Ufer zu diesen Linien, so erkennt man, daß sie einem mehr oder minder tiefen Einschnitt, einer mehr oder minder auffallenden Erosion, welche den Felsen an diesen Stellen aushöhlt, entsprechen. Diese Erosionslinien sind die Spuren eines ehemaligen, in Folge der Küstenerhebung aufgetauchten Ufers. Die Abschleifung der Felsen, die durch die Einwirkung der Wellen gebildeten Höhlen und Grotten, das abgerundete Aussehen der Oberflächen, alles erinnert an das jetzige Ufer, welches sich oft 30 Meter unterhalb befindet. Die Terrassen und Staffeln sind ebenfalls Merkmale des ehemaligen Wasserspiegels, man trifft sie in Frankreich an den Rändern von Kanälen und Seen an, deren Wasserstand sich verändert, trotzdem er sich eine Zeit lang auf bestimmten Höhen erhält.

Es ist eine längst bekannte Thatsache, daß die Küsten Norwegens und Schwedens Schwankungen unterworfen sind, wo-

Digitized by Google

von einige auf die hiſtoriſchen Epochen zurückgehen. Zuweilen ſenkt ſich die Küſte, meiſtens aber hebt ſie ſich, nicht in plötzlichen Stößen, ſondern ſo langſam, daß der Niveauunterſchied ſich erſt am Ende einer bedeutenden Anzahl von Jahren bemerklich macht. So hatte das Meer alſo längs des Altenfjords Spuren ſeines Verweilens hinterlaſſen. Das Ausſehen dieſer Spuren ändert ſich je nach der Geſtalt der Küſte und der Natur des Geſteins; beim Eingange der Thäler und im Hintergrunde der Seitenbuchten Sandterraſſen, am Abhange der Gebirge horizontale Ränder oder Staffeln, längs der Klippen parallele Eroſionslinien.

Sind dieſe Spuren fortlaufend, oder bilden ſie mit andern Worten eine oder mehre Linien, die man ununterbrochen von der Einfahrt des Fjords bis zu ſeinem äußerſten Ende verfolgen kann? Herr Bravais hat ſich überzeugt, daß dem ſo iſt und daß man zwei Linien unterſcheiden kann, die, von Hammerfeſt ausgehend, bei Boſſekop auslaufen und mit den Staffeln, Terraſſen und Eroſionslinien zuſammenfallen. Sind dieſe Spuren parallel mit dem Spiegel des Ozeans? Wenn man zwiſchen den beiden Geſtaden des Fjords hinfährt und dieſe ehemaligen Meerſpiegellinien betrachtet, ſo ſcheinen ſie in der ganzen Ausdehnung, die das Auge zu umſpannen vermag, genau horizontal zu ſein; da die Geſammtlänge des Fjords aber etwa 8 Myriameter beträgt, ſo konnte man unmöglich wiſſen, ob dieſe Linien in ihrer ganzen Länge mit dem Meeresſpiegel parallel laufen oder mit andern Worten, ob ſie horizontal ſind. Glücklicher Weiſe liefert uns die Sorge, die man getragen, die Höhe dieſer Linien über dem Ufer von Punkt zu Punkt zu meſſen, unmittelbar die Löſung dieſer Frage. Bei Hammerfeſt betrug der obere Rand 28,6 Meter, der untere 14,1 M. über dem Meere. In der Mitte des Meerbuſens werden die Höhen beträchtlicher, und im Hintergrunde des Fjords betragen ſie

Digitized by Google

67,4 M. für die obere und 27,7 M. für die untere Linie. Folglich sind 1) diese Linien keineswegs horizontal, 2) sind sie nicht vollkommen parallel unter sich, 3) sind sie nicht einmal geradlinig, und gegen die Mitte des Fjords bildet die Linie, welche von Hammerfest ausgeht, einen Winkel mit derjenigen, welche bei Bossekop endet.

Die Folgerungen, welche sich aus diesen Messungen ergeben, sind wichtig für die Geologie, und Herr Elie de Beaumont hat sie sorgfältig in seinem vortrefflichen Bericht über diese Arbeit hervorgehoben. So lange man sich nämlich, dem alleinigen Zeugnisse der Augen vertrauend, eingebildet hatte, daß diese ehemaligen Wasserstandlinien geradlinig und parallel mit dem Meeresspiegel wären, konnte man glauben, daß das Meer sich gesenkt und auf diese Weise eine horizontale Spur an der Küste zurückgelassen habe; man war also berechtigt anzunehmen, daß es auf gewisse Ufer übertrete, von andern zurückweiche und sich so langsam auf der Oberfläche der Erde verrücke. Da aber die alten Niveaulinien weder horizontal noch unter sich parallel sind, so ist diese Annahme unzulässig, denn eine flüssige Fläche kann nur eine horizontale Spur, wie sie selbst, zurücklassen. Es ist also nicht das Meer, welches gesunken ist, sondern die Küste, welche sich gehoben hat. Diese Erhebung ist um so beträchtlicher gewesen, je tiefer man ins Land bringt, sie ist ruckweise mit Unterbrechung von zwei langen Zwischenräumen der Ruhe vor sich gegangen. Die stärkste Erhebung von 40 Meter hat bei Bossekop, die schwächste von 14 bei Hammerfest stattgefunden. So hat Herr Bravais in einer Wissenschaft, wo das Verlangen zu generalisiren oft die Beobachtungen von Thatsachen vernachlässigen läßt, nach einer strengen Methode verfahrend, einen Beweis für die Erhebung der Küste Norwegens geliefert, welche seine Reisevorgänger erkannt hatten, ohne sie auf mathematische Art beweisen zu können.

Digitized by Google

Bis auf welche Epoche geht dieſe Erhebung zurück? Das iſt eine ſchwer zu löſende Frage. In Schweden hat man ſichere Beweiſe, daß ſie ſich ſeit den hiſtoriſchen Zeiten fortſetzt. Ringe, beſtimmt um Schiffe daran zu befeſtigen, ſind in weiten Abſtänden und in bedeutender Höhe über dem Ufer gefunden worden. In Lappland, wo die Civiliſation erſt ſeit ſo kurzer Zeit eingedrungen iſt, giebt es noch keine hiſtoriſchen Denkmäler, die über mehr als zwei Jahrhunderte hinausreichten. Die Terraſſen aber ſind oft mit Kiefern bedeckt, deren einige vierhundert Jahre und darüber alt ſind, alſo kann das Auftauchen dieſer Terraſſen nicht wohl nach dieſem Zeitraume ſtattgefunden haben. Auch iſt es wahrſcheinlich, daß die Erhebung der Küſte von Finmarken nicht älter iſt als die letzten Umwälzungen des Erdballs, denn man findet auf einigen Punkten über dem Meeresſpiegel Muſcheln, welche noch im Schoße deſſelben leben, folglich zu der zoologiſchen Epoche zählen, welcher der Menſch angehört.

Aufſtellung der Inſtrumente.

Den 1. September 1838 waren die Herren Lottin, Lilliehööt, Bravais und Siljeſtröm zu Boſſekop vereinigt. Die Wohnung eines Kaufmanns war zum Mittelpunkt gewählt worden, dort wohnten die Franzoſen, die beiden Schweden hatten ſich in zwei beſonderen Häuschen eingerichtet. Allein die Menſchen unterzubringen, war eine Kleinigkeit gegen die Aufſtellung der Apparate. Aus dem Raume der Korvette hatte man eine ungeheure Menge von Inſtrumenten hervorgezogen: Theodoliten, Barometer, Thermometer, Aktinometer, Pyrheliometer, Teleſkope, rieſige Bouſſolen, ja ſelbſt Geräthe, um einen arteſiſchen Brunnen zu bohren. Dies Alles lag in einem großen Sale bunt durch einander,

Digitized by Google

das alles verlangte seinen Platz, seine Aufstellung. Zunächst beschäftigte man sich mit der Sternwarte. Ein kleines Holzhaus ward angekauft, und da es sich nicht in passender Lage befand, brach man es ab, um es anderwärts wieder aufzubauen. Die viereckig behauenen Balken, welche das Fachwerk ausmachten, wurden abgeschlagen, Stück für Stück numerirt und auf den Gipfel des Hügels geschafft, wo das Haus von neuem aufgebaut ward. Durch dies Beispiel ermuthigt, ließ auch Herr Lilliehöök das seinige versetzen, damit ihm nichts den Anblick des Horizonts benähme. Nachdem die Häuser an Ort und Stelle gesetzt waren, mußte man daneben Mauerpfeiler für die Instrumente errichten, einen Ofen im Laboratorium anlegen und einen artesischen Brunnen in den Boden bohren, um die Erdtemperatur bei verschiedenen Tiefen zu beobachten. Welche Mühe, welche Ueberwachung aber erforderten diese in civilisirten Ländern so einfachen Operationen! Statt gescheiter Arbeiter Lappen und Finnen, so ungeschickt und langsam, daß man tausendmal vor Ungeduld hätte vergehen mögen, sodann Unbekanntschaft mit der Sprache, Französisch, Schwedisch, Norwegisch sich kreuzend und mit der Zeichensprache verbindend, und die Gelehrten jeden Augenblick gezwungen, selbst mit Hand ans Werk zu legen. Nach der Sternwarte errichtete man noch fünf andere von einander entfernte Stätten, wo sich verschiedene magnetische und meteorologische Apparate befanden.

Im Meere nahe am Ufer ward eine Flutstange aufgepflanzt. Dieselbe bestand in einem senkrechten Pfahl, der in gleiche Theile von einem Dezimeter Höhe, abwechselnd weiß und schwarz und von unten nach oben beziffert, eingetheilt war. Mit Hülfe eines Fernrohrs konnte man von weitem lesen, welches die Meereshöhe zu jeder Tagesstunde war.

Digitized by Google

Ebbe und Flut des Meeres.

Die Kenntniß der Gezeiten ist für den Schiffer unerläßlich, doch ist sie auch von großem Belang für den Astronomen. Man weiß nämlich, daß Ebbe und Flut von der Anziehung herrühren, welche Sonne und Mond auf die bewegliche Masse der Meere ausüben. Gelangt man nun eines Tages dahin, die Gezeiten in der ganzen Welt gut zu kennen, genau den Einfluß der Breite, der Küstengestalt, des barometrischen Druckes, der Richtung und Gewalt der Winde auf die Größe und Dauer dieser Schwankungen schätzen zu können, so wird man daraus, schärfer als es bisher geschehen, das absolute Gewicht des Mondes ableiten. Wenn nämlich die Entfernung und Stellung dieses Gestirns in Bezug auf Sonne und Erde, seine Größe, die Masse der Sonne und die Attraktionsgesetze bekannt sind, so ist es klar, daß die mathematische Analyse, nachdem sie den Antheil dieser verschiedenen Ursachen festgestellt hat, von der hervorgerufenen Wirkung, d. h. der Höhe und Dauer der Gezeiten, allein noch auf das zu bestimmende Element, die Dichte des Mondes, zurückzugehen vermag. Diese Untersuchung ist um so interessanter, als die bisher aus der Beobachtung von Ebbe und Flut gefolgerte Dichte von derjenigen abweicht, auf welche man durch rein astronomische Betrachtungen hingeführt worden ist, und es ist möglich, daß dieser übrigens unbedeutende Unterschied einzig und allein von der Unvollkommenheit unserer Kenntnisse über die Gezeiten herrührt.

Astronomie. Sternschnuppen.

Der Nutzen einer Sternwarte kann wohl nicht bezweifelt werden. Sie war in der That unerläßlich, um ganz genau die Breite von Bossekop zu bestimmen, indem man eine bedeutende

Digitized by Google

Anzahl von Sonnen- und Sternenhöhen aufnahm. Die Länge oder der Unterschied zwischen den Meridianen von Paris und Bossekop ist mit Hülfe der ausgezeichneten Chronometer, welche die Expedition mitgebracht hatte, und durch Vergleichung der Stellung des Mondes zu benachbarten Sternen scharf bestimmt worden. Nachdem so Länge und Breite gekannt sind, kann dieses Observatorium als Ausgangspunkt für alle geographischen und hydrographischen Operationen dienen, die man in der Folge im westlichen Finmarken ausführen mag.

Der Anblick des Nordhimmels war für französische Astronomen ein neues Schauspiel. Der Polarstern, der zu Paris 49° über dem Horizont steht, schien das Zenith einzunehmen. Eine Menge Sternbilder, welche für uns jeden Abend untergehen, blieben die ganze Nacht über sichtbar, während die in der Nähe des Aequators befindlichen sich kaum von der Südseite über den Horizont erhoben. So zeigte sich der Sirius, dieses große Gestirn, das Winters am Himmel von Paris funkelt, nur wenige Augenblicke über der schwarzen Silhouette der Berge. Im Herbst waren die Beobachter Zeugen eines merkwürdigen Phänomens. Jedermann weiß, daß der Mond allnächtlich etwa dreiviertel Stunden später, als am Abend zuvor aufgeht, in den nördlichen Ländern dagegen geht der Vollmond im September einige Minuten eher als am Tage vorher auf. Da diese Epoche in Schottland mit der Kornernte zusammenfällt, so ist der Septembervollmond daselbst unter dem Namen Erntemond bekannt.

Da Bossekop unter dem 70° n. Br. gelegen ist, so sahen unsere Gelehrten die Sonne über ihrem Horizonte immer kleinere Bögen beschreiben, endlich den 17. November Mittags bemerkte man nur den obern Theil ihrer Scheibe, und den folgenden Tag ging sie nicht mehr auf. Nur südwärts in der Mittags-

Digitized by Google

gegend tauchte ein Schimmer auf, deſſen Glanz mit jedem Tage abnahm. Gegen das Winterſolſtitium (21. Dezember) gab dieſer Schimmer nur noch eine zweifelhafte Helle von ſich, und das ganze Land blieb in eine ewige Nacht verſunken. Anfang Januars nahm der Schimmer wieder etwas Glanz an, und den 30. deſſelben Monats begrüßte der einſtimmige Freudenruf der an den Fenſtern oder auf erhabenen Punkten ſtehenden Bewohner die Rückkehr des ſo ungeduldig erwarteten Geſtirns. An dieſem Tage ruht jede Arbeit, man wünſcht ſich gegenſeitig Glück, man tanzt, man trinkt auf die Auferſtehung der Sonne. Dann werden auch die zahlloſen Wetten und endloſen Streitigkeiten geſchlichtet, die auf Koſten der Wand- und Taſchenuhren den ganzen Winter über unternommen wurden. Wenn die Sonne nicht mehr zum Vorſchein kommt, ſo wird es in der That unmöglich, die Uhren zu ſtellen, man muß ſich auf die Regelmäßigkeit ihres Ganges verlaſſen. Nun rühmt Jeder den Gang der ſeinigen und macht den der andern herunter. Dieſe Zuverſicht geht ſo weit, daß ein Einwohner von Hammerfeſt ſich nicht ſcheute, die Ausſagen einer Schwarzwälder Uhr dem einſtimmigen Zeugniſſe der Chronometer der Kommiſſion entgegenzuſetzen. Der Augenblick, wo ſich die Sonne zeigt, iſt ein entſcheidender Augenblick, welcher alle Zweifel löſt und die zu weit von Mittag entfernten Zeiger Lügen ſtraft. Von dieſem Augenblicke an ſteigt die Sonne mit jedem Tage höher und geht zuletzt gar nicht mehr unter. Gegen Mitternacht nähert ſich das Geſtirn dem Horizont, aber ſtatt ins Meer zu verſinken oder hinter den Bergen zu verſchwinden, erhebt es ſich ſofort wieder und beginnt einen neuen Kreis zu beſchreiben. So herrſcht denn während des Sommers ein ewiger Tag in Lappland, ein Tag, der eben ſo ermüdend iſt wie die lange ihm folgende Nacht traurig und eintönig.

Seit einer ziemlichen Reihe von Jahren haben die Stern-

Digitized by Google

schnuppen die Aufmerksamkeit der Astronomen auf sich gezogen. Indem man die Zahl derselben zu schätzen suchte, hat man gewisse feste Epochen entdeckt, wo sie häufiger sind als zu anderen. Hierher gehören die Nächte vom 13. und 14. November. Um jedoch ihre Beobachtungen nützlicher und vollständiger zu machen, beschlossen unsere Meteorologen sich zu trennen. Während also die Herren Lottin und Lilliehöok zu Bossekop blieben, begaben sich die Herren Bravais und Siljeström nach Jupvig, dem Wohnsitz eines Kaufmanns, der im Hintergrunde eines der Seitenzweige des großen Altenfjords gelegen ist. So genossen sie den doppelten Vortheil, einen größeren Theil des Himmels zu beherrschen und später die Höhe dieser Meteore berechnen zu können. Den 12. November schifften sich die Herren Bravais und Siljeström in einem kleinen norwegischen Nachen ein, um an die Ausführung dieser Operation zu gehen; das Thermometer stand auf 15 Grad unter Null. Anfangs war der Wind günstig, bald aber sprang er um, und sie mußten gegen die hohle See ankämpfen. Jeden Augenblick brachen Sturzwellen über ihren Nachen herein, und durchkältet kamen sie in Jupvig an, denn das Seewasser hatte ihre Kleider durchnäßt und sie, gefrierend, mit einer Eisschicht bedeckt. Zu Jupvig waren die Häuser unter Schnee begraben, der Kaufmann aber nahm sie herzlich auf, und bald fanden sie unter einer dichten Eiderdunendecke erquickenden Schlaf. Entschlossen, die nächste Nacht unter freiem Himmel zuzubringen, ließen sie ein Zelt auf eine benachbarte Anhöhe bringen, um demjenigen von Beiden abwechselnd als Schutz zu dienen, welcher den Bleistift und die Uhr halten sollte, um das Erscheinen und den Durchgang der Sternschnuppen zu notiren. Ein mächtiges Feuer ward im Innern des Zeltes angezündet, allein der Rauch war der Art, daß sie es nur dicht am Eingange, den Rücken dem Herde zugewandt, darin aushalten

Digitized by Google

konnten. Glücklicher Weise war Nachmittags das Thermometer wieder gestiegen und hielt sich Nachts auf 4 Grad unter Null. Doch setzten alle Augenblicke heftige Windstöße, von feinem und prickelndem Schnee begleitet, den Beobachtern zu, und der Himmel, abwechselnd heiter und bewölkt, bedeckte und klärte sich mehr als zwanzigmal im Laufe der Nacht. Diese Widerwärtigkeiten hinderten sie vereint daran, mehr als einunddreißig Meteore zu zählen. Diejenigen unter uns, welche Winters nie anders als mit Pelzwerk wohlverwahrt ausgehen und sich schnell durch rasches Gehen erwärmen, können sich unmöglich vorstellen, welch ein ganz anderes Gefühl es ist, wenn man durch Beobachtungen, die, sobald sie gemacht sind, auch eingetragen werden müssen, zum Stillstehen verurtheilt ist. Mit Handschuhen würde man nicht rasch schreiben können, und in einem beschränkten Raume hat man sich gut Bewegung machen; die Kälte dringt allmälig durch die Kleider, packt den Betreffenden und verläßt ihn alsdann nicht wieder. Ist das Wetter ruhig, so läßt sich die Kälte ertragen, wenn die Luft aber in Bewegung ist, nicht mehr, und stände das Thermometer auch nur auf 2 oder 3 Grad unter Null; auch büßten unsere beiden Astronomen ihre meteorologischen Ausschweifungen der eine mit mehren Tagen Fieber, der andere mit einer leichten Augenentzündung, die er sich in dem rauchigen Zelte zugezogen hatte.

Während der Nacht vom 7. auf den 8. Dezember hielt sich das Thermometer zwischen 20 und 30 Grad unter Null. Der Himmel war von wunderbarer Klarheit, und in anderthalb Stunden zählten die Herren Lottin und Bravais zweiundfünfzig Sternschnuppen. Eben diese Nacht ward zu Newhaven in den Vereinigten Staaten, in China, Brüssel, Parma und Toulon der außerordentlichen Anzahl dieser Meteore halber notirt. In der Nacht vom 2. auf den 3. Januar sah man alle fünf Mi-

Digitized by Google

nuten eine bis zwei Sternschnuppen, und diese Nacht ist seitdem noch von den Herren Wartmann und Quetelet der Häufigkeit dieser Erscheinungen wegen angezeigt worden.

Meteorologische Reihe.

Unabhängig von diesen getrennten Beobachtungen hatten unsere Gelehrten seit dem 6. September einen meteorologischen Tag- und Nachtdienst organisirt. Der Tag war in drei Perioden eingetheilt, eine von zwölf Stunden, nämlich von acht Uhr Morgens bis acht Uhr Abends, die beiden andern von acht Uhr Abends bis acht Uhr Morgens. Jeder war reihum damit beauftragt, während dieser Perioden sämmtliche Instrumente zu beobachten. Alle zwei, oft selbst alle Stunden ward die Höhe des Barometers und Thermometers, sowie die Richtung des Windes die Beschaffenheit des Himmels und die Temperatur der Erde auf ihrer Oberfläche angemerkt. Unter den sechs magnetischen Apparaten wurden einige eben so oft wie die meteorologischen Instrumente, andere in längern Zwischenräumen beobachtet. Zu gewissen verabredeten Zeiten verfolgte man von fünf zu fünf Minuten den Gang der Magnetnadel vierundzwanzig Stunden lang hintereinander. Die Anzahl durch den Eifer ersetzend, blieben unsere muthigen Physiker zuweilen drei Stunden hintereinander das Auge auf das Fernrohr gerichtet in einer eiskalten Hütte, wo das Thermometer auf — 10 Grad sank, ohne daß sie ein Feuer hätten anzünden können, weil die Veränderungen der Temperatur auf die der Magnetnadel gewirkt haben würden. Nach Ablauf dieser drei Stunden eilten sie mitten in der Nacht durch Glatteis, Schnee und Wind einem andern Observatorium zu, wo sie eine eben so mühsame und nicht weniger lästige Arbeit erwartete. Allein sie wurden beseelt von dem heiligen Feuer der Wissenschaft, und durch die Hoffnung

Digitized by Google

aufrecht erhalten, aus diesen langen Reihen von Ziffern, welche sie unabläſſig anhäuften, eines Tages irgend eine neue Entdeckung hervorgehen zu ſehen; denn es ſind koſtbare Materialien, aus denen alle Gelehrten Europas mit vollkommenem Vertrauen die Grundlagen ihrer meteorologiſchen Arbeiten ſchöpfen können. Nachts, wenn ein glänzendes Nordlicht den Himmel erhellte, waren alleſammt auf ihrem Poſten, die Einen verfolgten die Störungen der Magnetnadeln, die Andern notirten unter freiem Himmel, oft bei 20 Grad Kälte, die verſchiedenen Phaſen des Phänomens oder maßen die Höhe deſſelben über dem Horizont. Die Schraubenköpfe ihrer Inſtrumente waren ſo kalt, daß ſie genöthigt waren, dieſelben mit Tuch zu umwickeln, ohne dieſe Vorſichtsmaßregel blieben ihnen die Finger durch die Feuchtigkeit der Haut, welche augenblicklich gefror, am Kupfer angeklebt. Wenn ihre Hände, ſteif und ſtarr, den Bleiſtift nicht mehr zu halten oder das Inſtrument zu richten vermochten, ſo ſtand ihnen weiter kein Mittel zu Gebote, ſie wieder zu erwärmen, als ſie heftig zuſammenzuſchlagen, bis der Schmerz wieder etwas Wärme und Gefühl in dieſelben zurückrief. Trotz aller Hinderniſſe, welche ein rauhes Klima ihnen entgegenſetzte, haben ſie in einem Zeitraum von acht Monaten eine ſolche Maſſe von Arbeiten bewältigt, daß ich es aufgebe, ſie in dieſer Analyſe anzudeuten. Gezwungen eine Auswahl darunter zu treffen, werde ich mich auf einige Reſultate beſchränken, die leicht darzuſtellen ſind, die Erörterung der andern findet ſich in dem auf Staatskoſten unter dem Titel: Voyages de la corvette la Recherche en Scandinavie, en Laponie et au Spitzberg herausgegebenen Werke.

Temperatur.

Boſſekop hat in Anbetracht ſeiner Entfernung vom Pol kein ſehr ſtrenges Klima. Es rührt dies von der Nähe der

Digitized by Google

Nordsee her, welche unaufhörlich von den verschiedenen Zweigen des Golfstroms erwärmt wird. Diese große Strömung heißen Wassers entspringt im Golf von Meriko, wo ihre Temperatur 27 Grad und darüber beträgt; sie umfließt die Küsten von Schottland, zieht sich dann Norwegen entlang und verliert sich endlich im Eismeere und im Weißen Meere. Das Vorhandensein dieser Strömung läßt sich nicht bestreiten, denn ich selbst habe am Nordkap unter den Strandsteinen einen Samen von Mimosa scandens, einem Strauch des südlichen Amerika, aufgelesen, und ähnliche findet man in allen Hütten der Küstenfischer.

Bis zum 7. Oktober 1838 hielt sich das Thermometer über Null, an diesem Tage aber sank es unter den Gefrierpunkt herab, und nach einigen Schwankungen blieb es in der Nacht vom 17. auf — 12° stehen. Im November war sein niedrigster Standpunkt 21°,4. Im Beginn des Dezembers stieg es nie über — 10° und erreichte den 7. Mitternachts seinen niedrigsten Punkt, nämlich — 23°,5. Mitte Dezembers stieg es wieder über Null und hielt sich daselbst bis zum 22.; den 18. war es sogar auf 6 Grad gestiegen. Das Ende des Monats war nicht streng, vom 1. Januar an stellte sich aber die Kälte wieder ein, ohne jedoch so intensiv zu sein wie im vorigen Monat. Gegen Ende Januar schwankte das Thermometer von neuem einige Tage um Null herum. Im Februar hielt es sich im Ganzen zwischen — 5° und — 12°, in der ersten Woche des März aber sank es wieder auf — 20°, um gegen Mitte des Monats wieder auf Null zu steigen und in den letzten Tagen desselben Monats abermals auf — 19° zu fallen. Mit dem 1. April ward die Luft lauer und es begann zu thauen, das Thermometer hielt sich auf wenigen Graden unter Null und trotz mehrmaliger Wiederkehr der Kälte konnte der Winter als beendigt betrachtet werden, obgleich der

Digitized by Google

Frühling noch nicht die Schneedecke abgeschüttelt hatte, worunter die Erde begraben lag.

Untersucht man sorgfältig die Ursachen dieser häufig sehr plötzlichen Temperaturschwankungen, da das Thermometer oft binnen wenigen Stunden um 6 bis 8 Grad variirte, so gewahrt man alsbald, daß sie hauptsächlich von den in der Richtung des Windes eintretenden Veränderungen herrühren, dessen Wärme je nach den Gegenden, aus denen er bläst, nicht dieselbe ist. In Paris ist es Winters gemeiniglich bei Nordostwind am kältesten, während der West und Südwest das Thauen herbeiführen. Das kommt daher, weil der Nordost, bevor er zu uns gelangt, sich, über die eisigen Einöden Sibiriens und die mit Schnee bedeckten Ebenen Rußlands und Norddeutschlands hinstreichend, abgekühlt hat. Der Südwest dagegen, in Regionen entspringend, die in der Nähe des Aequators liegen, weht, über den Atlantischen Ocean fegend, die warmen Dünste des Golfstromes vor sich her.

Zu Bossekop war der kälteste Wind der Südost, der wärmste der Südwest, und die Zwischenwinde reihen sich in dieser Beziehung folgendermaßen an einander: Ost, Nordost, Nord, Nordwest, West. Die Vertheilung von Meer und Land um das Nordkap, sowie die Temperatur des Oceans, welche während des Winters bei Weitem höher als die der Erde ist, erklären diese Unregelmäßigkeiten. Der Seewind, der Südwest, ist der wärmste zu Bossekop wie zu Paris, die Eisfelder aber befinden sich statt im Nordosten im Südosten auf dem Plateau Lapplands. Dieser Einfluß der Erde ist so bedeutend, daß der Nordwind, welcher unmittelbar vom Eismeere herbläst, wärmer als der Südwind ist, welcher aus dem Innern der skandinavischen Halbinsel dorthin gelangt.

Bekanntlich ist die Wärme zu den verschiedenen Tages- und Nachtstunden nicht dieselbe, man nennt dies die tägliche

Digitized by Google

Temperaturschwankung. So beobachtet man in den Ebenen unserer Klimate folgenden Gang. Vor Aufgang der Sonne ist die Luft kälter als in irgend einem andern Augenblicke des Tages, gegen neun Uhr Morgens kommt ihre Wärme der mittlern Temperatur des Tages gleich, dann fährt sie fort zuzunehmen bis 3 Uhr Nachmittags, zu welcher Zeit sie ihren höchsten Grad erreicht. Von diesem Augenblick an nimmt die Wärme ohne Unterlaß ab, langt zwischen 8 und 9 Uhr Abends wieder bei der mittlern Temperatur an und erreicht ihr Minimum abermals vor Sonnenaufgang. Man ermißt leicht, daß diese Veränderungen eine Wirkung des täglichen Laufes der Sonne sind, die, je höher sie sich über den Horizont erhebt, desto mehr die Erde erwärmt. Nach Sonnenuntergang erkältet sich die Erde durch Strahlung, ohne daß irgend etwas sie für ihre Wärmeverluste entschädigte.

Da der tägliche Gang der Temperatur in unsern Klimaten durch den Lauf der Sonne geregelt wird, so ist es merkwürdig zu sehen, welcher Art die Temperaturveränderungen während der 24 Stunden sind, wo die Sonne, beständig unter dem Horizont, nur einen sehr schwachen Einfluß auf die atmosphärische Wärme ausübt. Nimmt man die mittlere Temperatur der vierzig nächtlichen Tage, welche dem Wintersolstitium vorangegangen oder gefolgt sind, so sieht man, daß ihre stündliche Schwankung nur vier Zehntel eines Grades beträgt, während sie während des Winters unserer Klimate auf mehre Grade steigt. Ja mehr, da der kälteste Augenblick des Tages um sechs Uhr Abends, der wärmste um eilf Uhr Morgens fällt, so ist der tägliche Gang der Temperatur alsdann, wie man sieht, vollständig unabhängig vom Lauf der Sonne und erklärt sich durch andere, allgemeine oder örtliche, Einflüsse, welche die Analyse der Beobachtungen mit einiger Wahrscheinlichkeit zu bestimmen gestatten wird.

Digitized by Google

Die Abweſenheit der Sonne war einer Art von Experimenten günſtig, deren Intereſſe nicht weniger bedeutend iſt. Je mehr man ſich in der Atmoſphäre erhebt, ſei es auf einem Berge, ſei es in einem Luftballon, deſto kältere Luftſchichten durchmißt man, oder mit andern Worten: die Temperatur nimmt mit der Höhe ab. Dieſes Geſetz aber, im Ganzen richtig, iſt nicht ohne Ausnahmen; ſo hat man in bergigen Ländern während des Winters oft eigenthümliche Temperaturumkehrungen notirt; es iſt vorgekommen, daß es auf dem Gipfel eines Berges wärmer war als am Fuße deſſelben. Verhält es ſich ebenſo in der Nähe des Pols? Wenn die Sonne über dem Horizont erſcheint, ſo ſind die Experimente ſehr unſicher, denn die Einflüſſe des Tages verlängern ſich bis in die Nacht hinein und verfälſchen die Reſultate. Ueberdies muß man einen Augenblick wählen, wo das Wetter ſtät und die Beſchaffenheit des Himmels gleichförmig iſt. Je nachdem die Briſe null oder mäßig war, bedienten ſich die Herren Lottin und Bravais bald gefeſſelter Ballons, bald fliegender Drachen. An dieſe Apparate waren Maxima- und Minima-Thermometer, d. h. Inſtrumente befeſtigt, welche die Angabe der höchſten und niedrigſten Temperaturen, denen ſie unterworfen wurden, bewahren. Dieſe Luftſonden haben zwiſchen 70 und 450 Meter Erhebung gezeigt, daß die Temperatur im Allgemeinen mit der Höhe zunahm. Der Unterſchied belief ſich bisweilen auf 6 Grad. Im Durchſchnitt betrug die Zunahme auf die erſten 100 Meter 1°,6; jenſeit dieſer Grenze durchſchnitt der Ballon immer kältere atmoſphäriſche Schichten. Dieſe eigenthümliche Thatſache läßt ſich folgendermaßen erklären. Auf der großen Hochebene von Lappland iſt der Winter ſehr ſtreng, denn das Thermometer ſinkt oft auf — 40 Grade. Daraus ergiebt ſich, daß die Luft daſelbſt dichter und ſchwerer wird, ſie ſenkt ſich alſo auf die Küſten herab, ohne die Erdoberfläche zu verlaſſen, daher der zu Boſſekop ſo gewöhnliche Südoſtwind.

Digitized by Google

Da aber das Meer wärmer als der Boden ist, so erhebt sich ein aufsteigender Luftstrom über demselben und fließt dem Lande zu, angezogen durch die auf dem lappländischen Plateau sich bildende Lücke. Demnach herrschen gewöhnlich zwei über einander gelagerte Strömungen in der Atmosphäre, die untere besteht aus kalter, die obere aus warmer Luft. Man öffne die Thür eines geheizten Zimmers, welches mit einem kalten Gemache in Verbindung steht, und man wird dieselbe Erscheinung beobachten. Die Flamme einer über der Thür aufgestellten Kerze richtet sich nach außen, die einer unten aufgesteckten Kerze nach innen. So stieß das Thermometer, wenn es in die Lüfte stieg, auf die Seeströmung, deren Temperatur höher war als die der Landbrise.

Den 4. Oktober waren die Ebenen weiß vom ersten Schnee, und gegen Mitte Mais war er noch nicht ganz geschmolzen. Wenn das Thermometer sich auf wenigen Graden unter Null hielt, fiel der Schnee oft in anhaltender Weise und in großen Flocken. Nicht so verhielt es sich, wenn die Temperatur unter — 15 Grade betrug. Man weiß nämlich, daß der Schnee bei großer Kälte selten ist. So ist in Sibirien, wo die Winter äußerst streng sind, die Menge des Schnees, welcher fällt, geringer als in den Gegenden, wo die Winter milder sind. Auf den Schweizer Alpen finden die beträchtlichsten Schneeanhäufungen gegen die Baumgrenze, bei 2000 Meter etwa, statt; höher hinauf fällt weniger. Es ist ein bemerkenswerther Umstand, daß der Boden trotz Temperaturen von — 18 bis — 20°,6 während des Aufenthalts unserer Gelehrten mit reichlichem Schnee bedeckt war. Auch sahen sie, daß unter allen Krystallformen des Schnees die des Sternes eine der häufigsten war.*) Die niedrigste Temperatur, bei der sie einen sternförmigen Schneefall beobachteten, betrug — 12 Grade, die Sternchen hatten kaum 2 Millimeter im Durchmesser.

*) Siehe Kämtz, Lehrbuch der Meteorologie, Band I. S. 409 u. Taf. 2.

Digitized by Google

Verbindet man die Beobachtungen der Herren Lottin, Bravais, Lilliehöok und Siljeström mit denjenigen, welche die Herren Crowe, Thomas und Ihle vier Jahre lang nach der Abreise der französischen und schwedischen Beobachter fortgesetzt haben, so ist es leicht, daraus die mittlere Temperatur von Bossekop abzuleiten; ich habe gefunden, daß sie danach 0°,49 beträgt, d. h. sehr nahe bei Null steht und also um 10 Grad niedriger als die von Paris ist; darauf könnte man dieses Mittel mit den Temperaturen der Brunnen, der Quellen und des Bodens bei verschiedenen Tiefen vergleichen. Mehre Einzelheiten über letztere werden vielleicht nicht ohne Interesse sein.

Je mehr die Erde im Laufe des Tages oder in der Folge der Jahreszeiten von der Sonne erwärmt wird, desto mehr bringt diese Wärme in den Boden ein und wirkt auf die in denselben eingesetzten Thermometer. Bei schwacher Tiefe wird das Thermometer durch die täglichen Temperaturschwankungen berührt, und die Höhe der Säule wechselt in der Zwischenzeit von 24 Stunden. Bei 1,5 M. unter der Oberfläche aber berühren diese Schwankungen das Instrument nicht mehr und bei 20 Meter etwa wird das Thermometer selbst nicht mehr von den jährlichen Schwankungen berührt, d. h. es zeigt stets dieselbe Temperatur. Dies war das allgemeine Resultat der zu Paris, Brüssel, Edinburg und Upsala angestellten Experimente über die Tiefe, bei welcher die täglichen und jährlichen Schwankungen der Temperatur erlöschen. Herr Bravais wollte sie zu Bossekop wiederholen, er nahm sich vor, ein Bohrloch von 20 Meter Tiefe zu machen; das Abbrechen des Erdbohrers aber, ein in diesen Gegenden unersetzlicher Verlust, zwang ihn, bei 8,5 M. stehen zu bleiben. Ein Thermometer ward in diesen Schacht hinabgelassen, und ein ganzes Jahr lang hat sich die Säule um keinen einzigen Grad verlängert oder verkürzt. Dieser Umstand gestattet zu berechnen, bei welcher Tiefe sie gleich der des Thermometers,

Digitized by Google

das sich 28 Meter unter dem Boden der Pariser Sternwarte befindet, unbeweglich geblieben wäre. Weniger tief eingesetzte und regelmäßig in zweckdienlichen Zwischenräumen abgelesene Instrumente werden auch gestatten, das Gesetz der Wärmefortpflanzung im Boden und im Schnee während des Winters von Finmarken festzustellen.

Es würde mir, ohne die Geduld des Lesers zu mißbrauchen, nicht möglich sein, Rechenschaft von den über die Temperatur der Brunnen, der Quellen und des Meeres angestellten Beobachtungen abzulegen; letztere namentlich sind zu Bossekop und Kaasfjord regelmäßig fortgesetzt worden, um sich Gewißheit darüber zu verschaffen, ob Ebbe und Flut irgend welchen Einfluß auf die Wärme der Golfgewässer haben, und um zu sehen, unter welchen Bedingungen sie sich mit Eis bedecken. Das positivste Resultat ist das gewesen, daß selbst bei 20 Grade unter Null übersteigenden Fröſten die Fjorde von Finmarken nicht zufrieren, während schwere mit Erz beladene Wagen den ganzen Winter lang über den Altenfluß fahren. Mehr noch, das Meerwasser ist im Allgemeinen wärmer als die Luft, auch stößt es fast immer einen dichtem Rauche vergleichbaren Dunst aus und die lappländischen Fischer tauchen oft ihre Handschuhe hinein, um sich die Hände zu wärmen.

Atmosphärischer Druck.

Die zu Bossekop während des Winters von 1838 auf 1839 angestellten barometrischen Beobachtungen sind in den Augen der Gelehrten nicht minder interessant, als die auf die Messung der Temperaturen bezüglichen. Da dieses Interesse jedoch weniger allgemein ist, so werde ich mich hier darauf beschränken, einige leicht faßliche und auszusprechende Resultate zu geben.

Digitized by Google

Jedermann weiß, daß man nach der Höhe des Barometers mit einiger Gewißheit das Wetter voraussehen kann. Wenn das Barometer hoch steht, so ist es wahrscheinlich, daß das Wetter schön wird, steht es niedrig, so muß man befürchten, daß es schlecht wird. In Wirklichkeit hängen diese Anzeichen von der Richtung des Windes ab. So erreicht das Barometer zu Paris seine höchste Höhe bei Nordost, seinen niedrigsten Stand bei Südwest. Da nun der Nordost ein trockener, der Südwest ein regenbeladener Wind ist, so ist es klar, daß, wenn das Barometer hoch steht, Aussicht vorhanden ist auf schönes Wetter, wenn es niedrig steht, die Wahrscheinlichkeit, daß es regnen wird. Diese Regel aber, richtig für Frankreich, ist es nicht für alle Länder. So ist in Süddeutschland der Nordwest der Regenwind, in Schweden bringt den Bottnischen Meerbusen entlang der Ostwind schlechtes Wetter. In diesen Gegenden ist ein starkes Fallen des Barometers keine Regenprophezeiung und zu Petersburg, wo es gleichmäßig bei allen Winden regnet, giebt es keine Beziehung mehr zwischen der Höhe des Barometers und den Veränderungen des Wetters. Zu Bossekop beobachtet man etwas Aehnliches, denn wenn man die Winde der entsprechenden Höhe der Barometersäule gemäß in zwei Gruppen zusammenstellt, so findet man, mit denen beginnend, bei welchen das Barometer sich am höchsten hält, Nordost, Nord, Nordwest, West und Südwest, gesammt Seewinde. Die zweite Gruppe umfaßt Ost, Südost und Süd, welche vom Lande herwehen. Da nun der Südost ein trockener und die Westwinde feuchte Winde sind, so sieht man, daß ein Fallen des Barometers eine Prophezeiung schönen Wetters ist. Außerdem bemerkt man, daß die warmen Winde das Barometer steigen lassen, während die kalten Winde es herabdrücken, was das Gegentheil dessen ist, was man gemeiniglich während des Winters in den andern Theilen Europas beobachtet.

Digitized by Google

Stellen wir uns einen Augenblick vor, man notirte jeden Monat genau den niedrigsten und den höchsten Punkt des Barometers. Dem Unterschiede zwischen den beiden beobachteten Höhen giebt man den Namen monatliche Oscillation. Stellt man diese Beobachtungen mehre Jahre hinter einander an und nimmt das Mittel der beobachteten Unterschiede, so wird man die mittlere monatliche Oscillation erhalten; dieser Unterschied nimmt beständig zu, je mehr man sich vom Aequator entfernt. So beträgt sie Winters auf Havanna 9,6 Mm., zu Marseille 23,1 Mm., zu Berlin 33,1 Mm., zu Bossekop fand die Nordkommission, daß sie auf 38,5 Mm. stieg, was das von uns ausgesprochene Gesetz bestätigt.

Man kann sich die Atmosphäre als ein tiefes Meer vorstellen, in dessen Schoß wir untergetaucht sind. Dieses Meer bildet auf seiner Oberfläche Wellen und Wogen, ähnlich denen des wirklichen Meeres. Gehen diese Wellen über unsere Köpfe weg, so steigt das Barometer. Auch sind die Meteorologen schon längst von dem lebhaften Verlangen beseelt gewesen, den Lauf dieser atmosphärischen Wellen zu verfolgen, indem sie die allmäligen Barometerveränderungen in verschiedenen Ländern verglichen; in dieser Absicht beschlossen. Herr Delcros und ich, den Barometer alle Stunden bei Tag und bei Nacht in Paris zu beobachten, während unsere Mitarbeiter dasselbe in Bossekop thaten. Diese Beobachtungen wurden fünf Wochen lang, im März und April 1839, fortgesetzt. Indem man jedoch den Gang der Instrumente zu Paris und zu Bossekop vergleicht, findet man keine offenbare Uebereinstimmung, keine stete Wechselbeziehung zwischen den Veränderungen des atmosphärischen Drucks. Es bedürfte also einer gewissen Anzahl von Zwischenpunkten, die uns belehrten, welches die Veränderungen des Drucks in der ganzen Zone, welche Paris und Bossekop trennt, gewesen sind. Wenn die civilisirte Welt erst mit einem

Digitized by Google

Netz meteorologischer Stationen bedeckt sein wird, dann wird man diese und noch viele andere Fragen aufzuklären vermögen, deren Lösung nur durch gleichzeitige Beobachtung der atmosphärischen Phänomene möglich ist.

Die Erfüllung dieses Wunsches ist vielleicht nicht mehr sehr fern. Es bestehen bereits eine Menge von Stationen in Europa. Die gleichzeitigen Beobachtungen derselben, durch den elektrischen Telegraphen in den Hauptobservatorien der vornehmsten Länder zusammengefaßt, werden eines Tages gestatten, die Gesetze zu finden, welche die Störungen der Erdatmosphäre und die Fortpflanzung der Luftwellen, von denen soeben die Rede gewesen, beherrschen.

Nordlichter.

Die Untersuchungen, von denen wir bisher gesprochen, können in allen Ländern angestellt werden, aber es giebt solche, welche nur in der Nähe der Pole unternommen werden können; hierher gehört das Studium der Nordlichter.

In unsern Klimaten ist das Nordlicht ein seltenes Phänomen von kurzer Dauer. Zwei bis drei Mal des Jahres bemerkt man über dem Horizont und in nördlicher Richtung einen Schimmer, der alsbald wieder verschwindet. Die Tinten desselben sind die der Dämmerung, und da es sich oft beim Anbruch der Nacht zeigt, so unterscheidet es der unachtsame oder schlecht orientirte Beobachter nicht von den röthlichen Reflexen, welche zuweilen noch ziemlich lange nach Sonnenuntergang anhalten. Ja oft hat man das Nordlicht mit dem Schein einer großen Feuersbrunst verwechselt. Im Norden sind dergleichen Irrthümer unmöglich, das Phänomen tritt daselbst mit einem Glanz und einer Pracht auf, daß sich nichts damit vergleichen läßt. Prächtig und bunt, wie ein Feuerwerk, wechselt das

Digitized by Google

Schauspiel jeden Augenblick. Der Maler hat die Zeit nicht, die Formen und Tinten dieser flüchtigen Schimmer festzubannen, der Dichter muß darauf verzichten, sie zu beschreiben. Nie gleicht ein Nordlicht dem andern, sie wechseln ins Unendliche ab. Ich werde mich also darauf beschränken, die verschiedenen Phasen des Phänomens, wie es sich meistens darstellt, anzugeben, und daran die Veränderungen zu knüpfen, welche dieselben in der Richtung der Magnete hervorrufen.

Um eine Vorstellung von den Arbeiten der Kommission über die Nordlichter zu geben, kann ich nichts Besseres thun, als wörtlich die Analyse wiederzugeben, welche Herr Elie de Beaumont in seiner ausgezeichneten Lobrede auf Auguste Bravais, die er als ständiger Sekretär der Akademie der Wissenschaften in der öffentlichen Sitzung vom 6. Februar 1865 hielt, darüber angestellt hat.

„Wenn der erste noch zweifelhafte Schein eines Nordlichtes anfängt sich am Himmel zu verbreiten, so bemerkt man zuerst am Horizonte ein wenig westlich von Norden einen dunkeln Kreisabschnitt, der nach den sehr wahrscheinlichen Muthmaßungen Bravais' nichts Anderes sein würde als die dichte Masse der Nebel, womit die temperirten Gewässer des Polarmeeres fast beständig bedeckt sind. Ueber dem dunkeln Abschnitt zeigt sich alsbald ein Schein ähnlich dem einer Feuersbrunst, vielleicht einfach von den noch fernen Strahlen des Nordlichtes herrührend, die sich auf der Oberfläche der Meeresdünste spiegeln. Bald darauf zeichnet sich ein leuchtender Bogen über dem dunkeln Segment ab. Die beiden äußersten Enden desselben, seine beiden Pfeiler, stützen sich auf den Horizont, und sein Kulminationspunkt, der ihn in zwei gleiche und symmetrische Theile theilt, liegt meist in der Nähe des magnetischen Meridians. Durchschnittlich fällt er etwas westlich von diesem Meridian, von dem er sich mehr und mehr entfernt, je höher er sich über dem nördlichen Rande des

Horizonts befindet, namentlich wenn er sich, das Zenith überschreitend, dem südlichen Horizont nähert, von dem er in gewissen Fällen nur einige Grade entfernt ist.

„Zuweilen zeigen sich mehrere verschiedene Bögen zu gleicher Zeit, sehr oft sieht man ihrer zwei, seltener drei; man hat ihrer neun zugleich gezählt.

„Die Breite derselben, welche im Durchschnitt 7 bis 8 Grad beträgt, kann über 25 Grade steigen, namentlich im kulminirenden Theile, wenn er am Zenith vorüberkommt. Durch Kombinirung der Messungen führt letztere Bemerkung zu der Annahme, daß die Bögen des Nordlichts parallel mit der Erdoberfläche abgeplattet sind, und diese Annahme hat Bravais eins der geeigneten Mittel an die Hand gegeben, das Maß der Höhe zu bestimmen, in der sie sich über dem Boden befinden.

„Seit Langem schon hatte man sich mit dieser Höhe beschäftigt und mit Recht gemeint, daß man sie nach der Parallelare berechnen könnte, die sich aus zwei Beobachtungen ein und desselben Bogens ergäbe, welche gleichzeitig von zwei in bekannter Entfernung von einander aufgestellten Forschern angestellt würden. Um sich dieses Mittel zur Bestimmung zu verschaffen, brachte Bravais dreizehn Tage, vom 9. bis zum 22. Januar 1838 in Jupvig, einem 15 Kilometer nördlich von Bossekop gelegenen Orte, zu, um hier seinerseits die Nordlichter zu verfolgen, welche seine Mitarbeiter in denselben Augenblicken auf der gewöhnlichen Station beobachteten.

„Die Formen einer bedeutenden Anzahl von Bögen und namentlich die der regelmäßigsten Bögen sind von der Kommission mit großer Sorgfalt aufgenommen worden, und Bravais hat gezeigt, indem er sie mit Hülfe eleganter geometrischer Konstruktionen und sehr geschickt und einfach reduzirter trigonometrischer Formeln erörterte, daß sich alle diese Bögen der Hypothese des berühmten korrespondirenden Mitgliedes des

Digitized by Google

Instituts, Herrn Hansteen (von Christiania) gemäß, als die Perspektiven kreisförmiger Ringe betrachten lassen, deren Mittelpunkt im Erdhalbmesser des magnetischen Poles liegt und deren Ebene senkrecht auf diesem Halbmesser steht.

„Seine Formeln haben ihm für jeden Fall die Höhe des Ringes über der Erdoberfläche geliefert, und dieses Messungsmittel in Verbindung mit den beiden anderen bereits angegebenen hat ihn zu dem Schlusse geführt, daß die Bögen des Nordlichts sich in einer Höhe von 100 bis 200 Kilometer in der Region befinden, wo die Sternschnuppen und Meteorsteine weißglühend und leuchtend werden, d. h. nahe an den äußersten Grenzen der Erdatmosphäre, deren Höhe man lange Zeit für weniger bedeutend gehalten hatte.

„Die Farbe der Nordlichtbögen ist gewöhnlich schlicht weißgelb. Sie besitzen hinlängliche Durchsichtigkeit, um die Gestirne hindurch zu erkennen. Der Glanz der strahlendsten Bögen kommt dem von Sternen erster Größe gleich, die Mehrzahl aber kann sich nur mit Sternen zweiter, dritter, vierter Größe messen.

„Die Stellung eines jeden Bogens ist während der ganzen Dauer seines Daseins nicht unveränderlich. Im Gegentheil wechselt sie oft mit großer Schnelligkeit, was den Beobachter nöthigt, sehr behend zu operiren, um den verschiedenen Theilen ein und desselben Bogens genau unter sich korrespondirende Punkte zu bestimmen. In ihren Bewegungen nähern sich die Bögen bald dem Zenith, bald entfernen sie sich, sei es nach Norden, sei es nach Süden. Ihr unterer, dem Horizont zugewandter Rand ist gewöhnlich am schärfsten begrenzt. Sie haben nicht immer regelmäßige Formen; man sieht sie tausend bizarre Gestalten annehmen, wie von einem wellenförmigen Faltenwurfe oder auch eines Hakens. Zuweilen, namentlich gegen Ende

zeigen sie Neigung, sich in kurze, in der Richtung der Breite des Bogens laufende Strahlen aufzulösen.

„Nach den Bögen kommen etwas später die eigentlichen sogenannten Strahlen zum Vorschein, welche den zweiten Typus bilden, auf den sich der Schein des Nordlichts zurückführen läßt. Die Strahlen bestehen in leuchtenden und bei weitem längeren, als breiten Säulen, deren Verlängerung nach oben im magnetischen Zenith zusammenlaufen würde, dem scheinbaren Vereinigungspunkt aller parallel mit der Neigungsnadel laufenden Linien, und welche zu Bossekop nur 13 Grad südlich vom astronomischen Zenith liegt.

„Der Glanz der Strahlen ist veränderlich wie der der Bögen und gewöhnlich lebhafter.

„Die Strahlen zeigen zwei Arten von Bewegungen; kraft der einen verlängert sich der Strahl gegen den Zenith oder gegen den Horizont, kraft der andern wird er seitlich oder parallel mit sich selbst verrückt. Diese Bewegungen besitzen zuweilen eine ungemeine Geschwindigkeit, und nicht selten sieht man die Strahlen ihr Licht in zitternder Bewegung nach dem Zenith und noch öfter mit äußerster Lebhaftigkeit nach dem Horizont schießen. Wenn diese beiden Bewegungen schnell mit einander abwechseln, so scheint der Strahl zu *spielen* oder zu *tanzen*. Es sind die caprae saltantes der Alten, die *Marionetten* der Bewohner von Neufundland, die merry dancers der Engländer. Im Allgemeinen werden, je schneller die Bewegungen, desto glänzender die Strahlen.

„Die Farbe der Nordlichtstrahlen ist gewöhnlich weiß oder blaßgelb, zuweilen röthlich. Wenn die zitternden Bewegungen der Strahlen sehr schnell werden, so konzentrirt sich die glänzend gelbe Tinte im mittleren Theile derselben, und die entgegengesetzten Enden färben sich mit einem violetten Roth und mit

Digitized by Google

Grün, wobei das Roth sich immer an der Seite zeigt, wohin der Strahl sein Licht schießt.

„Die Strahlen vereinigen sich zuweilen im magnetischen Zenith, um dort eine vollständige oder unvollständige Krone zu bilden. Wenn diese Strahlen, in Bewegung gerathend, einen lebhaften Glanz annehmen und sich ihrer gewöhnlichen gelblichen Tinte entäußern, um sich roth und grün zu färben, dann bietet die Krone den höchsten Grad von Pracht dar, den das Nordlicht zu entfalten vermag.

„Die zitternden Bewegungen, von denen die Strahlen belebt sind, verändern sich in bestimmten Augenblicken in einer Art allgemeinen Zuckens, welches sich jedes Schimmers im Nordlicht, der Bögen sowohl wie der Strahlen, bemächtigt. Dies ist die Ankündigung der mehr oder minder nahen Abnahme des glänzenden Meteors.

„Der Glanz des Nordlichts scheint den nordischen Regionen als eine Entschädigung für die Abwesenheit der Sonne verliehen zu sein, und diese Polarhelle, kaum zwei- bis dreimal jährlich am Horizont von Paris sichtbar, erleuchtet fast jeden Abend die Horizonte, von welchen das Tagesgestirn sich entfernt hat. Man beobachtet sie dort nicht während des ununterbrochenen Sommertages, erst gegen Ende August und namentlich zur Zeit des Herbsttäquinoctiums beginnen sie in Lappland häufiger zu werden, während ihre Häufigkeit mit dem Frühlingsäquinoctium und namentlich gegen Ende April abnimmt. Während dieser sechsmonatlichen Zwischenzeit giebt es nur wenige Nächte ohne Nordlicht.

„Die Nordlichter sind also in ihren Erscheinungen dem Lauf der Jahreszeiten unterworfen und was nicht weniger beachtenswerth ist, selbst während der Winternacht bleiben die Stunden ihres Beginnes und ihrer verschiedenen Phasen in beständiger Beziehung zur Stunde des Durchgangs der unsicht-

Digitized by Google

bar gewordenen Sonne durch den Meridian. Sie zeigen ſich ſtets während der Stunden, die der Nacht unſerer gemäßigten Zonen entſprechen. Meiſt zwiſchen zehn und elf Uhr Abends kleiden ſie ſich in die glänzenden Farben, welche einige derſelben auszeichnen. Dieſer Abſchnitt der Nacht iſt die ſtrahlendſte Periode des Meteors, das gewöhnlich gegen Morgen verſchwindet.

„Bravais hat ſich überzeugt, daß er beim Schein eines glänzenden Nordlichts eine mit Petitſchrift gedruckte Seite faſt eben ſo leicht als beim Schein des Vollmonds zu leſen vermochte. Der Vollmond befindet ſich in Oppoſition zur Sonne, und da, wo die Sonne nicht aufgeht, ſieht man ihn faſt beſtändig am Horizont. Das doppelte Licht des Nachtgeſtirns und des Nordlichts vermindert für die Polarregionen bedeutend die Dunkelheit der Winternacht. Dieſe unregelmäßige Helle genügt den Lappen, Samojeden und Esquimaux, um von ihren Renthieren oder Hunden gezogen, im Schlitten die endloſen Schneeflächen, welche ihre Heimat bedecken, zu durcheilen, und wenn die Abweſenheit der Sonne dahin wirkt, ihre Vorſtellungen zu verdüſtern, ſo führt der wunderſame Glanz der leuchtenden Erſcheinungen ihnen dagegen phantaſtiſche Bilder vor, ganz geeignet, ihre Einbildungskraft zu wecken und zu beſchäftigen.

„Trotz der Bewegungen, womit die Bögen und Strahlen des Nordlichts begabt ſind, iſt es doch klar, daß ſie der Drehungsbewegung der Erde folgen. Das Nordlicht iſt alſo ein atmoſphäriſches und kein kosmiſches Phänomen. Canton, Becquerel und andere Phyſiker haben die Aehnlichkeit hervorgehoben, welche die violettrothen Tinten dieſes Meteors mit denen darbieten, welche die Elektrizität entfaltet, wenn ſie ſich im leeren Raum bewegt. Dieſer Umſtand in Verbindung mit der ſo häufig konſtatirten Einwirkung des Nordlichts auf die Magnetnadel hat die Phyſiker darauf gebracht, ſie unter die elektriſchen Phänomene zu rechnen. Bravais hat ſich dieſer

Digitized by Google

Meinung angeſchloſſen, deren Richtigkeit ein berühmter Phyſiker, Herr de la Rive, neuerdings durch ein prächtiges Experiment beſtätigt hat."

Iſt das Nordlicht ein konſtantes Phänomen? Für unſere Klimate kann die Antwort wohl nicht zweifelhaft ſein, denn man bemerkt jährlich höchſtens fünf oder ſechs; im Norden iſt es anders. Frägt man die Bewohner, ſo werden ſie antworten, daß die Nordlichter häufig ſind, aber nicht jede Nacht glänzen; das kommt daher, weil ſie nur diejenigen bemerken, deren Glanz mächtig genug iſt, um plötzlich die Fenſter ihrer Wohnungen zu beleuchten. Alle verſchwommenen oder zerſtreuten Nordlichtſchimmer, welche ſich am Horizont zeigen, gehen unbemerkt vorüber. Unſeren Gelehrten aber konnten ſie nicht entgehen, denn einer von ihnen wachte ſtets während der Nacht, und ihre geübten Augen wußten die geringſte leuchtende Tinte, welche ſich am Himmel zeigte, zu unterſcheiden. Vom 12. September 1838 bis 18. April 1839 ſahen ſie hundertunddreiundfünfzig Nordlichter, ſechs oder ſieben Nächte mit zweifelhaftem Schimmer ungerechnet. Ich finde in ihren Regiſtern von Anfang bis zu Ende keine klare Nacht erwähnt, die nicht dies Phänomen dargeboten hätte. Man muß alſo zugeben, daß das Nordlicht ſich in allen Nächten gezeigt hat, wo die Beſchaffenheit des Himmels geſtattete, es zu bemerken. Andererſeits kann man nicht annehmen, daß das Nordlicht gerade jedesmal bei Wolkenbedecktem Himmel ausgeblieben ſei, und man iſt daher zu der Behauptung berechtigt, daß ſich dieſes Phänomen wahrſcheinlich allnächtlich wieder erzeugte. Nichtsdeſtoweniger würde es gewagt ſein, von der Gegenwart auf die Zukunft zu ſchließen, denn man hat ſäkulare Perioden für die Häufigkeit dieſer Erſcheinungen wahrgenommen. Sehr gewöhnlich von 1707 bis 1790, wurden ſie während der dreißig darauf folgenden Jahre ſelten, ſeit 1820 aber ſieht man ſie wieder öfter. Um dieſes Aus-

Digitized by Google

bleiben genau festzustellen, müßten die Beobachter des Nordens den Muth haben, reihum zu wachen, damit kein Nordlicht ihrer Aufmerksamkeit entgehe; ohne Erfüllung dieser Bedingung würde ihre Häufigkeit nur ein Maßstab für den Eifer der Meteorologen sein, und da die Beobachtung der Himmelserscheinungen täglich mehr Mitarbeiter zählt, so würde es mich gar nicht wundern zu vernehmen, daß die Zahl der Nordlichter unaufhörlich zunimmt.

Die Meinungen über die Höhe der Nordlichter sind ungemein verschieden. Einige verlegen sie über die Grenzen unserer Atmosphäre, während die englischen Reisenden sie unterhalb der Wolken, oder auch am Boden streichend und sich zwischen sie und ihre Gefährten schiebend, gesehen haben wollen. Da sie in Nordamerika, wo der magnetische Pol liegt, beobachteten, so ist es wohl möglich, daß sie in der That Nordlichter fast in gleicher Linie mit dem Boden gesehen haben, zu Bossekop aber hat eine aufmerksame Untersuchung bewiesen, daß diese Erscheinungen trügerisch sind und sich durch den Reflex des Nordlichts auf dem Schnee oder den Wolken erklären lassen.

Erdmagnetismus.

Es bleibt mir noch eine schwierige Aufgabe übrig, die nämlich, die Einflüsse des Nordlichts auf die Magnetnadel darzuthun. Um diese Einflüsse zu analysiren, sind mehre Apparate erforderlich. Der erste ist die Abweichungsnadel. Man stelle sich eine große Magnetnadel horizontal an einem Bündel ungezwirnter Seide aufgehangen vor. Dieses Bündel ist an einem Querbalken befestigt, der von zwei feststehenden, auf einer horinzontalen Marmorplatte ruhenden Säulen getragen wird. Eine in Grade eingetheilte Skala dient dazu, die Abweichungen der Nadel zu schätzen. Diese steht nämlich nie still; unaufhörlich wandert sie in ziemlich regelmäßiger Weise nach Osten oder nach Westen, sobald sich aber das Nordlicht zeigt, zeigt die

Digitized by Google

Nadel eine ganz außergewöhnliche Unruhe. Faſt immer beginnt die nördliche Spitze nach Weſten zu wandern, kommt dann auf ihren Ausgangspunkt zurück, überſchreitet ihn nach Oſten und hält erſt nach vielen unregelmäßigen Schwankungen inne. Namentlich während der Nordlichtkronen, wenn das Nordlicht in ſeinem ganzen Glanze daſteht, iſt die Abweichung ſehr ſtark. Die größte, den 4. Februar beobachtete, hat $4^1/_2$ Grad oder den achtzigſten Theil des Umfanges betragen. Die wenig glänzenden Nordlichter, die, deren Licht zerſtreut iſt und die den Horizont nicht verlaſſen, wirken dagegen nur ſehr wenig auf die Magnetnadel ein. Wenn der Himmel rein und ohne Nordlicht iſt, ſo iſt die Nadel nie unruhig, ſondern ihre Bewegungen ſind langſam und abgemeſſen wie in unſern Klimaten.

Die Nadel, von der ſoeben die Rede geweſen, bleibt nur in Folge einer beſondern Stellung des Aufhängungspunktes in horizontaler Lage. Unterſucht man, welches die Richtung einer frei an ihrem Mittelpunkte ſchwebenden Magnetnadel iſt, ſo ſieht man, daß ſie dem Horizont zugeneigt iſt. Eine Nadel dieſer Art nennt man die Neigungsnadel. Zu Boſſekop war dieſe Nadel um 76° 20′ geneigt, und die Kommiſſion konnte zu wiederholten Malen die ſeit langem beobachtete Thatſache beſtätigt ſehen, daß die Kronen, welche die Nordlichter begleiten, ſich immer in der Region des Himmels befinden, wo die verlängerte Neigungsnadel auslaufen würde. Dieſer enge Zuſammenhang zwiſchen der Richtung der Nadel und der Stellung der Krone am Himmelsgewölbe zeigt die genaue Verbindung, worin die Nordlichter mit den Störungen des Erdmagnetismus ſtehen.

Die frei an ihrem Mittelpunkte ſchwebende Nadel gehorcht zwei Kräften, einer horizontalen und einer vertikalen. Um die Veränderungen dieſer beiden Kräfte zu meſſen, braucht man

Digitized by Google

zwei verschiedene Apparate; sie wurden mit Ausdauer beobachtet. Man wies nach, daß die Stärke der horizontalen Kraft zunimmt, wenn das Nordlicht sich zeigen soll, darauf vermindert sie sich, und wenn jenes zum Zenith gelangt, so ist sie geringer als vor dem Erscheinen des Nordlichts. Was die vertikale Stärke betrifft, so ist sie während der Nordlichter schwächer.

Welches ist nun der Zusammenhang, der zwischen diesem Phänomen und den Kräften besteht, welche die Stellung der Magnetnadel bestimmen? Das ist eins der größten Räthsel der heutigen Physik, und die Lösung desselben würde wahrscheinlich zur Kenntniß der verborgenen Natur dieser geheimnißvollen Kräfte und des Nordlichtes selbst führen. Wünschen wir inzwischen unsern Landsleuten und ihren Genossen Glück dazu, die Lösung der Frage gefördert zu haben, indem sie die Wirkung der Nordlichter gleichzeitig an allen den zur Zeit, wo sie beobachteten, bekannten magnetischen Apparaten untersuchten.

Schädelmessungen.

Die leblose Natur ist der Haupt-, doch nicht der einzige Gegenstand der Studien der Nordkommission gewesen. Finmarken ist der gemeinsame Sammelplatz drei verschiedener Racen, der Norweger, Finnen und Lappen. Die Racen unterscheiden sich durch Verstand, Sprache, Gesichtsbildung, Größe, Sitten und Tracht. Ehemals begnügte man sich mit diesen unterscheidenden Merkmalen, aber seit sämmtliche Wissenschaften mehr und mehr nach Genauigkeit streben, genügen die malerischen Beschreibungen nicht mehr. Da das Haupt der Sitz der Sinneswerkzeuge und des Verstandes ist, so ist seine Form von großer Bedeutung für die Charakteristik der Racen, und jeder Reisende hat die Gewohnheit, aus den Ländern, die er besucht, einige Schädel mitzubringen. Außer den physischen Schwierig-

Digitized by Google

keiten und moraliſchen Bedenken, welche dieſe Art von Sammlungen hemmen, iſt es in Finmarken eine materielle Unmöglichkeit, daran zu denken. Man hätte auf einem Kirchhofe nicht die Köpfe der drei Racen, welche ſich daſelbſt durcheinander gewürfelt finden, herauserkennen können. Uebrigens iſt der Nutzen dieſer Sammlungen ein weniger begründeter, als man gewöhnlich meint. Man bringt zwei oder drei Schädel mit, die man für Typen anſieht, während ſie ſehr wohl völlige Ausnahmen bilden können. Was würde man wohl von einem Reiſenden ſagen, der den mächtigen Schädel Cuvier's oder den kleinen Kopf gewiſſer Idioten als den Schädeltypus unſeres Landes vorzeigen wollte?

Ein typiſcher Schädel iſt in der Ethnologie ein ſolcher, welcher eine Form und Mitteldimenſionen aufweiſt, die gleich weit von den Extremen in Größe oder Kleinheit entfernt ſind. Wie aber dieſen mittleren Schädel erkennen? Nichts weiſt darauf hin, denn man weiß eben nicht, welches dieſe Mitteldimenſionen ſind, deren Kenntniß von ſo weſentlichem Belang iſt. Könnte man die Kopfdurchmeſſer von lebenden Menſchen nehmen, ſo würden alle Schwierigkeiten ſofort gehoben ſein. Der Cephalometer des Doctors Anthelme geſtattet dies. Derſelbe iſt ein aus zwei Kupferringen beſtehendes Inſtrument, einem feſten, der den Kopf umgiebt, und einem beweglichen, der ſich von vorn nach hinten bewegt. Dieſes Inſtrument, auf das Prinzip der Polarkoordinaten der Geometer gegründet, giebt die Entfernung des Schädelcentrums von ſämmtlichen Punkten der Peripherie deſſelben. Dieſes Centrum befindet ſich inmitten der geraden Linie, welche die beiden Ohrlöcher mit einander verbindet. Nachdem man den Schädel eines Individuums mit dieſem Cephalometer gemeſſen hat, kann man die Form und Größe deſſelben in Gyps oder Thon genau wiedergeben. Allein ſo viel Mühe iſt nicht einmal erforderlich, es genügt, den Abſtand von etwa

Digitized by Google

zwanzig Punkten der Peripherie des Schädels vom Mittelpunkte desſelben auf einer Krümmung zu meſſen, die, von der Naſenwurzel ausgehend, in der Mitte des Nackens ausläuft. Auf dieſe Weiſe erhält man den vertikalen Flächen-Durchſchnitt des Schädels, welcher den Kopf in zwei ſymmetriſche Hälften, eine linke und eine rechte, theilen würde. Dieſer Durchſchnitt von vorn nach hinten wird die Form des Ganzen vollkommen charakteriſiren. Wenn man will, vervollſtändigt man dieſe Mittelmeſſung durch Seitenmeſſungen, Querſchnitten entſprechend, die von einem Ohre zum andern gehen und das Haupt in zwei nicht ſymmetriſche Theile, einen vordern und einen hintern, ſcheiden werden. Auf dieſe Weiſe haben Bravais und ich an hundertundvierzig Individuen operirt, die ſich bereitwillig zu dieſer Operation hergaben. Alles kam darauf an, den Erſten zum Entſchluß zu bringen, hinterher kamen die Andern, durch den Reiz einer kleinen Belohnung angelockt, maſſenweiſe herzu.

Dieſe an einer großen Anzahl ein und derſelben Nation angehöriger Köpfe vorgenommenen Meſſungen geſtatten, die mittlere Länge eines jeden der vom Centrum des Schädels in der Peripherie desſelben auslaufenden Halbmeſſer zu nehmen; mit allen dieſen Mittelhalbmeſſern konſtruirt man dann einen fingirten Kopf, der in Wahrheit den Typus der Race darſtellen wird, weil er die mittleren Dimenſionen des Schädels, den er charakteriſirt, darbietet. Es iſt möglich, ja wahrſcheinlich, daß kein Individuum ſpeziell den Mittelſchädel ſeiner Race oder ſeiner Nation beſitzt, dieſer Mittelſchädel iſt ideal, vertritt aber nichtsdeſtoweniger den Gehirntypus der Nation oder der Race. Dieſe numeriſchen Reſultate werden fortan das Studium der Einzelſchädel erſetzen können, deren Formen und Dimenſionen nothwendig individuell ſind und keineswegs geſtatten, ſich zu allgemeinen Betrachtungen über die Geſtalt des Kopfes in den verſchiedenen Varietäten des Menſchengeſchlechts zu erheben.

Digitized by Google

Schlüsse und Hoffnungen.

Dies ist der höchst unvollständige und kurz gefaßte Abriß der in einem Zeitraum von acht Monaten von den Herren Lottin, Bravais, Lilliehöok und Siljeström ausgeführten Arbeiten Den 18. April 1839 machten sich die Herren Lottin und Lilliehöok wieder auf den Weg nach Stockholm und durcheilten im Schlitten die Hochebene von Lappland. Herr Siljeström reiste später ab und durchstreifte die norwegischen Alpen von Bossekop bis Christiania. Bravais blieb, um die Reihe meteorologischer Beobachtungen fortzusetzen und die Untersuchung der alten Meerspiegellinien zu vollenden. Endlich in den ersten Tagen des Monats September verließ er seinerseits Bossekop, um mit den Mitgliedern der Kommission, welche die Recherche noch einmal nach Norden geführt hatte, nach Frankreich zurückzukehren.

Die beiden Reisen der Korvette und der Winteraufenthalt, welcher dieselben von einander trennt, sind der erste Versuch einer wissenschaftlichen Expedition, bei der man längere Zeit in einem Lande zugebracht hat, um dasselbe von allen möglichen Gesichtspunkten aus zu studiren. Sache des wissenschaftlichen Publikums ist es, darüber zu urtheilen, ob diese Reisen denen vorzuziehen sind, wo man eine große Anzahl von Punkten berührt, ohne auf jeder Station lange zu verweilen. Denkt man hierüber nach, so wird man gewiß finden, daß die Vortheile sich gegenseitig aufwiegen und daß beide Reiseweisen von Nutzen für die verschiedenen Zweige des menschlichen Wissens in verschiedener Weise sind. Man darf also rückhaltslos König Louis Philippe loben, den Jugenderinnerungen ohnehin dazu stimmten, eine Expedition nach dem Norden Europas zu ermuntern, dem Marineminister Beifall zollen, welcher sie angeordnet hat, und Herrn Gaimard, Präsidenten der Kommission, beglückwünschen,

Digitized by Google

deſſen rührige und ausdauernde Schritte die Verwirklichung der miniſteriellen Abſichten geſichert haben. Dank ihnen hat Frankreich zuerſt eine Bahn betreten, auf der England nicht gezögert hat ihm zu folgen, indem es die Expedition des Kapitains James Roß und die Gründung zahlreicher meteorologiſcher Obſervatorien in allen Welttheilen anordnete.

Von dieſen beiden Reiſen, welche einen Zeitraum von etwa zwei Jahren umfaſſen, zurückgekehrt, empfand jedes der Mitglieder der Nordkommiſſion den Verdruß, ſo Vieles noch künftigen Forſchern zur Ausführung zu laſſen. Die Meteorologen namentlich verließen mit Bedauern eine Gegend, wo all' die Phänomene, womit ſie ſich beſchäftigen, in einem Glanze und in einer Großartigkeit auftreten, welche ſie in den gemäßigten Zonen nicht mehr darbieten. Die Nordlichter blieben trotz all' ihrer Bemühungen ein unlösbares Räthſel, das man ſich um ſo weniger unterwindet erklären zu wollen, je länger man ſie beobachtet hat. Auch gehörte die Rückkehr zum Norden zu den Wünſchen der meiſten unter ihnen. Doch ſtellen ſich einige Bedenken entgegen und verlangen geprüft zu werden. Seit der Abreiſe von Boſſekop haben die Ingenieure der Minen von Kaafjord die regelmäßige Reihe der meteorologiſchen Arbeiten ſo vollſtändig wie möglich fortgeſetzt. Man beſitzt demnach jetzt vierjährige, im Hintergrunde des Altenfjords angeſtellte Beobachtungen. Das genügt, um dies Klima beſſer zu kennen, als das der meiſten Städte im innern Frankreich. Dagegen giebt es einen andern Punkt des Erdballs, der zugleich die Aufmerkſamkeit der Gelehrten und der Seefahrer erheiſcht, nämlich die Inſel, welche Südamerika abſchließt: das Feuerland. Dort, nicht weit vom Südpol würde man die klimatiſchen Verhältniſſe des Nordens, modifizirt durch die phyſiſchen Bedingungen einer andern Halbkugel, wiederfinden. Indem man die Phänomene an und für ſich unterſuchte, würde man ſie

Digitized by Google

fortwährend mit denen der entgegengesetzten Hemisphäre vergleichen. Aus diesen wiederholten Studien, aus diesen fortwährenden Vergleichen würde neues Licht hervorbrechen, und statt sich auf eine einzelne Expedition zu beschränken, würde unser Vaterland die Ehre genießen, das begonnene Unternehmen völlig zu beenden.

Seit mehren Jahren haben die großen seefahrenden Nationen diese Bahn betreten. Die Russen, Engländer, Amerikaner errichten im ganzen Umfange ihrer Besitzungen meteorologische Observatorien. Diese Observatorien sind ständig, die Serien laufen mehre Jahre hindurch. Auf diese Weise erlangt man eine vertraute Bekanntschaft mit dem Klima und dem Einflusse desselben; man legt das vollständige Verzeichniß aller wildwachsenden Bodenprodukte an und stellt nicht mehr oft ganz unmögliche Naturalisationsversuche an. Die Kolonisten können sich mit Sicherheit in einem Lande niederlassen, das zuvor von allen Gesichtspunkten aus, welche den Erfolg einer fernen Niederlassung zu sichern vermögen, untersucht worden ist. So verdankt England seinen Missionaren unvollständige, aber hinreichende Bemerkungen über die Länder, welche es erobern will. Stets bereitet es sorgfältig die Zukunft seiner Kolonien vor. Alles ist lange vorausbedacht und weise berechnet. Ahmen wir sein Beispiel nach, ersetzen wir aber auch die kirchlichen Missionare durch Missionare der Wissenschaft. Ihr aufgeklärter Eifer wird darum nicht weniger glühend sein, und ihre genauern Angaben werden nützlicher sein. Statt die Gewissen mit Unruhe zu erfüllen, statt in der Kindheit lebenden Völkern düstere Glaubensmeinungen oder kindische Gebräuche aufzuerlegen, sollten wir ihre sittlichen und geistigen Fähigkeiten ausbilden, und je mehr ihre Bildung sich entwickelt, desto besser und folglich glücklicher werden sie werden.

Digitized by Google

Reiſe in Lappland

vom Eismeer bis zum Bottniſchen Meerbuſen.

Im Herbſt des Jahres 1839 ging der Verfaſſer der nachſtehenden Beſchreibung mit Auguſt Bravais über die Landenge, welche das Eismeer mit dem Bottniſchen Meerbuſen verbindet. Von Boſſekop bis Kareſuando reiſten ſie in Geſellſchaft mit ihren Collegen, den Herrn Gaimard, Marmier, Durocher, Anglès, Lauvergne und Giraud. Zu Kareſuando aber trennten ſie ſich von den übrigen Mitgliedern der Kommiſſion und gingen allein auf dem Muonio- und Torneo-elf bis Haparanda, einer ſchwediſchen Stadt, herunter, welche ſich dem alten Torneo gegenüber erhebt, das jetzt dem ruſſiſchen Reiche einverleibt iſt. Das Barometer in der Hand haben ſie das breite lappländiſche Plateau nivellirt und ſorgfältig die Höhengrenzen der verſchiedenen Pflanzenzonen beſtimmt. Von den Ufern des Eismeeres bis zu den nackten Spitzen des Kjölen haben ſie geſehen, wie die Flora allmälig verarmte, dann am Südabhange des Maſſivs allmälig wieder zum Vorſchein kam, je mehr ſie ſich den großen Flüſſen näherten, welche ſich in den Bottniſchen Meerbuſen ergießen.

Im Jahre 1806 hatte ein berühmter Reiſender, Leopold

Digitized by Google

von Buch*) dieſelbe Reiſeroute eingeſchlagen. Von Boſſekop bis Kautokeino ſind die Routen wahrſcheinlich dieſelben. Bei Kautokeino ſcheiden ſie ſich, um bei Palajocki, an den Ufern des Muonioelf, wieder zuſammenzutreffen; von da hat uns, wie ihn, ein und derſelbe natürliche Weg, der Lauf dieſes großen Fluſſes, zur alten Stadt Torneo geführt. Den Spuren eines ſo geſchickten Beobachters folgend, bleibt in wiſſenſchaftlicher Beziehung weiter nichts übrig, als Nachleſe zu halten, und in literariſcher Beziehung dürften ſich wohl nur wenige Schriftſteller ſchmeicheln, dem Reiz ſeines Styles und dem Kolorit ſeiner Beſchreibungen gleichzukommen. Doch verdienen unſere barometriſchen Meſſungen vielleicht mehr Vertrauen als die ſeinigen, denn wir genoſſen eines Vortheils, deſſen er zu einer Zeit beraubt war, wo die Meteorologie weniger betrieben wurde, als gegenwärtig. Tüchtige und gewiſſenhafte Beobachter, die Herren Thomas und Ihle zu Kaafjord und der Herr Paſtor Läſtadius zu Kareſuando, beobachteten dreimal täglich gute Inſtrumente, die mit den unſerigen verglichen und auf Punkten über dem Meeresſpiegel oder Höhen aufgeſtellt waren, die als hinlänglich bekannt gelten dürfen. Weniger glücklich als wir hat von Buch wahrſcheinlich in weiten Entfernungen nach Beobachtungen ſuchen müſſen, die mit den ſeinigen kombinirt werden könnten, um zur Beſtimmung der verſchiedenen Punkte ſeines Nivellements zu dienen.

In der ſchönen Jahreszeit iſt der Monat September faſt der einzige, worin man die Reiſe durch Lappland unternehmen kann. Vom 20. November bis 20. April läßt ſich die Reiſe auf einem mit Renthieren beſpannten Schlitten machen, ſie bietet dann weiter keine Beſchwerden, als die Strenge der Kälte, den Widerſchein des Schnees ſowie die Ermüdung des Schlit-

*) Reiſe durch Norwegen und Lappland. 1810.

Digitized by Google

tenfahrens, welche für den dieſer beſchwerlichen Beförderungsweiſe ungewohnten Reiſenden groß iſt. Im Frühjahr vereitelt das Schmelzen des Schnees jeden Verſuch. Im Juli und Auguſt iſt der Schnee größtentheils geſchmolzen, der ſumpfige Boden Lapplands aber iſt noch von Waſſer getränkt und Wolken von Schnaken fallen wüthend über die unglücklichen Reiſenden her. Die, welche dieſe beiden Monate wählten, haben faſt ſämmtlich ihre Verwegenheit bereut, ſo die Herren Sibuet und de Beaumont. Im Oktober iſt es zu ſpät, der Schnee fängt an liegen zu bleiben, und wenn er zu reichlich fällt, ſo kann er das Leben der Pferde gefährden, indem er die Weideplätze, wo ſie ihre Nahrung finden, vollſtändig bedeckt.

Am 6. September 1839 verließen wir Boſſekop. Bravais, der eben erſt dreizehn Monate hintereinander in dieſem einſamen Diſtrikt zugebracht hatte, war kaum von den Folgen eines ſchmerzhaften Knieleidens hergeſtellt, zum Glück bedachte ihn das Loos mit einem vortrefflichen Pferde, geduldig, muthig und abgehärtet gegen Beſchwerden. An ſchlimmen Stellen behutſam, ſchien es ſeine ganze Kühnheit für die Schneeſtürze, denen wir auf unſerem Marſche begegneten, aufzuſparen; den Abhang am ſteilſten Punkte hinanſetzend, klomm es ſchnell empor und ſuchte eine Ehre darin, immer an der Spitze des Zuges zu bleiben. Ein Fall hätte für ſeinen Reiter verhängnißvoll werden und ſeine Schmerzen erneuern können, nie aber trat es fehl, ſelbſt beim Zurücklegen der bodenloſen Torfmoore nicht, denen man in Lappland ſo häufig begegnet. Es iſt nicht unſere Abſicht, hier die geſchichtlichen Einzelheiten der Reiſe unſerer Karawane zu geben, ſondern wir werden nur bei unſern eigenen Beobachtungen verweilen, welche faſt ſämmtlich die phyſikaliſchen und Naturwiſſenſchaften betreffen.

Den 6. September Abends übernachteten wir in Eiby (Aiby auf der Karte des Kapitains Rooſen) an den Ufern des Altenelf,

Digitized by Google

um daselbst zu übernachten. Die Straße, welche nach Eiby führt, entfernt sich nur wenig von den sandigen Ufern des Flusses und durchschneidet schöne Wälder von Kiefern (Pinus sylvestris), Birken (Betula alba),*) Ellern (Alnus incana, β virescens, Wahlenb.). vermischt mit verkrüppelten Sträuchern des gemeinen Wachholders, des rothen Johannisbeerbusches, des Rubus arcticus und der Tamarix germanica. Die Birken sind meist 15 Meter hoch, und unter den Kiefern erreichen einige 20 Meter Höhe. Eiby selbst liegt in einem Grunde fast in einer Linie mit den Gewässern des Altenelf und ist von schönen Bäumen umgeben, in deren Mitte man eine ziemlich breite Lichtung gehauen hat. Das Thal, fast von allen Seiten geschlossen, wird durch sandige und waldige Terrassen beherrscht, welche sich etwa dreißig Meter über den Alluvialboden des Thales erheben. Der Einfluß dieses Schutzes zeigt sich im Habitus der Birken. Sie haben nicht mehr jenes steife Aussehen, jene starren und aufwärts gerichteten Zweige der Birken, welche die Seegestade und die Umgegend von Hammerfest bewohnen. Der Baum hat wieder einen Theil seiner südlichen Grazie angenommen, der Stamm schießt schlank in die Höhe, und die äußerst biegsamen Zweige fallen zur Erde nieder und wiegen sich im Winde. Die Hauptursache dieser Unterschiede im Aussehen derselben ist folgende: Mit wiederkehrendem Frühling, wenn die Birke von der bleichen Sonne Lapplands nur ungenügende Wärme empfängt, treiben ihre Knospen nur dicke und kurze Zweige, welche an ihrer Spitze vier bis sechs rosettenförmig gestellte Blätter tragen. Ist der

*) Einige Botaniker, Herr Grisebach u. A., führen die gemeine Birke Norwegens auf Betula pubescens Ehrh. (Betula carpatica Willd.) zurück, die sie als eine bestimmte Art der Betula alba L. betrachten. Unsere Proben passen allerdings zu B. pubescens Ehrh. Allein, dem Beispiele von Linné, Wahlenberg, Fries, Hartmann, Blytt und Spach folgend, der sich zuletzt mit der Gattung Betula beschäftigt hat, betrachten wir diese angebliche Art als eine einfache Abart der gemeinen Birke.

Digitized by Google

dann folgende Sommer kalt und feucht, ſo erreicht der jährliche Trieb nur einige Millimeter Länge, doch iſt der Durchmeſſer deſſelben beträchtlich. An dieſen verkrüppelten Aeſten zeigen ſich deutlich die Spiralen mit zwei bis drei Parallelen genau wie bei einem Farnrhizom. Dieſe Zweige ſind ſtets ſtarr und gen Himmel gerichtet. Es trete aber einmal ein wärmerer Sommer als gewöhnlich ein, ſo ſtreckt ſich der Zweig, dünner werdend, länger hinaus, die Blätter entfernen ſich von einander und der zarte und ſchwanke Aſt neigt ſich wie bei den Birken unſerer Klimate zu Boden. Zuweilen bietet ein und derſelbe Zweig das eine wie das andere Ausſehen dar in der Weiſe, daß er von Punkt zu Punkt knotig erſcheint.

Den 7. September brachen wir gegen elf und ein halb Uhr Morgens von Eiby auf und machten uns ohne Verweilen an die Beſteigung der Kjölenkette. Mittags traten wir aus einer ſumpfigen Waldung heraus; doch erhebt ſich die Baumvegetation noch höher. Um zwei und dreiviertel Uhr langten wir bei den letzten Kiefern an; die Grenze derſelben befindet ſich 249 Meter über dem Meere. Um drei und ein halb Uhr waren wir bei einer Höhe angelangt, wo die Birke in zuſammenhängender Weiſe zu wachſen aufhört, d. h. bei 380 Metern; in dieſer Höhe verkrüppeln die zerſtreuten Birken allmälig und verſchwinden gänzlich über 432 Metern.

Die Höhengrenze der Birken iſt im Allgemeinen leichter als die der Fichten zu beſtimmen, ſie bildet am Abhange der Gebirge eine beſtimmte und deutlich gezogene Linie. In Betreff der Kiefern verhält es ſich anders, dieſe Bäume wachſen maſſenweiſe und erheben ſich nur wenig am Abhange der Gebirge, die vereinzelten Individuen aber ſteigen viel höher hinan. So hat Bravais eine kleine vereinzelte Kiefer von ſechs Dezimeter Höhe am nördlichen Gehänge des Storvandsfield in einer Höhe von etwa 500 Metern angetroffen.

Um fünf Uhr überſchritten wir das nördlichſte Kettenglied des

Digitized by Google

Kjölen, welches 558 Meter hoch ist, worauf wir in das Thal des Karajocki, ein Seitenthal desjenigen des Altenelf, hinabstiegen. Am Südabhange dieses Kettengliedes steigen die Birken sehr hoch in die Höhe; die ersten trafen wir um fünf und ein halb Uhr an, sie waren von 534 Meter an sehr verkrüppelt und standen an geschützten Stellen. Neben diesen Birken fanden sich geschliffene und gereifelte Blöcke, ähnlich denen, welche man auf dem Kongshavnsfield antrifft, wir hatten aber keine Zeit, sie aufmerksam zu untersuchen. Um sechs und ein halb Uhr hatten wir den Ort erreicht, wo wir die Nacht zubringen sollten. Es ist dies eine von zwei Armen des Karajocki umgebene Insel, ihr Boden liegt 423 Meter über dem Meere. Es ist klar, daß dies der Rastplatz war, wo von Buch den 4. September 1806 übernachtete. *) Er weist ihm 467 Meter Höhe an. Die Insel ist sehr grün und bietet reichliches Futter für die Pferde dar, sie ist mit Birken und Weiden bedeckt. Die Temperatur dieser Gegend ist niedrig, selbst im Sommer, denn die Insel wird von einer Masse Schnee beherrscht, der auf einem nordöstlich gerichteten Abhange liegt und nie gänzlich verschwindet. Unser Führer hat ihn seit dreißig Jahren, in denen er die Berge durchstreift, stets gesehen.

Folgenden Tags, den 8. September, brachen wir um sechs und ein halb Uhr Morgens auf. Den Rastplatz verlassend, begannen wir sogleich, nachdem wir den Fluß passirt hatten, anzusteigen. Ein prickelnder Nebel umgab uns von allen Seiten, bald aber ließen wir ihn hinter uns, worauf wir die Sonne hell über unsern Köpfen glänzen sahen. Der weiße Regenbogen zeichnete sich auf dem Nebel in sehr schwacher Entfernung von uns der Sonne gegenüber ab; sehr interessant wäre es gewesen, den Durchmesser desselben zu messen, allein der schnelle Marsch der Karawane gestattete dies nicht.

*) Reise durch Norwegen und Lappland. Bd. II., S. 142.

Digitized by Google

Sobald man die Thalſohle verlaſſen hat, verliert man die Birken aus dem Geſicht, welche an dem Nordabhange der zweiten Kette, die wir in Begriff waren zu überſchreiten, nicht emporſteigen. Der Gipfel dieſes Maſſivs iſt ein ſehr breites Plateau, Nuppivara genannt, deſſen erſte Stufen, welche wir gegen acht Uhr erreichten, bei 600 Meter über dem Meere liegen.

Nichts vermag eine Vorſtellung von dem öden und doch großartigen Anblick dieſer Hochebene zu geben. Die breiten wellenförmigen Erhebungen des Terrains folgen ſich unabſehbar ſtets in derſelben Art. Selten unterbricht ein Fels mit ſchroffen Formen, die allgemeine Bodenfläche überragend, auf Augenblicke die Einförmigkeit der Landſchaft. Ueberall iſt der Fels nackt, nur hier und da verſtecken ſich verkrüppelte Büſche der Zwergbirke und einige noch niedrigere Gewächſe*) in den Bodenfalten, wo ſie geſchützt ſind gegen die eiſigen Winde, welche ſich auf dieſen entblößten Flächen frei umhertummeln. Einſame Seen ſchlummern in den großen Bodenſenken. Die einen, von ungeheurer Ausdehnung, tragen noch zur Einförmigkeit dieſes Anblicks bei. Die andern, kleiner, vermögen ihn nicht zu beleben, denn kein Baum, kein Kraut badet ſeine Wurzeln in ihren gelblichen Gewäſſern, kein Weichthier kriecht an ihren nackten Geſtaden, kein Vogel beſtreicht mit ſchnellem Fittich ihre Oberfläche, nur ihre Tiefen ſind von zahlreichen Fiſchen bewohnt, zu deren Fange die Lappen im Herbſt hierher kommen. Während des Sommers ſteigen Myriaden von Schnaken aus dieſen Seen auf und verbieten dem Reiſenden die Wanderung über dieſes Plateau. Im Winter gefriert Alles, und acht Monate lang verſchwinden Erde und Waſſer unter einem Leichentuch von Schnee. Das Gefühl der Einſamkeit und Verlaſſenheit beſchleicht den Reiſenden, welcher dieſe Wüſten des Nordens

*) Empetrum nigrum, Lychnis alpina, Andromeda tetragona, Poa alpina.

Digitized by Google

durchzieht. Nichts um ihn her lebt, Alles iſt ſtill und todt.*) Stets im Mittelpunkt einer Landſchaft, die ſich nicht verändert, ſtets in derſelben Richtung die Schneekuppen der fernen im Weſten ſich verlierenden Lyngenkette vor ſich, möchte er faſt glauben, er komme nicht vom Fleck, ſondern drehe ſich unaufhörlich in einem magiſchen Kreiſe.

Der Wappus oder lappländiſche Führer jedoch leitete uns in dieſen Einöden ohne Zaudern. Nichts vermochte ſeinen gleichförmigen Gang zu beſchleunigen, zu verzögern. In gleichmäßigem Schritt betrat er die Torfmoore und ſtieg er die ſteilſten Abhänge hinan, oft erſchien er uns oben auf einer Anhöhe, ſich mit ſeinem langen Stabe auf der Schulter gegen den Himmel abhebend, als der Führer und Befehlshaber, von dem das Heil unſerer Karawane abhing. Kein Ereigniß brachte Abwechslung in die Monotonie dieſes Tagemarſches, nur Tauſende von Lemmings, durch das Getrappel unſerer Pferde aufgeſchreckt, liefen hin und wieder, und zwei wilde Renthiere verſchwanden, nachdem ſie uns ein paar Sekunden erſtaunt betrachtet hatten, am Horizont wie ein phantaſtiſches Wild.

Gegen vier und ein halb Uhr begannen wir abwärts zu ſteigen, aber auf wenig geneigten Abhängen. Um ſieben Uhr waren wir auf einem Plateau, welches das öſtliche Ufer eines großen Sees, von den Lappen Töro genannt, begrenzt, deſſen Länge etwa einen Myriameter beträgt. Das Barometer zeigte 687 Meter Erhebung. Um ſieben und ein halb Uhr ſtießen wir auf die erſten Weiden (Salix Lapponum L.), mit dem gemeinen Wachholder bunt durcheinander wachſend. Ein wenig unterhalb fanden ſich ſumpfige Weidenplätze. Es wäre unmöglich geweſen, zwiſchen dieſem und dem vorigen Punkte einen Ort zu finden, wo wir Feuer hätten anzünden und unſere Pferde gra-

*) Siehe von Buch's Reiſe. Bd. II. S. 114.

Digitized by Google

sen lassen können. Dieser Rastplatz ist Lipsakoppi, 610 Meter über dem Meeresspiegel.

Es ist schwer, in diesem Töröjee nicht den von Buch unter dem Namen Zhjolmijaure bezeichneten wieder zu erkennen; der gelehrte Reisende giebt ihm die längliche Form, welche wir beschrieben haben, dieselbe Länge und eine Höhe von 682 Meter.*) Der Fluß, welcher an unserm Lager vorbeifloß, war sicherlich der Lipsajocki oder wenigstens einer seiner Zuflüsse; an seinem Ufer erhob sich die lappländische Weide bis zu zwei Meter Höhe.

Nachdem wir folgenden Tags um acht Uhr Morgens aufgebrochen waren, folgten wir zuerst den Windungen eines wasserarmen kleinen Thales, das ein ehemaliges Flußbett zu sein scheint, wiewohl man daselbst keine Rollkiesel antrifft. Der Wechsel von ein- und ausspringenden Winkeln an seinen Ufern ist sehr regelmäßig. Um acht Uhr und einige Minuten sahen wir den Wachholder wieder zum Vorschein kommen, um zehn und ein halb Uhr waren wir am rechten Ufer eines der Zuflüsse des Lipsajocki, das Vottajocki. Die Rast, welche wir an seinen Ufern hielten, ist von Herrn Lauvergne abgebildet worden. An den Ufern des Flusses hat die Salix Lapponum 3 Meter Höhe. Diese Weide liebt merkwürdig die fließenden Gewässer; es ist eine von den Pflanzen, welche sich an den Gebirgen erheben, indem sie dem Laufe der Bergbäche aufwärts folgen, während andere es vorziehen, die Felsenkämme zu erklimmen, welche den Gipfel der Gebirge mit ihrer Basis verbinden. Wir befanden uns damals 531 Meter über dem Meere, und die Birken hatten sich noch nicht wieder gezeigt.

Bald nach Mittag verließen wir unsern angenehmen Halteplatz am linken Ufer des Vottajocki, der nun betretene Distrikt

*) Siehe a. a. O. Bd. II. S. 154.

Digitized by Google

ward weniger uneben. Um ein und dreiviertel Uhr sahen wir die Birken wieder auf dem leicht nach Süden geneigten Abhange eines großen Plateaus zum Vorschein kommen, 477 Meter über dem Meere hörten sie plötzlich auf. Diese Höhenbestimmung scheint uns ziemlich genau zu sein. Kein örtlicher Schutz oder Einfluß hat hier die natürliche Grenze dieser Bäume zu verändern vermocht, das Plateau, wo sie wachsen, ist gänzlich offen, und eine ziemlich bedeutende Anzahl derselben war abgestorben oder zerschmettert. Wahrscheinlich sind es Kälte und Wind, welche ihr Wachsthum hier begrenzen. Anfangs verkrüppelt und kaum die Höhe von einem Meter erreichend, sieht man sie schnell an Größe zunehmen, je mehr man fortfährt, gen Süden herabzusteigen. Eine Stunde weiter in einer Höhe von 447 Meter sind diese selben Birken bereits 5 Meter hoch. Es ist sehr wahrscheinlich, daß die fortgeschrittensten Bäume dazu dienen, die andern gegen den Nordwind zu schützen, und daß die Birken der höchsten Zone zu einer bei weitem größern Entwickelung gelangen würden, wenn sie geschützt wären. In dieser selben Höhe (447 Meter) trafen wir den ersten Stamm eines Vogelbeerbaums an.

Von Buch weist der Grenze der Birken an dieser Stelle 504 Meter an.*) Dieser Unterschied kann von den Irrungen im Messen herrühren, doch wäre es möglich, daß Buch die Grenze bei irgend einem geschützten Stamme bemerkt hätte.

Um sechs und einviertel Uhr machten wir Halt und schlugen unser Zelt für die Nacht unter großen Birken und in angenehmer Lage bei dem Ufer eines kleinen Flusses auf, der wahrscheinlich der Lipsajocki ist. Unser Führer bezeichnete diesen Ort mit dem Namen Judsövuomi. Drei Beobachtungen liefern uns 391 Meter für die Höhe dieses Punktes.

*) Siehe a. a. O. Bd. II. S. 167.

Digitized by Google

Während dieser beiden Reisetage wurden wir von zahllosen Legionen Lemmings (Mus lemmus L.), welche nach Süden zogen, begleitet. Unterhalb der Birkengrenze nahm ihre Zahl ein wenig ab. Sehr gewöhnlich auf den Hochebenen, an trockenen und dürren Stellen, waren sie seltener in den Gründen und an sumpfigen Orten, und liefen mit großer Schnelligkeit hin und wieder. Verfolgt, versteckten sie sich unter den Gruppen der Zwergbirke, oder suchten sich zu vertheidigen. Als wir die Spitze des Zuges bei den Stromschnellen von Eyenpaika auf dem Muonioflusse erreicht hatten, erkannten wir deutlich, daß sie alle in derselben Richtung zogen. Schon vor längerer Zeit habe ich die Beobachtungen, welche wir über diese Thiere anstellten, veröffentlicht.*)

Den 10. September um fünf und einviertel Uhr Morgens setzten wir über den Fluß, an dessen Ufer wir unser Zelt aufgeschlagen hatten, und die gewöhnliche Route verlassend, steuerten wir auf einen in der Nähe liegenden Hügel zu, wo wir eine scharf gezogene Grenze der Betula alba bemerkten. Der Gipfel bildet ein offenes, in der Richtung von N.N.W. nach S.S.O. verlängertes Plateau; wir hingen unsern Barometer an einen einzeln stehenden Baum, 30 Meter etwa über der Grenze der in geschlossenen Beständen wachsenden Birken auf. Auf diese Weise fanden wir, daß das einzeln stehende Individuum sich 508 Meter und die allgemeine Grenze auf der S.W.Seite des Berges 480 Meter über dem Meere befand, eine Bestimmung, die mit der vom vorigen Tage übereinstimmte. Auf dieser Grenze erreichen die Birken noch 2 bis 3 Meter Höhe. Auf dem übrigens sehr dürren Plateau wuchsen Salix Lapponum, Betula nana, Empetrum nigrum. Dieser etwa 520 Meter hohe Berg ist wahrscheinlich der Lilla Lipza auf Buch's Karte.

*) Siehe die Revue zoologique, redigée par M. Guérin-Méneville, juillet 1840.

Digitized by Google

Nach Jubsövuomi zurückgekehrt, trafen wir daselbst die übrigen Mitglieder der Kommission an und verließen unser Lager gegen acht Uhr Morgens. Wir setzten im Nachen über den Siaberdajocki; es ist dies der beträchtlichste Zufluß des Altenelf. Buch war genöthigt, ihn mit großer Mühe zu durchwaten. Im Frühling muß der Uebergang über diesen Fluß sehr schwierig sein. Denselben Tag um drei und einhalb Uhr erreichten wir Kautokeino, ein bedeutendes Dorf des norwegischen Lappland. Wir richteten uns im Hause des Prästgaard ein, der damals völlig leer stand, denn der Pfarrer hält sich nur im Winter daselbst auf. Unser Barometer ward im Erdgeschosse in demselben Saale aufgestellt, wo Herr Lottin vor einigen Monaten sich aufgehalten hatte. Unsere meteorologischen Beobachtungen umfassen den 11., 12., 13. und 14. September 1839. Verbunden mit denen des Herrn Lottin, weisen sie dem Erdgeschoß des Prästgaard von Kautokeino eine Höhe von 301 Meter über dem Meere an.*) Die Gewässer des Alten liegen etwa 295 Meter hoch. Das Pfarrhaus ist das bemerkenswertheste Gebäude des ganzen Dorfes; letzteres wird bewohnt von Finnländern oder Finnen und von Lappen, von denen die einen ansässig sind, die andern ein Nomadenleben führen und nur hierher kommen, um den Winter über zu bleiben. Die Wohnungen liegen zerstreut inmitten großer Wiesen, ein Theil derselben ist auf das linke Ufer des Flusses gebaut, der Prästgaard aber und die Kirche nehmen das andere Ufer ein. Auf einer Anhöhe fanden wir einen Brunnen in den Sand gegraben, er hatte $5_{,75}$ M. Tiefe im Ganzen, die des Wassers betrug $1_{,80}$ M. Die Wände des Brunnens waren mit einer Eisschicht von 2 Meter Höhe, von der Wasserfläche an gerechnet, bedeckt. Dieses Eis mußte sich den ganzen Sommer über gehalten

*) Buch hatte (Bd. II. S. 183) 255 Meter gefunden.

Digitized by Google

haben, und dieser eine Umstand genügt, um eine Vorstellung von der Strenge des Klimas zu geben.

Ohne die starre Winterkälte würde Kautokeino ein keineswegs unangenehmer Aufenthaltsort sein. Die Oertlichkeit ist sehr offen und von kleinen Plateaus umgeben, deren sanfter Abhang dem Flusse zugekehrt ist. Dieser wird von sandigem Terrain eingefaßt, dessen oberes Niveau 20 Meter über dem Flusse liegt. Der Anblick des Himmels ist vollkommen frei, die Gebirge nehmen die letzten Flächen des Horizonts ein. Dieser Ort würde demnach äußerst günstig für astronomische Beobachtungen sein und eine vortreffliche Station bilden, um Messungen über die Höhe der Nordlichter anzustellen, Messungen, die solchen entsprächen, welche andere Beobachter gleichzeitig zu Bossekop anstellen würden. Die Linie, welche beide Stationen mit einander verbindet, bildet einen sehr spitzen Winkel mit dem magnetischen Meridian. Man hat nämlich:

Prästgaard von Kautokeino:

Breite = 69° 0′ 34″ n. Länge = 20° 59′ 51″ ö.

Bossekop, Haus des Herrn Klerck:

Breite = 69° 58′ 0″ n. Länge = 21° 4′ 15″ ö.

Demnach würde das Azimuth der nördlichen Station 1° 30′ ö. in Bezug auf die Südstation sein, und der beiden Stationen gemeinsame Vertikalkreis mit der Ebene des magnetischen Meridians einen Winkel von 12° bilden; der Bogen, welcher beide Stationen mit einander verbindet, würde eine Länge von 167 Kilometer besitzen. Diese Umstände würden der Bestimmung der Parallaxe der Nordlichter sehr günstig sein. Die Meeresnebel können nur schwer diesen Abstand erreichen, und der Himmel muß im Ganzen klar sein.

Man trifft auf dem an die Kirche stoßenden Friedhofe sowie auf den benachbarten Höhen einige schöne Birken an, Kiefern aber bekommt man daselbst nicht zu Gesicht, doch kam

Digitized by Google

dieſer Baum vor nicht ganz hundert Jahren in der Umgegend von Kautokeino vor. Das Vorkommen der Kiefer in dieſer Höhe (320 Meter) iſt nichts Außerordentliches, weil ſie bei Karajocki, Kalanito und Suvajervi noch höher anſteigt. Wenn ſie gegenwärtig alſo nicht mehr zu Kautokeino wächſt, ſo kommt dies daher, daß die Einwohner ſie haben verſchwinden laſſen, indem ſie die Stämme zum Bauen ihrer Häuſer verwandten. Nun weiß man, daß die Wälder, einmal ausgerottet, ſich in vielen Ländern nicht wieder erzeugen. Die verſchiedenen Arten von Vaccinium (V. myrtillus, V. vitis idaea, V. uliginosum) und von Arbutus (A. alpina, A. uva ursi) ſind um Kautokeino reichlich vorhanden, allein ihre Beeren waren kaum reif. Zwei Gräſer, Feſtuca ovina und Aira flexuosa erreichen auf den feuchten Sandbänken des Altenelf eine rieſige Höhe. Unter den Vögeln kommt eine ziemlich ſeltene Eule, Strix kaparakok, in der Umgegend häufig vor.

Am 13. Abends genoſſen wir den ſchönen Anblick eines Nordlichts an einem leider ſehr bewölkten Himmel, während der Nacht fiel das Thermometer auf — 5 Grade.

Wir verließen Kautokeino den 14. September um zwölf und einhalb Uhr, indem wir unſere Schritte Karesuando zulenkten, und erreichten um fünfundeinviertel Uhr die finniſche Niederlaſſung Kalanito, nachdem wir zwei kleine Flüſſe, den Everijocki und Akijocki überſchritten hatten. Man kann den Fluß aufwärts von Kautokeino bis Kalanito im Nachen befahren. Ein Theil der Mitglieder der Kommiſſion folgte dieſem Wege und langte eine halbe Stunde vor dem Haupttrupp der Karawane an, der den Landweg eingeſchlagen hatte. Die Umgegend von Kalanito iſt ziemlich waldig; unter den Birken und Weiden, welche eine ziemliche Höhe (10 Meter etwa) erreichen, ſieht man mehrere intereſſante Arten wachſen, wie Polemonium caeruleum L., Geranium sylvaticum L., Veronica longifolia

Digitized by Google

L., var. γ incisa Hartm., Carduus heterophyllus L., Galium uliginosum L., Alopecurus fulvus Sm., Calamogrostis phragmitoides Hartm., Triticum repens L. ſowie einige andere dieſen eiſigen Gegenden eigenthümliche Pflanzen. Die Ebene, welche ſich vor der Niederlaſſung ausbreitet, liegt 307 Meter über dem Meere.

Zwiſchen Kautokeino und Kalanito bietet der Boden ſanfte wellenförmige Erhebungen und an vielen Stellen große kegelförmige Vertiefungen dar, welche durch kleine Erhöhungen in Form länglicher Dome von einander getrennt werden. Waſſer findet man auf dem Grunde dieſer natürlichen Trichter nicht. Die Renthierflechte (Cenomyce rangiferina Achar.) bedeckt den Boden und ſchließt faſt jede andere Kräutervegetation aus. Die gelbe Farbe derſelben verleiht der Landſchaft ein ganz eigenthümliches Ausſehen, als wäre die Erde mit Schwefel beſtreut, und die kegelförmigen Trichter, von denen man umgeben iſt, tragen zur Unterhaltung der Täuſchung bei. Die Renthierflechte bildet die Hauptnahrung dieſer Thiere während des Winters. Im Sommer weiden ſie das Gras und die Blätter der Bäume ab, wie die Wiederkäuer unſerer Klimate. Die Flechte iſt nur im Winter eßbar, wenn ein längeres Verweilen unter dem Schnee ihre Ausbreitungen erweicht hat, welche im Sommer hart und lederartig ſind. Natur und Farbe des Bodens in dem Diſtrikt, von dem die Rede geweſen, erklären die wahrſcheinlich übertriebenen Berichte über die unerträgliche Hitze, von der mehre Reiſende beim Bereiſen Lapplands zu leiden gehabt haben. Es iſt begreiflich, daß die fortwährende Wirkung der Strahlen einer Sonne, die nicht untergeht, endlich die ausgedörrten Flechten, welche den Boden bedecken, mächtig erhitzen und auf die mit ihnen in Verbindung ſtehende Luftſchicht zurückwirken muß. Nimmt man dazu die Rückwerfung der Sonnenſtrahlen von den zahlreichen Falten des Terrains, ſo begreift man, wie es möglich

Digitized by Google

gewesen, in Lappland eine fast eben so starke Hitze, wie in den Wüsten Afrikas zu erleiden.

Den 15. September um sechs und einhalb Uhr Morgens verließen wir Kalanito und folgten dem rechten Ufer des Altenelf. Am Tage zuvor hatten wir das linke Ufer verlassen und den Fluß vor Kalanito durchwatet. Während der Nacht war Schnee gefallen, und lag mehrere Centimeter hoch um uns her; Abends aber war er beinahe gänzlich geschmolzen.

In einer Höhe von 341 Meter über dem Meere sahen wir die Kiefern wieder zum Vorschein kommen, ihre Höhengrenze ist hier weit auffallender als im Altendistrikt. Allerdings waren sie verkrüppelt, doch war ihre Erscheinung an den nach Westen gekehrten Abhängen in eben dieser Höhe bei weitem schöner. Gegen neun Uhr bestimmten wir eine andere Grenze auf einem kleinen Plateau von 374 Meter Höhe; wir bemerkten, daß die nach Osten gekehrten Abhänge keinen einzigen Stamm dieser kostbaren Bäume darboten, während die des Plateaus nahe an 5 Meter Höhe maßen. Um zwölf und ein halb Uhr setzten wir über einen kleinen Fluß Namens Snobadusjocki, an dessen Ufern wir einige Zeit verweilten. Es ist einer der Zuflüsse des Altenelf, von dem wir bei Kalanito Abschied genommen hatten; er fließt von S.O. nach N.W. Wir befanden uns daselbst 451 Meter über dem Meeresspiegel und hatten den Altenelf zu unserer Rechten; die Quellen des letztern Flusses liegen gegen Westen, 6 Myriameter etwa von unserer Station Suvajervi. Von Kalanito ab ist das Land im Allgemeinen flach oder einfach gewellt; das durchschnittliche Niveau desselben erhebt sich nicht über 470 Meter, die Gewässer fließen nach Norden. Die Seen sind zahlreich, aber von geringer Ausdehnung, das sie umgebende Terrain ist oft weit niedriger, als der Spiegel ihrer Gewässer, allein kleine Torfpolster, von Weiden eingefaßt, widersetzen sich dem Abfluß derselben. Indem sie

Digitized by Google

das Wachsthum der Mooſe, die Torfbildung, die Entwickelung und das Verwachſen der Wurzeln von Weiden, Binſen und Riedgräſern begünſtigen, tragen dieſe ſtehenden Gewäſſer ſelbſt zur Erhöhung des Dammes bei, welcher die Beſtändigkeit ihres Niveaus erhält. Die Ingenieure dürften nützliche Fingerzeige im Studium dieſer natürlichen Eindämmungen finden. Trotz dieſer eigenthümlichen Anordnung beſitzen dieſe Seen einen, allerdings ſehr langſamen, Abfluß. Die Zuflüſſe bieten wahrſcheinlich ähnliche, ſtufenweis übereinander liegende und eben ſo viel Mühlgerinne und Schleuſeneinſätze bildende Einzapfungen dar, die ſämmtlich auf Koſten der Natur entſtanden ſind.

Am Abend überſchritten wir die Waſſerſcheidungslinie der beiden Meere und erklommen die letzte Kette, welche uns von dem großen Thale des Muonioelf trennte. Dieſe Kette iſt niedrig (etwa 550 Meter hoch) und bietet keinen ſonderlich hervorragenden Punkt dar, wie bereits Buch bemerkt hat, deſſen Route unter dieſer Breite übrigens öſtlicher als die unſerige war. Der höchſte Punkt des Paſſes, den wir zurücklegten, liegt 532 Meter über dem Meere. Die Kiefer war vollſtändig verſchwunden, als Entſchädigung erlangten wir einige Höhengrenzen von Birken. So trafen wir gegen zwei und dreiviertel Uhr dieſe Bäume 433 Meter hoch auf einem Plateau an, wo ſie vollſtändig verkrüppelt waren. Auf einem benachbarten, nach Oſten gekehrten Hügel erreichen ſie 520 Meter, auf einem kleinen an die Nordſeite eines Hügels angelehnten Plateau 498 Meter, und bei der Richtung nach S.W. reichten die verkrüppelten Birken bis zu 530 Meter hinauf. Am ſelben Ort und am ſelben Abhang erreicht der Vogelbeerbaum eine Höhe von 474 Meter. Man ſieht, daß die Grenze der Sorbus aucuparia 40 bis 50 Meter niedriger als die der Birke iſt. Dort überzog die Cenomyce rangiferina abermals den Boden vollſtändig, kaum dem Empetrum nigrum und einigen Arbutus Platz laſ-

Digitized by Google

ſend. Von Buch hatte bereits feſtgeſtellt, daß dieſe Flechte am häufigſten zwiſchen den Grenzen der Kiefer und der Birke (350 bis 500 Meter) iſt.*)

Um ſieben Uhr Abends erreichten wir Suvajervi, wir hatten damit ruſſiſches Gebiet betreten. Suvajervi iſt weiter nichts, als eine elende von zwei angeſeſſenen Lappen bewohnte und am Ufer des Sees gleichen Namens gelegene Hütte, deren Höhe unſere Beobachtungen auf 409 Meter feſtſetzen. Dieſer See iſt ziemlich groß und mag einen halben Myriameter lang ſein, er iſt fiſchreich, und ſein lappländiſcher Name zeigt an, daß er eine beträchtliche Tiefe beſitzt. Seine Ufer ſind übrigens ſehr dürr.

Den 16. September um zwölf und ein halb Uhr verließen wir die lappländiſche Hütte von Suvajervi, und indem wir durch einen immer weniger bergigen Diſtrikt zogen, erreichten wir Kareſuando gegen ſieben Uhr Abends. Ein ziemlich ſchlichter Abhang führt von der erſten zur zweiten dieſer Stationen. Um zwei und ein halb Uhr zeigten ſich die Kiefern wieder; auf einer nach W.S.W. geneigten Abbachung ſtiegen ſie bis zu 410 Meter hinauf. Dieſe Kiefern waren bereits hoch gewachſen, denn ſie erreichten 10 Meter. Etwas weiter ſahen wir ſie am ſelben Abhange in einer Höhe, welche wir etwa 60 Meter höher als die erſtern ſchätzten. Dieſe Zahlen ſtimmen mit denen Leopold von Buch's, welcher unter derſelben Breite, aber einige Myriameter weiter öſtlich, dieſe Grenze bei 405 Meter befunden hat. Bei ihrem nächſten Auftreten geſellen ſich die Kiefern ſofort zu großen Wäldern zuſammen, welche ohne Unterbrechung bis zum Bottniſchen Meerbuſen herrſchen.**)

*) Reiſe durch Norwegen und Lappland. Bd. II. S. 212.

**) Außer den bereits genannten Pflanzen haben wir auf dem lappländiſchen Hochlande noch mehre andere intereſſante Arten gefunden, z. B. Barbarea recta Fr., Angelica sylvestris L., Epilobium alpinum L., Saussurea alpina DC., Veronica alpina L., Salix phylicifolia L., Eriophorum angustifolium Sm., Arundo stricta Tim. u. A. lapponica Wahlenb.

Digitized by Google

In Karesuando richteten wir uns beim Paſtor Läſtadius ein, der zu wiederholten Malen die Güte gehabt hatte, an den Arbeiten der Kommiſſion Theil zu nehmen. Unſere erſte Sorge war, unſere beiden Barometer mit dem Barometer Nr. 8 von Ernſt zu vergleichen, welches ihm die franzöſiſche Regierung zur Verfügung geſtellt hatte, um ſeine meteorologiſchen Unterſuchungen zu erleichtern. Wir beſtimmten demnach die konſtante Korrektion, welcher die Leſungen dieſes Barometers unterliegen mußten, um den wahren Druck der Atmoſphäre zu ergeben. Dieſe Korrektion wurde als ein Mehr von und $= + 0_{/64}$ M. befunden, vermöge eines Mittels von ſechs Meſſungen, angeſtellt mit jedem der Barometer No. 23 und No. 43 von Ernſt, welche wir bei uns trugen. Das Barometer No. 8 iſt im Erdgeſchoſſe des Präſtgaard, $0_{/8}$ M. über dem Fußboden aufgeſtellt. Die Berechnung ergiebt 324 Meter für die Höhe des Gefäßes über dem Meere. Noch genauer wird man dieſes Niveau beſtimmen können, wenn man damit die Geſammtheit der zu Kaafjord von den Herren Minen-Ingenieuren und zu Karesuando von Herrn Läſtadius ſeit dem 1. Mai 1838 angeſtellten regelmäßigen Beobachtungen vergleicht. Die erlangte Zahl nähert ſich aber jedenfalls ſehr der Wahrheit. Vor dem Hauſe des Pfarrers iſt das Niveau des Muonioelf 319 Meter über dem Spiegel des Ozeans erhaben.

Karesuando iſt für das ſchwediſche Lappland, was Kautokeino für das norwegiſche Lappland; es iſt der Mittelpunkt des Diſtrikts, es befindet ſich daſelbſt ein Präſtgaard und ein Thing oder Stadthaus. Die Kirche befand ſich ehemals zu Enontekis; allein ſeit das Dorf ruſſiſch geworden, iſt ſie, nicht Stein für Stein, ſondern Balken für Balken und Brett für Brett auf ſchwediſches Gebiet geſchafft worden. Die Häuſer ſind um die Kirche gruppirt. Südlich von Karesuando liegt ein ziemlich großer See, aus dem Schoße deſſelben ſteigen zwei bis drei

Digitized by Google

grüne Eilande empor. Der Muonio fließt von W.-N.-W. nach O.-S.-O.; ſeine Breite von wenigſtens 200 Metern und ſeine raſche Strömung machen ihn ſchon zu einem bedeutenden Fluſſe. Die Umgebungen ſind offen und ſehr waldig, die Kiefer iſt daſelbſt reichlich vorhanden.

Der Paſtor Läſtadius, welcher jeden Augenblick, den ihm die Pflichten ſeines Amtes frei laſſen, der Botanik widmet, hat dem Pflanzengarten zu Paris zwei Sendungen von Pflanzen gemacht, welche zu Karesuando, Piteo, Torneo, Tromſoe, Lyngen und Kaafjord geſammelt wurden. Die Proben ſind zahlreich und mit großer Sorgfalt geſammelt und beſtimmt. Das nachfolgende Verzeichniß umfaßt die bemerkenswertheſten, von Herrn Läſtadius eingeſandten Arten aus der Umgegend von Karesuando; die Abarten und Baſtarde habe ich bei Seite gelaſſen, ſie würden überflüſſig geweſen ſein bei einem Vegetationsverzeichniſſe dieſes Diſtrikts, das als Maßſtab für die Vergleichung mit den nördlichen Gegenden oder alpinen Zonen der gemäßigten Länder dienen ſoll.

Pflanzen aus der Umgegend von Karesuando.

(Br. 68° 36′ n., L. 20° 18′ ö.)

Ranunculaceae. Ranunculus acris L., R. auricomus L., R. hyperboreus Rottb., R. reptans L., R. lapponicus L., R. aquatilis L., R. repens L.

Cruciferae. Draba hirta L., Barbarea vulgaris Br.

Violarieae. Viola palustris L., V. biflora L.

Caryophylleae. Lychnis alpina L., Stellaria graminea L., S. longifolia Fries, S. alpestris Fr., S. crassifolia Ehrh., Spergula saginoides L., Cerastium triviale Link, C. vulgatum Wahlenb., C. viscosum L., C. alpinum L., C. trigynum Vill.

Geraniaceae. Geranium sylvaticum L.

Digitized by Google

Leguminosae. Phaca frigida L., Astragalus alpinus L.

Rosaceae. Rubus castoreus Laest., R. arcticus L., Potentilla alpestris Fr., Sorbus aucuparia L.

Halorageae. Callitriche verna L.

Onagrarieae. Epilobium alpinum L.

Saxifrageae. Saxifraga hirculus L.

Rubiaceae. Galium palustre L.

Compositae. Pyrethrum inodorum Sm., Solidago virga aurea L., Saussurea alpina DC., Tussilago frigida L., Gnaphalium dioicum L., G. alpinum L., G. supinum Hoffm., Hieracium vulgatum Fr., H. boreale Fr., H. sylvaticum Wahlenb., H. alpinum L., Erigeron uniflorus L., Sonchus sibiricus L.

Ericaceae. Arbutus alpina L., Menziezia caerulea Wbg., Chamaeledon procumbens Link.

Gentianeae. Gentiana nivalis L.

Polemoniaceae. Polemonium caeruleum L.

Rhinanthaceae. Pedicularis lapponica L., P. palustris L., Rhinanthus cristagalli L., Bartsia alpina L., Euphrasia officinalis L., Veronica serpyllifolia L., V. longifolia L.

Labiatae. Galeopsis tetrahit L., G. versicolor Willd.

Utricularieae. Pinguicula villosa L., P. alpina L.

Polygoneae. Rumex domesticus Hartm., R. acetosa L., Oxyria reniformis Hoock, Polygonum viviparum L.

Amentaceae. Salix versifolia Wahlenb., S. myrsinites L., S. Herbacea L., S. myrtilloides L., S. lanata L., S. Lapponum L., S. arbuscula L., S. nigricans L., S. hastata Hartm., S. limosa Wahlenb., S. capraea L., S. canescens Fr., Betula nana L., B. humilis Hartm., B. pubescens Ehrh., B. alba L.

Orchideae. Orchis lapponica Laest.

Colchicaceae. Tofieldia borealis Wahlenb.

Digitized by Google

Junceae. Juncus triglumis L., J. nodulosus Wahlenb., J. trifidus L., J. stygius L., J. triglumis L., Luzula parviflora Ehrh., L. spicata DC., L. campestris DC.

Cyperaceae. Eriophorum capitatum Hoffm., E. vaginatum L., E. alpinum L., E. polystachyum L., E. russeolum Fr., E. gracile Koch, E. angustifolium Reich., Carex curvirostra Hartm., C. panicea L., C. livida Wahlenb., C. microglochin Wahlenb., C. pauciflora Lightf., C. laxa Wahlenb., C. saxatilis Wahlenb., C. ampullacea L., C. limosa L., C. rotundata Wahlenb., C. aquatilis Wahlenb., C. capitata L., C. tenuiflora Wahlenb., C. loliacea L., C. chordoriza Ehrh., C. capillaris L., C. canescens L., C. cespitosa L., C. teretiuscula Good., C. heleonastes Ehrh., C. Buxbaumii Wahlenb., C. dioica L., C. microstachya Ehrh., C. tenuiflora Wahlenb.

Gramineae. Calamagrostis phragmitoides Hartm., C. epigejos L., C. strigosa Wahlenb., C. Halleriana Hartm., Agrostis stolonifera L., A. canina L., A. rubra L., Phleum alpinum L., Alopecurus geniculatus L, Aira atropurpurea Wahlenb., A. flexuosa L., Avena subspicata Wahlenb, A. alpestris Hartm., Festuca rubra L., F. ovina L., Arundo stricta Wahlenb., A. lapponica Wbg., Poa serotina Hartm., P. flexuosa Wahlenb., P. annua L.

Zu Karesuando verließen wir die übrigen Mitglieder der Kommiſſion. Wir gewannen bei dieſer Trennung eine Freiheit der Bewegung, ohne die eine wiſſenſchaftliche Reiſe nicht von Nutzen ſein kann. In der That iſt das Ziel, welches ſich Phyſiker und Naturforſcher ſtecken, ſo verſchieden von demjenigen, welches der Gelehrte und der Künſtler verfolgen, daß ſie ſich durch die Verpflichtung, beiſammen zu bleiben, gegenſeitig hindern. An den Grenzen der europäiſchen Civiliſation angelangt,

Digitized by Google

trennten wir uns nicht ohne Bedauern, aber im Intereſſe unſerer beiderſeitigen Arbeiten.

Am 19. September Morgens acht Uhr nahmen wir vom Paſtor Läſtadius Abſchied, um den Muonio und Torneoelf bis Kulkula, einem nur wenige Myriameter vom Bottniſchen Meerbuſen gelegenen Dorfe, hinunterzugehen. Das Wetter, anfangs unſicher und veränderlich, ſetzte ſich und ward ſchön. Auf den Renthierfellen, womit unſere Barke ausgeſchlagen war, hingeſtreckt, ließen wir unſere Blicke von einem Ufer zum andern ſchweifen. Bald glitten wir langſam die Krümmungen der grünenden Ufer des Fluſſes entlang, bald riß uns ſein ungeſtümer Lauf ſchnell mit ſich fort. Durch das Scholken der Wellen hin und her geworfen, und von den Wirbeln erfaßt, welche um die aus dem Waſſer hervorragenden Klippen ſchlugen, ſchoß unſere Barke alsdann wie ein Pfeil dahin, den höckerigen Grund des Fluſſes mit dem Kiele ſtreifend, worauf ſie wieder in einem Waſſer, ruhig wie das eines Sees, gemächlich weiterglitt.

Am erſten Tage kamen wir bei Kuttano oder Kuttaneby am rechten Ufer und Palajocki und Songa-Motka am linken, alſo zu Rußland gehörigen Ufer, vorbei und erreichten am Abend Katkeſuando, ein auf dem linken Ufer gelegenes und folglich zu Rußland gehöriges Dorf. Palajocki iſt ohne Zweifel das Palajönſu von Buch's;*) es iſt der Punkt, wo dieſer Reiſende den Muonioelf wieder erreichte. Die Lappen verändern bekanntlich gern die Endungen ihrer Hauptwörter, und Jocki bedeutet im Lappländiſchen Fluß. Um fünf und ein halb Uhr begegneten wir den erſten Fichten (Abies excelsa) genau an der Stelle, wo ſie auf von Buch's Karte verzeichnet ſtehen, 15 Kilometer etwa oberhalb Katkeſuando und 250 (nach

*) Siehe a. a. O. Bd. II. S. 218.

Digitized by Google

von Buch 260) Meter über dem Meere. Ihre Aeste sind starr und hängen nicht wie die der südlicheren Zonen herab. Die Breite des Flusses ist beträchtlich, denn meist übertrifft sie die der Seine bei Paris, übrigens sind seine Ufer flach und einförmig.

Folgenden Tages, den 20. September, um fünf und ein halb Uhr Morgens von Katkesuando aufgebrochen, erreichten wir Unter-Muonioniska gegen zehn Uhr Morgens. Beim Anlanden konnten wir uns einen Augenblick lang nach Frankreich versetzt wähnen. Lieblich gewellte Hügel waren von jüngst erst abgeernteten Feldern bedeckt; auf dem Gipfel des einen erinnerte uns ein cylindrischer massiver Thurm an die großen Taubenhäuser von Beauce; die Luft war rein, die Sonne fast heiß. Vor vierzehn Tagen bis drittehalb Wochen hatte man die Gerste, das einzige Getreide, welches sich unter dieser Breite anbauen läßt, eingeheimst. Seit zehn Jahren war die Ernte nie so schön ausgefallen, die Gerste war fast zu völliger Reife gelangt. Dieselbe hängt von der Temperatur und der Klarheit des Himmels während der letzten Wochen im August und zu Anfang Septembers ab. Daher das im Norden sehr verbreitete Vorurtheil, daß der Mond viel zum Reifen des Getreides beitrage. Unsere Landleute messen das Erfrieren der Frühjahrstriebe dem tückischen Einflusse des Aprilmondes bei, während es von der Wärmestrahlung der Pflanzen während einer klaren Nacht herrührt, und diejenigen an den Ufern des Muonioelf bedenken nicht, daß auf die kurzen Nächte, wo der Mond am Firmamente glänzt, lange Tage folgen, an denen der wolkenlose Himmel der Sonne gestattet, ihre Ernten zur Reife zu bringen. Wenn der Himmel für gewöhnlich mit Wolken bedeckt wäre, so würden sie den Mond nicht alle ihre Nächte erhellen sehen. Trotzdem ist die Reife der Gerste nie vollständig. Bevor man die Ernte einbringt, muß man sie trocknen. Zu dem Ende theilt man die Gerste in kleine Garben ab, die

Digitized by Google

man ſenkrecht auf Trockengerüſten aufhängt, welche aus wagerecht übereinander gelegten Stangen beſtehen. Dieſe Gewohnheit trifft man auch in den Hochthälern des Wallis im Allgemeinen und in denen von Entremont, Saas und Zermatt im Beſondern an. Sämmtliche Dörfer, deren Höhe 1300 Meter über dem Meeresſpiegel überſteigt, ſind von dieſen großen Trockengerüſten umgeben. In Lappland legt man die Gerſte, wenn ſie zu feucht und die Jahreszeit zu kalt iſt, wagerecht auf das Dach kleiner Häuſer ohne Fenſter, in deren Innerm ſich ein großer Ofen befindet, deſſen Rauch durch die Thür abzieht. Den Reſt des Tages verbrachten wir in Muonioniska, und Nachts bekamen wir ein ſehr ſchönes Nordlicht zu Geſicht. Beim Dorfe iſt das Niveau des Fluſſes 225 Meter über dem des Meeres erhaben.

Den 21. September verließen wir Muonioniska um fünf und ein viertel Uhr Morgens. Wir gingen nicht im Nachen die berühmte Stromſchnelle des Eyenpaïka hinab, ſondern ſchlugen einen Fußpfad ein, der uns durch ſumpfige Waldungen führte. Unterhalb der Stromſchnellen erreichten wir die Spitze des gen Süden wandernden Lemmingszuges. Ihre Aeſer bedeckten die Geſtade des Fluſſes und die Raubvögel waren dergeſtalt geſättigt, daß ſie nur noch das Herz und die Leber fraßen. An keinem andern Punkte noch waren uns dieſe Nagethiere ſo zahlreich erſchienen, und faſt alle liefen parallel mit der Richtung des Fluſſes. Das Ausſehen ſeiner Ufer hatte ſich verändert. Er floß inmitten großer Fichten- und Kiefernwälder, welche bis an ſeine Ufer traten; einzelne Bäume waren über den Strom geneigt, welcher ſie unterwühlte, und ihre Zweige, in den Gewäſſern des Fluſſes gebadet, ſchienen nahe daran zu ſein, von den Wogen, welche ſie unabläſſig zerrten, fortgeriſſen zu werden. Oft ward der Wald durch einen Sumpf unterbrochen, der eine große Lichtung bildete, wo ver-

Digitized by Google

krüppelte Kiefern inmitten des Torfes ihr jämmerliches Dasein fristeten. Von Zeit zu Zeit kündete sich uns schon von ferne ein finländischer Meierhof durch den Schwengel an, welcher sich über den Brunnen desselben erhob. Wenn der Muonioelf, ruhig und majestätisch, sich in der Ebene auszubreiten schien, dünkte es uns, als ob wir einen jener großen Ströme Amerikas hinunterglitten, der über seine Ufer getreten sei und Hunderte von Myriametern einsam durch Savannen und jungfräuliche Wälder hinflute. Wenige Vorfälle unterbrachen die Einförmigkeit unserer Wasserfahrt. Das Ufer war unbewohnt, und wir begegneten keinem Nachen. Eines Tages jedoch bemerkten wir von weitem eine menschliche Gestalt inmitten des Flusses, ohne die Barke, welche sie trug, erkennen zu können. Je mehr wir uns näherten, desto deutlicher ward der Mann, der Nachen aber blieb unsichtbar. Endlich klärte sich die Sache auf. Es war ein finnischer Bauer, der sich einige Bäume oberhalb des Flusses gefällt hatte, und nun auf den Stämmen, woraus er sich ein Floß gemacht, sitzend, nach Hause zurückkehrte.

So passirten wir allmälig die Dörfer Paikajocki und Kilangi, beide am linken Ufer liegend, dann Huki, welches auf dem schwedischen Ufer liegt; nicht weit hinter Huki erblickten wir die Mündung des Niesajocki und erreichten Kolare, wo wir die Nacht zubrachten. Kolare liegt auf einer Insel und gehört zu Rußland; der Arm des Muonioelf, auf dem man zum Dorfe gelangt, ist der Kolareelf. Die Höhe unseres Rastplatzes ward 158, die des Flusses 149 Meter befunden.

Am folgenden Morgen, den 22. September, durchschnitten wir die Insel zu Fuß und begaben uns an das westliche Ufer derselben; ein Wägelchen schaffte unser Gepäck hinüber. Am jenseitigen Ufer angekommen, wechselten wir Kahn und Mannschaft und gingen so bis Jokkialka, einem 5 Kilometer unterhalb Kolare gelegenen russischen Dorfe hinunter. Dort wechsel-

Digitized by Google

ten wir zum zweiten Male mit dem Kahn. Um elf und ein halb Uhr kamen wir bei Kierisvara vorbei, wo die Herren Lottin und Lilliehöok im Mai 1839 einen Aufenthalt machten. Da das Dorf im Gehölz liegt, ſo iſt es vom Fluſſe aus unmöglich, daſſelbe zu bemerken. Nicht lange darauf ſchwammen wir im Zuſammenfluſſe des Muonio mit dem Torneo, der, nachdem er ſeinen Tributär aufgenommen hat, ſeinen Namen beibehält. Doch ſtößt der Torneoelf im rechten Winkel auf ſeinen Nebenbuhler, der ſich von ſeiner geraden Richtung nicht abwendet. Durch ſeine Breite iſt der Muonioelf dem Torneoelf überlegen, ſeine Strömung jedoch weniger ſchnell und ſeine Waſſermenge wohl nicht ganz ſo bedeutend. Kengis liegt an den Ufern des Torneo. Die 2 Kilometer vom Dorfe gelegenen Eiſenhämmer beſitzen eine gewiſſe Berühmtheit. Herr Anglès, welcher zwei Tage nach uns Kengis paſſirte, ſah daſelbſt die erſten Sperlinge wieder. In der Provinz Finmarken ſind ſie unbekannt.

Die Stromſchnellen ſind in dieſem Theile des Flußlaufes häufig. Sie ſind an allen Punkten vorhanden, wo das Bett uneben und das Gefälle etwas ſtark iſt. Alsdann verurſacht die Flußſtrömung Wellen, welche ſich beſtändig rückwärts brechen, und ein ſcholkendes Meer mit kurzen Wellen nachahmen. Der Mann, welcher das Steuerruder hält, muß dieſe Wellen immer ſo viel als möglich im rechten Winkel durchſchneiden, denn eine Welle, welche ſich ſeitlich über die ganze Länge des Nachens bräche, könnte ihn zum Umſchlagen bringen. Die Kähne ſind danach gebaut, nach vorn ſind ſie emporgerichtet, und die Form des Kiels bildet in dieſem Theile eine ſchräge Fläche, welche das Geraderichten des Vordertheiles erleichtert. Ueberdies paßt man ihnen noch zwei Planken an, welche die Seitenbekleidungen erhöhen. Ueberall, wo die Welle ſich ſehr ſtark bricht, kann man ſicher ſein, daß eine Klippe waſſerpaß liegt und entweder

Digitized by Google

weicht man ihr ſchon von Weitem aus, oder man ſteuert auch gerade auf ſie los, um in ihren Strudel hineingeriſſen zu werden. Uebrigens kommt es ſelten vor, daß das Felſenriff die ganze Breite des Fluſſes einnimmt. Zuweilen iſt man genöthigt, im Halbkreis um gewiſſe Klippen zu biegen, wie z. B. bei der Stromſchnelle von Matkojocki bei Korpikula. Da es wichtig iſt, daß der Nachen ſich fortwährend leicht ſteuern laſſe, rudern die Bootsleute aus Leibeskräften, und das Fahrzeug erhält ſo eine wahrhaft erſchreckende Schnelligkeit. In ſolche Stellen würde man ſich nicht ohne Nothruder hineinwagen, denn ein plötzlich abgebrochenes Ruder würde den Untergang der Barke und der Menſchen, welche ſie trägt, nach ſich ziehen.

Um ſechs und ein halb Uhr Abends kamen wir im Gaſthauſe von Pello an. Dieſes Dorf bildet die nördliche Spitze des von Maupertuis gemeſſenen Bogens, des erſten Franzoſen, welcher Lappland in wiſſenſchaftlicher Abſicht beſuchte, doch vermochten wir keine ſichere Spur von dem Aufenthalte dieſes großen Geometers aufzufinden.*)

*) Zwei Jahre ſpäter beſuchte ich voll Andacht das Grab des Maupertuis in der Kirche des Dörfchens Oberdornach im Kanton Solothurn in der Schweiz. Nachdem er ſich nach Baſel zu ſeinem Freunde Johann Bernouilli zurückgezogen hatte, ſtarb Maupertuis in ſeinen Armen und wollte in der beſcheidenen Kirche dieſes Weilers begraben ſein. Hier ſeine Grabſchrift, wie ſie in eine einfache Sandſteinplatte eingehauen iſt:

„Virtus perennat, cetera labuntur. Vir illustris genere, ingenio summus, dignitate amplissimus, Petrus Ludovicus Moreau de Maupertuis ex collegio XL. academicorum Ling. Franc., eques auratus ordinis Reg. Borus. praestantibus meritis dicati, Academiarum celebrium Europae omnium socius ac Regiae Berolinensis praeses, natus in castro Sancti Maccorii, die XXVIII. sept. MDCXCVIII., aetate integra lenta morte consumptus, hic ossa sua condi voluit.

„Catharina Eleonora de Bork, Maria soror et Joannes Bernouilli in cujus aedibus Basileae, die XXVI. Julii MDCCLIX., decessit, communis desiderii lenimen hocce monumentum beatis manibus posuerunt."

Digitized by Google

Folgenden Tages verließen wir Pello um ſieben und ein halb Uhr. Einen Myriameter unterhalb dieſes Punktes ſahen wir zum erſten Male das Tanacetum vulgare und das Trifolium repens. Um elf Uhr kamen wir bei dem ruſſiſchen Dorfe Tortula an. Dieſem Punkte gegenüber wies das Barometer den Gewäſſern des Fluſſes 30 Meter Höhe über dem Meere an, eine Zahl, die uns zu gering erſcheint. Hier iſt die äußerſte Grenze der Hopfenkultur, und Herr Anglès hat hier eine Birke von $2_{,44}$ Meter Umfang gemeſſen.

Da wir am linken Ufer ein hübſches Landhaus, von ſchönen Wirthſchaftsgebäuden umgeben, bemerkt hatten, ſo konnten wir dem Verlangen nicht widerſtehen, demſelben einen Beſuch abzuſtatten. Der Herr des Hauſes empfing uns ſehr artig und ließ uns in einen ziemlich eleganten Salon eintreten, wo eine ſeiner Töchter auf dem Piano ſpielte. Dieſe Töne machten einen magiſchen Eindruck auf uns; es war ein fernes Echo der Civiliſation, welche uns inmitten der Einöden Lapplands aufſuchte. Jeder von uns knüpfte irgend eine Erinnerung an die abweſende Heimath daran, und wir hatten einige Mühe, uns von dieſem Salon, dem allernördlichſten unter dieſem Meridian, loszureißen, um unſere Barke wiederzugewinnen.

Auf dieſem Theile unſerer Reiſe war es, wo ſich allmälig wieder die Verfeinerungen der Civiliſation einſtellten; wir konnten zugleich die Breitengrenze der Pflanzen und die eines jeden jener Hausgeräthe beſtimmen, welche man im Innern des geſitteten Europas als unerläßlich zum Leben betrachtet. Auf dem lappländiſchen Hochlande ſchliefen wir, von Renthierfellen eingehüllt und durch ein einfaches Zelt geſchützt, am Muonioelf auf Heu in den Scheunen der finniſchen Bauernhöfe, weiter ſüdlich breitete man Tücher über das trockne Gras, welches uns als Lager dienen ſollte. In Pello hatten wir jeder eine Bettſtelle und ein Betttuch, in Mattaringi war unſer

Digitized by Google

Bett mit zwei Laken versehen, aber erst in Kulkula schien unser Lager allen Anforderungen des europäischen Reisenden zu genügen. Die Küche beobachtete denselben Fortschritt, leider war es immer die aus dem Jahrhunderte Ludwigs XIV., welche Boileau in seiner dritten Satire so prächtig beschrieben hat.*)

Unterhalb Tortula liegt das schwedische Dorf Jockfengi und das Städtchen Mattaringi, ehedem Ober-Torneo (Ofver Torneo). Die Landstraße von Stockholm nach Norden geht nicht über letztere Stadt hinaus.

Am folgenden Tage, den 24. September, blieben wir in Mattaringi und machten einen Ausflug auf den Gipfel des Avasara, eines Berges, der durch die Messung eines Längengrades berühmt geworden ist, welche nacheinander im Jahre 1738 von Maupertuis und Celsius, und im Jahre 1801 von Ofverböm und Svanberg angestellt wurde. Wir fanden mit dem Barometer, daß der Gipfel dieses Berges 196 Meter über den Gewässern des Torneoelf liegt. Diese Höhe kann nicht viel von der wahren abweichen. In dem Bericht von Svanberg lesen wir, daß die schwedischen Beobachter vom Gipfel des Avasara aus für die Eintiefung der Nordgrenze ihrer Basis 51722 Centesimalsekunden, rund 4° 39′ 18″, gefunden haben, während der horizontale Abstand zwischen beiden Punkten 2132 Meter betrug. Daraus ergiebt sich für den Niveauunterschied 187,3 M., und es ist nur noch die Höhe des Signals, der Nordspitze der Basis über den Gewässern des Torneoelf hinzuzufügen, sowie der Augenhöhe des Beobachters über dem Gipfel des Avasara Rechnung zu tragen. Wir haben die Elemente zu diesen Korrektionen nicht in Händen, doch kann man nach dem Bericht von Svanberg annehmen, daß sie die beobachtete Höhe in eine Höhe von 190 bis 195 Meter verwandeln würden. Was die

*) Aimez-vous la muscade, on en a mis partout. (Muskatnuß liebt Ihr wohl? Sie fehlt in keiner Schüssel.)

Digitized by Google

der Flußgewässer von Mattaringi betrifft, so geben ihr unsere Beobachter 21 Meter, doch ist wohl die Höhe von 48 Meter, welche Herr Svanberg angiebt, vorzuziehen. Der Abstand, welcher uns von Karesuando trennte, war bereits zu groß, als daß wir auf die Genauigkeit der barometrischen Resultate hätten rechnen können, und die Messung des Herrn Svanberg ergiebt sich wahrscheinlich aus einem geodätischen Nivellement.

Die Vegetation des Avasara ist sehr schön, Heidelbeeren und Bärentrauben sind in Menge vorhanden. Ihre Beeren waren reif. Während der beiden Sommer, welche wir im Eismeere zugebracht hatten, des Obstes beraubt, fanden wir den Geschmack derselben köstlich. Auf dem Gipfel bewunderten wir Birken von 10 Meter Höhe, deren schwankende und hängende Aeste an die Physiognomie dieses Baumes in den französischen Landschaften erinnerten.

Zu Mattaringi (Ofver-Torneo) vernahmen wir, daß Herr Portin, den Meteorologen durch seine langen Reihen von Beobachtungen wohl bekannt, im vergangenen Winter gestorben sei. Leider konnten wir unser Barometer nicht mit dem seinigen vergleichen, da das Quecksilber in der Zeit zwischen seinem Tode und unserer Ankunft ausgeflossen war. An diesem Instrument saß eine Papierskala in Zolle und Zehntelzolle eingetheilt. Wir versicherten uns, daß 3 Zolle dieser Eintheilung 89 Millimetern, rund 1 Zoll = 29,7 Mm., gleichkamen. Die Röhre war viel zu kapillar, und die Kugel ohne beständiges Niveau. Man sieht, daß diese Beobachtungsreihen nur einen sehr geringen Grad von Vertrauen verdienen.

Am 25. September Abends gingen wir in Kulkula zur Ruhe, dort sind die Gewässer des Flusses nur noch an zehn Meter über dem Meere erhaben.

Am folgenden Morgen verließen wir unsern Nachen, um den Landweg einzuschlagen. Das Land war mit geackerten

Digitized by Google

Feldern bedeckt, die durch Hecken getrennt, und mit Wieſen und Schlagholz untermiſcht waren. Der Roggen geſellte ſich zur Gerſte, welche zu Mattaringi allein gebaut wird. Zahlreiche Windmühlen überragten die Gipfel der Hügel. Dieſer Anblick erinnerte uns an die Umgegend von Paris, und doch befanden wir uns unter dem Polarkreiſe bei Torneo, dem äußerſten Reiſeziel der Touriſten, welche die Sonne um Mitternacht ſehen wollen. Den 26. um neun Uhr Morgens von Kulkula aufgebrochen, langten wir gegen Mittag zu Haparanda an. Seit Torneo ruſſiſch geworden iſt, hat der Handel dieſe neue Stadt geſchaffen, die ſich wie durch Zauberſchlag am ſchwediſchen Ufer des Fluſſes erhebt und wächſt. Wir blieben daſelbſt bis zum 3. Oktober, worauf wir die Heerſtraße nach Stockholm einſchlugen.

Digitized by Google

Pflanzenbesiedelung der brittischen, der Shetland- und Faröerinseln, sowie Islands.

Stammt eine jede Pflanze von dem Orte her, wo sie sich gegenwärtig fortpflanzt, oder giebt es Schöpfungscentren, von wo die Gewächse sich rings über die Erdoberfläche ausgebreitet haben? So lauten die beiden Fragen, über deren Beantwortung die Naturphilosophen noch lange getheilter Meinung sein werden. Die Einen suchen die Frage gewissermaßen zu umgehen, und nehmen an, daß die Pflanze an dem Orte, wo sie vor unsern Augen lebt, entsprungen sei; — die Andern dagegen nehmen große Pflanzenwanderungen an, ähnlich denen der Menschenrassen. Indem Letztere auf diese Fragen die ihnen von der Geologie über die Vergangenheit der Erde und von der physischen Geographie und der Meteorologie über den gegenwärtigen Zustand derselben gelieferten Kenntnisse anwenden, begnügen sie sich nicht damit, in der geographischen Vertheilung der Arten eine Thatsache ohne Prämissen und Konsequenzen zu erblicken. Sie suchen darin die Spur der letzten oberflächlichen Veränderungen unsers Planeten und die Wirksamkeit der so zahlreichen und mannichfachen Kräfte zu erkennen, welche noch jetzt die Zerstreuung der Pflanzen beeinträchtigen oder begünstigen. Sie

Digitized by Google

suchen auf der Karte den Marsch dieser Pflanzenheere anzugeben, welche gewisse Länder überzogen haben, während andere ihre ursprüngliche Flora bewahrt haben. Diese Untersuchungen datiren erst von gestern; indem wir das Augenmerk der denkenden Geister darauf lenken, hoffen wir, daß man die Bedeutung derselben ahnen werde. In der That ist die Schöpfung der gegenwärtigen Gewächse dem Auftauchen der Kontinente und Inseln auf dem Fuße gefolgt. Es ist gewissermaßen der letzte Akt in der geologischen Geschichte unsers Erdballs. Zu gleicher Zeit erscheint der Mensch; die Tradition jedoch beginnt erst lange nachher.

Seit Anfang unsers Jahrhunderts hatten die Botaniker bemerkt, daß gewisse Inseln eine ihnen eigenthümliche Flora besitzen, während andere keine Pflanze darbieten, die sich nicht auf dem nächsten Festlande wiederfindet. Die britischen Inseln befinden sich in diesem Falle, doch wollen wir uns nicht darauf beschränken, die Vegetation Englands, Schottlands und Irlands zu analysiren, wir wollen auch die Pflanzenwanderungen auf jener Reihe von Inselgruppen, Inseln und Inselchen zu verfolgen suchen, welche unter den Namen Orkaden, Shetland, Faröer und Island die einzige Kette bilden, welche Mitteleuropa mit Nordamerika verbindet.

Untersuchen wir zuerst die Pflanzengeographie der brittischen Inseln. Bei dieser Untersuchung werden uns als Führer die schönen Arbeiten der Herren Hewett Watson*) und Edward Forbes**) dienen. Alle Beide haben ihr Vaterland, der erste

*) Remarks on the geographical distributions of British Plants, chiefly in connexion with Latitude, Elevation and Climate (1 vol. in 8°, 1835) sowie Cybele Britannica 1847 bis 1859.

**) On the Connexion between the distribution of the existing Fauna and Flora on the British Isles and the geological changes which have affected their Area, specially during the epoch of the Northern Drift (Memoirs of the geological Survey of Great Britain, 1846. t. I. p. 336).

Digitized by Google

als Botaniker, der zweite als Zoologe und als Geologe, sorgfältig erforscht. Ein wichtiger Hauptumstand beherrscht sämmtliche Ergebnisse, zu welchen diese Gelehrten gelangt sind, daß nämlich die brittischen Inseln nicht Eine Pflanze darbieten, welche ihnen eigenthümlich angehört und die sich nicht auf dem festländischen Europa wiederfindet.*) Diese Inseln lassen sich also nicht als ein Mittelpunkt der Pflanzenschöpfung betrachten, da alle Pflanzen, welche sie bewohnen, auch auf dem europäischen Festlande vorkommen. Doch stammen nicht alle aus denselben Gegenden Europa's, und an der Hand der Herren Watson und Forbes werden wir eine Reihe von Pflanzenwanderungen erkennen, welche die brittischen Inseln allmälig bevölkert haben.

Asturischer Typus. Dank der Gelindigkeit seiner Winter hat uns Irland sozusagen die Reste einer iberischen Flora aufbewahrt. Man trifft im Südwesten dieser Insel wildwachsend zwölf in Asturien heimische Pflanzen an, welche sich in Irland als die letzten Ueberreste einer Kolonie erhalten haben, deren Ausgangspunkt sich im Norden Spaniens befindet. Auf die Westküste beschränkt, kommen diese Pflanzen in den östlichen Provinzen der Insel nicht vor. Weiter unten werden wir mit Forbes die wahrscheinlichen Ursachen dieser Wanderung, der ältesten von allen, herauszufinden suchen, der ältesten, weil sie eine Temperatur und eine Vertheilung von Land und Meer voraussetzt, welche von der heutigen sehr verschieden sind.

Armorikanischer Typus. — Der Südwesten Englands und der Südosten Irlands bieten eine Vegetation dar, deren Aehnlichkeit mit der der Bretagne und Normandie den Botanikern schon längst aufgefallen ist. Viele südliche Arten trifft man die Westküsten Frankreichs entlang an, bis ihnen die stets wachsende Strenge des Klimas auf ihrer Wanderung nach

*) Eine einzige Art, das Eriocaulon septangulare, auf die Küsten der Hebriden verbannt, ist in Nordamerika einheimisch.

Digitized by Google

Norden Einhalt gebietet. Eine gewisse Anzahl dieser Pflanzen treffen auf der Halbinsel, deren äußerste Spitze Cherbourg einnimmt, eine so gelinde Wintertemperatur an, daß sie dort trotz der geringen Sommerwärme aushalten. Später haben sich diese Pflanzen im Südwesten Englands die Küsten von Devonshire und Cornwallis entlang ausgebreitet, von da haben sie die gegenüberliegenden Gestade Irlands gewonnen und sich in den Grafschaften Cork und Waterford naturalisirt. Ebenso brachen vordem die Normannen unter der Führung Wilhelm's des Eroberers von denselben Gestaden auf, um England an sich zu reißen. Die Pflanzeneroberung aber hat den Süden der Insel nicht überschritten und die Strenge des Klimas, welche die Menschen nicht zu hemmen vermag, dem Einfall der Pflanzen einen unübersteiglichen Wall entgegengesetzt.

Nordischer Typus. — Die Gebirge Schottlands, Cumberlands und des gälischen Hochlandes bieten dem Botaniker eine ganz besondere und in allen Punkten verschiedene Vegetation dar. Derjenigen der Schweizer Alpen analog, besitzt diese Flora eine noch auffallendere Aehnlichkeit mit der Flora der arktischen Länder, wie Lapplands, Islands und Grönlands. Die bei weitem größte Anzahl der auf den Gipfeln der Hochgebirge Schottlands lebenden Pflanzen kommt auch auf den Inseln des Eismeeres am Meeresstrande fort, doch finden sich viele darunter, welche nie in den Schweizer Alpen gefunden worden sind. Gleichwohl kommt die große Mehrzahl dieser Gewächse zugleich an den Gestaden der Polarländer und auf den schneegekrönten Gipfeln der Alpen und Pyrenäen vor.

Germanischer Typus. — Dies ist derjenige, welcher in England herrscht, und sozusagen den Grundstock der Vegetation bildet. Im nördlichen Frankreich und Deutschland einheimisch, haben diese Gewächse den größten Theil Englands, Schottlands und Irlands eingenommen, wie vordem die Sachsen

Digitized by Google

ins Gebiet der Angeln einfielen, um sich an deren Stelle zu setzen. Wenn es wahr ist, daß die eingeborenen Herren nach der Eroberung verschwunden sind, so ist es wohl eben so wahr, daß die Pflanzen Deutschlands diejenigen erstickt haben, welche die ursprüngliche Vegetation dieser Inseln bildeten. Im Laufe der Jahrhunderte ist der germanische Typus dermaßen vorherrschend geworden, daß die meisten englischen Botaniker ihn mit dem Namen des brittischen bezeichnen. Gleichwohl hat eine gewisse Anzahl von Pflanzen, welche diesem Typus angehört, die Meerenge, welche England von Irland trennt, keineswegs überschritten, während der übrige Theil der Einwanderung dieses Hinderniß besiegte. Diese Arten, gemein an der englischen Küste, welche den St. Georgskanal einfaßt, sind an dem gegenüberliegenden Strande von Irland unbekannt. Die Studien des Zoologen bestätigen in allen Punkten die aus der Botanik gezogenen Schlüsse. Gewisse in Deutschland sehr verbreitete Thiere scheinen in England in denjenigen Gegenden gewissermaßen eingehegt zu sein, wo die germanische Flora ausschließlich herrscht; so sind der Hase, das Eichhorn, das Murmelthier, der Hausmarder, der Maulwurf auf England beschränkt und finden sich in Irland nicht. Auf letzterer Insel vertreten nur fünf Arten die Klasse der Reptilien. In England giebt es deren elf, und in Belgien, dem Ausgangspunkte der germanischen Wanderung, zweiundzwanzig. Lebende Mollusken, so verschiedene Arten von Schnirkel- und Schließschnecken, sind in gleicher Weise vertheilt.

Die Meer-Fauna und Flora gehorchen allen den Gesetzen, welche bei der Vertheilung der Landthiere und Landgewächse walten. Gewisse, den südlichen Bezirken eigenthümliche Seealgen finden sich nur an den Westküsten Englands, und man fängt daselbst Fischarten, welche nie über den Pas de Calais oder den St. Georgskanal hinauskommen. Dies sind die

Digitized by Google

neptunischen Repräsentanten des asturischen und armorikanischen Typus. Desgleichen sind der Häring, der Schellfisch, der schwarze Wittling nur in der Nordsee die Ostküsten entlang, wo der germanische Typus vorherrscht, reichlich vorhanden. Endlich scheinen die großen Cetaceen, wie die Walfische, die Narwale, die Delphine der arktischen Meere selbst im Schoße des Ozeans die ideale Grenze einzuhalten, welche die nordische Vegetation Schottlands und Englands von den südlicheren Floren von Cornwallis und des südlichen Irlands trennt.

Bislang hatten die Naturforscher in dieser Vertheilung der lebenden Wesen nach gewissen bestimmten Regionen nur eine natürliche Folge des allmächtigen Einflusses des Klimas und des Bodens erblickt. Wenn einige Pflanzen Asturiens sich im Süden Irlands halten, so rührt dies nach ihnen daher, daß sie dort die gelinden Winter der iberischen Halbinsel antreffen, und daß die mäßig warmen Sommer Irlands zum Reifen ihrer Samenkörner hinreichen. Desgleichen haben die Pflanzen der Bretagne und Normandie die Meerenge überschreiten und Cornwallis und Devonshire einnehmen können, wo ein ihrem Heimatlande analoges Klima herrscht. Die kräftigen Gewächse Deutschlands haben in den mittleren Gegenden Englands, im Süden Schottlands und im Norden Irlands Daseinsbedingungen, analog denen im Norden Deutschlands und Frankreichs, angetroffen, daher ihre Vermehrung und Verbreitung im größten Theile der brittischen Inseln. Endlich boten die Felsen, die grasigen Abhänge, die Torfe und Moore Schottlands den arktischen Pflanzen die mannichfachen Standörter, die mäßigen Sommer, den langen Winterschlaf und den schützenden Schnee der Polarländer.

Edward Forbes hat sich mit diesen Erklärungen keineswegs begnügt, er hat einen tiefern Grund für das Vorhandensein dieser fremden, Fauna und Flora der britischen Inseln

Digitized by Google

bildenden Typen gefunden. Er hat darin die Spuren einer nicht mehr vorhandenen Ordnung der Dinge, die Beweise für das Vorhandensein wärmerer oder kälterer, als die heutzutage herrschenden Klimate, die Anzeichen einer Gestaltung von Erd und Meer zu erkennen gemeint, deren Spuren uns die Tiefe des Ozeans verhüllt. Folgen wir ihm in seinen geistreichen und gelehrten Forschungen. Da er zuerst eine neue Bahn einschlug, konnte und mußte er oft auf verkehrte Wege gerathen. Allein mit mächtiger Hand verknüpft er die Vergangenheit unsers Erdballs mit der Gegenwart desselben, alle Reiche der Natur ruft er zum Zeugnisse seiner Idee auf, und sollte er sich auch irren, so hat er doch zum Fortschritte der Naturwissenschaften beigetragen, indem er vollends die eingebildete Scheidewand einriß, welche die Gelehrten und die Tradition zwischen dem gegenwärtigen Zustande und den geologischen Epochen unsers Planeten aufgeführt hatten.

Die zehn einheimischen Pflanzen Asturiens, welche den Südwesten Irlands bewohnen,*) sind in Forbes Augen die Reste der ältesten Pflanzenkolonie der britischen Inseln. Unter allen den Pflanzen, welche gegenwärtig den Archipel bevölkern, giebt es keine, welche dem Boden, der sie trägt, fremder wären. Die Entfernung ihres kontinentalen Ausgangspunktes, der ungeheure Golf, welcher jetzt die kleine Kolonie von ihrem Mutterlande trennt, die Verschiedenheit der Klimate, die geringe Anzahl der überlebenden Arten, Alles verkündet einen alten Ursprung und eine Ordnung der Dinge, die sich durchaus nicht mit der heutzutage herrschenden vergleichen läßt. Um dieselben wiederzufinden, geht Forbes auf die Reihe der geologischen Formationen zurück und versetzt uns in die Epoche, wo sich die jüng-

*) Saxifraga umbrosa L., S. elegans Mack., S. geum L., S. hirsuta L., S. hirta Don., S. affinis Don., Erica Makaii Hook., E. mediterranea L., Daboecia polifolia Don., Arbutus unedo L.

Digitized by Google

sten Tertiärschichten auf dem Grunde eines Meeres ablagerten, welches einen großen Theil des südlichen Europas und des nördlichen Afrikas bedeckte. Das Vorhandensein dieses Meeres wird durch die zahlreichen fossilen Muscheln bewiesen, welche identisch sind mit denen, welche man auf einer Menge von Punkten von den Inseln Griechenlands bis zum Süden Frankreichs antrifft. Als diese neugebildeten Länder sich über dem Meere erhoben, beschrieben sie einen ungeheuren Kontinent, welcher Spanien, Irland, einen Theil von Nordafrika, die Azoren und Kanaren umfaßte.

Die Erhebung dieses Meeresbodens ist keineswegs eine müßige Hypothese, da Forbes eben diese Muscheln im Taurus in einer Höhe von 1800 Metern über dem Niveau des Mittelländischen Meeres angetroffen hat. Ja mehr, die große Bank schwimmender Algen, welche sich im Halbkreise jenseits der Azoren vom 15. bis 45. Grade der Breite ausdehnt, deutet uns vielleicht die Umrisse dieses verlorenen Kontinents an. Seine Ufer sind unter dem Meere verschwunden, der Gürtel von Seealgen aber, welcher ihn umgab, schwimmt noch auf der Oberfläche der Gewässer.*)

Nach Forbes hängt das Erscheinen der armorikanischen Pflanzen in Devonshire, Cornwallis und im Südosten Irlands mit dem Dasein dieses zerstörten Kontinents zusammen. Die südliche Physiognomie dieser Gewächse ist in seinen Augen das Anzeichen eines gemäßigteren Klimas als des gegenwärtigen. Gleichwohl hindert nichts, diese Wanderung als gleichzeitig mit der germanischen Eroberung zu betrachten, indem man sie auf

*) Diese Bank wird von einer Algenart, dem Sargassum baccifernm, gebildet, das nur eine schwimmende Abart des Sargassum vulgare zu sein scheint, welches man auf den die Küsten Europas einfassenden unterseeischen Klippen antrifft.

Digitized by Google

die Epoche zurückführt, wo England und Frankreich noch mit einander verbunden waren.

Auf das Untertauchen dieses großen Kontinents, welches nachher eintrat, folgte eine ganz verschiedene Periode, während welcher die Temperatur der Luft niedriger war als jetzt. Während dieser Periode vollzog sich nach Forbes die Wanderung arktischer Pflanzen, welche sich in den Gebirgen Schottlands und Englands gehalten haben. Die Beweise für eine Gletscherperiode, welche derjenigen, worin wir leben, unmittelbar voranging, sind im ganzen Norden Europas reichlich vorhanden.

Ich will hier nicht auf die zahlreichen Spuren ehemaliger Gletscher eingehen, welche man in den Gebirgen Schottlands, Englands und Irlands antrifft, sondern mich auf die dem Thierreiche entnommenen Beweisgründe beschränken.

Der größte Theil der brittischen Inseln ist mit einem lockern, aus verführten Materialien gebildeten Gebirge bedeckt, welches die englischen Geologen mit dem Namen Drift bezeichnet haben. In den beiden nördlichen Dritteln Englands und Irlands und in ganz Schottland enthält dieser Drift die Reste von Thieren, welche sich in lebendem Zustande nur noch im Schoße des Eismeeres, sowie an den Küsten Islands und Grönlands finden. Ihre Aufzählung würde zu weit führen. Ich will nur den gemeinen Walfisch, den langköpfigen Potfisch, einen Flossenwal, den Narwal, einen Fisch der Meere Grönlands, sowie eine große Menge von Muscheln anführen, welche noch jetzt in denselben Strichen vorhanden sind. Während dieser Periode war England also zum Theil mit Gewässern bedeckt, deren Temperatur sich der des Eismeeres näherte. Nicht nur die Ebenen, sondern auch alle niedrigen Theile der Gebirge bildeten den Boden oder die Gestade dieses Ozeans, denn man hat im gälischen Hochlande Kies-, Sand- und Muschelbetten 450 Meter

Digitized by Google

über dem gegenwärtigen Meeresspiegel erhaben gefunden. Um diese Zeit bildeten England und Schottland nicht ein zusammenhängendes Land, sondern eine Gruppe von Inseln und Inselchen. Nur die Gebirge Schottlands, Cumberlands und des gälischen Hochlands erhoben sich über den Fluten. Ein Klima, dem Islands ähnlich, herrschte auf diesem Archipel, die Gipfel der Gebirge waren, wie der des Hekla, mit ewigem Schnee bedeckt, und zahlreiche Gletscher reichten längs der Thäler bis zum Meeresstrande hinab. Die Pflanzen Grönlands, Islands und Norwegens landeten, von den Strömungen getragen und von den Eisbergen verführt, an diesen Inseln, wo sie ein nur wenig von dem ihres Heimatlandes verschiedenes Klima vorfanden. Diese Verführung der Pflanzen durch die Eisberge ist keineswegs eine müßige Hypothese. Die Schiffer der Polarmeere haben oft Schollen angetroffen, die mit einer enormen Masse von mit Erde und Kies untermischten Trümmern bedeckt waren. Auf diesen Trümmern wachsen wie auf den oberflächlichen Moränen der Alpengletscher Pflanzen, und die an eine ferne Küste treibende Scholle setzt daselbst sozusagen die Pflanzen ab, welche sich nachher in der Gegend verbreiten.

Diese arktischen Gewächse, sagt Edward Forbes, sind keineswegs aus England verschwunden. Sie sind noch in den Gebirgen Cumberlands, des gälischen Hochlandes und namentlich Schottlands vorhanden, wo sie ein Klima finden, welches dem ihres Heimatlandes analog ist.

Am Ende der Gletscherperiode begannen die brittischen Inseln langsam aus dem Schoße der Wellen aufzutauchen. Ueberall an ihren Küsten findet man noch Terrassen oder Linien ehemaliger Gestade, Anzeichen der Ruheperioden, welche diese allmälige Erhebung unterbrochen haben. Um diese Erscheinung gut zu verstehen, muß man sich nicht eine einfache Hebung der Küste vorstellen, wobei die untermeerischen Theile unbeweglich

Digitized by Google

blieben, sondern eine gleichzeitige Erhöhung des Meeresgrundes und des Landes, welche sich mitsammen über ihr altes Niveau erhoben. Diese Hebung ist es, welche das gegenwärtige Relief der brittischen Inseln gebildet und die Gestalt und Tiefe der umgebenden Meere bestimmt hat. Die Eintiefungen sind weniger tief geworden und die Hochgründe aufgetaucht. Daher eine Umwandlung in der Meerfauna. Indem das Meer wärmer war, wurden seine Gestade von den Thieren überzogen, welche dieselben gegenwärtig bevölkern. Da die Temperaturveränderung in großen Tiefen aber weit weniger bemerkbar ist, so haben die Thiere der Gletscherperiode sich dort zu halten vermocht. Auch fängt man, sagt Forbes, in den Eintiefungen, wo das Senkblei 160 bis 200 Meter anzeigt, mit dem Scharrnetz die Mollusken der arktischen Meere, ja eine bedeutende Menge von Muscheln, welche in fossilem Zustande im Drift oder demjenigen Gebirge der Gletscherperiode vorkommen, welches den nördlichen Theil der brittischen Inseln bedeckt. Aus dieser Gesammtheit von Thatsachen schließt Edward Forbes, daß die tiefen Theile der brittischen Meere Bevölkerungen bergen, deren Dasein, wie die Anwesenheit der die Gipfel der schottischen Alpen bekränzenden Pflanzen, sich in die Gletscherperiode zurückerstreckt.

Während der ganzen Dauer der geologischen Epoche, welche wir soeben untersucht haben, war England mit Frankreich verbunden. Der Kanal und die Meerenge von Calais waren nicht vorhanden. Das ist eine für die Wissenschaft gewonnene Thatsache und alle Geologen stimmen darin überein, die Trennung Englands vom Kontinent als ein bezüglich sehr neues und wahrscheinlich sogar mit dem Menschen gleichaltriges Ereigniß zu betrachten. Constant Prévost und d'Archiac haben dies vollständig bewiesen, Ersterer, indem er auf die Uebereinstimmung hinwies, welche zwischen den Kreideschichten der beiden

Digitized by Google

Ufer des Kanals obwaltet, Letzterer, indem er die Identität der die Kreide bedeckenden Schichten von Rollsteinen bewies. Diese Schichten, ähnlich denen der jetzigen Flüsse und Wasserläufe, bilden die oberste Decke des Bodens, diejenige also, welche sich nach allen übrigen abgelagert hat; da diese Decke nun auf beiden Seiten des Kanals identisch ist, so ist sie zur Zeit, wo beide Länder vereint waren, von demselben Strome abgelagert. Die Trennung ist später vor sich gegangen, sie rührt von der Aufrichtung der Kreideschichten her, welche sich auf beiden Seiten nach dem Innern des Landes zu senken und von der Seeseite gehoben erscheinen.

Beim Anbrechen der gegenwärtigen Epoche bildete England also eine Halbinsel, ähnlich wie Dänemark, das Klima, die Bodenoberfläche waren, was sie heute noch sind, auch überzogen die Pflanzen Frankreichs und Deutschlands alsbald diese neu aufgetauchten Erdstriche, die kräftigen Gewächse des nördlichen Europas nahmen den größten Theil der brittischen Inseln ein. Wälder, eben so düster wie die Deutschlands, bedeckten damals die Hügel Englands. Sumpfgewässer standen in den Niederungen, man findet noch in den Torfmooren, welche sie ersetzt haben, Knochen und Geweihe von Riesenhirschen und die Stämme von den Bäumen dieser erloschenen Waldungen. Verloren gegangene Arten von Ochsen, Bären, Wölfe und Füchse waren die einzigen Bewohner dieser Einöden. Die Aufgabe der Natur war vollbracht, die des Menschen beginnt. Die Wälder fallen unter der Art, die stehenden Gewässer verlaufen sich, die Kultur breitet sich aus, die schädlichen Thiere verschwinden, die Bevölkerung wächst und die Umwandlung des Bodens vollzieht sich durch die unaufhörlichen Fortschritte der Civilisation. Ein Werk von Menschenmacht, ist diese Umwandlung eben so vollständig, eben so tiefgreifend, als die, welche

Digitized by Google

in den geologischen Zeiten vor sich ging, zur Zeit, wo die gegenwärtige Epoche der Gletscherperiode folgte.

Versuchen wir die Ideen Hewett Watson's und Edward Forbes' über den Ursprung der Flora und Fauna des brittischen Archipels zusammenzufassen, so werden wir mit ihnen sagen, daß diese Inseln von mehren, seit der Epoche der mittleren Tertiärschichten bis zur unsrigen, allmälig vom festländischen Europa ausgegangenen Kolonien bevölkert worden sind. Als sich ein ungeheurer Kontinent von den Mittelmeergegenden bis zu den brittischen Inseln ausdehnte, bevölkerten die Pflanzen Asturiens und Armorikas den Süden Englands und Irlands. Dieser Periode folgte die Eiszeit, während welcher das Land bis zu einer Höhe von etwa 450 Metern bedeckt ward. Es ist die Zeit der Wanderung der arktischen Pflanzen, welche noch die Spitzen der Gebirge Schottlands bewohnen. Als das Land wieder auftauchte, war England mit Frankreich vereint, die Temperatur so, wie sie gegenwärtig ist. Nun fand die große germanische Eroberung Statt, sie verschlang sozusagen alle andern und ließ nur schwache Reste übrig. Während so die asturischen Pflanzen, die des Südens, zu einer geringen Anzahl auf den Südwesten Irlands beschränkter Arten zusammengeschmolzen sind, vollenden die kräftigen Gewächse des Nordens ihre Eroberung und bemächtigen sich des Bodens, der später von einem kriegerischen, aus denselben Gegenden stammenden Geschlechte eingenommen werden sollte. Nach vollbrachter Besiedelung trennt sich England vom Festlande, und dieses letzte geologische Ereigniß, so unbedeutend im Vergleich zu den ihm vorangegangenen, hat einen unermeßlichen Einfluß auf die Geschicke der Welt ausgeübt. Weniger isolirt, würde England weniger selbstsüchtig geworden sein, und seine starken Rassen hätten sich vielleicht mit einer der großen Festland-Nationen, welche es bevölkert haben, verschmolzen.

Digitized by Google

Während Hewett Watson und Edward Forbes den kontinentalen Ursprung der Pflanzen und Thiere Englands bewiesen, studirte ich die Pflanzenbesiedelung der Shetland- und Faröerinseln, sowie Islands. Diese Inseln bilden sozusagen eine fortlaufende Kette, welche die äußerste Nordspitze Schottlands mit der Ostküste Grönlands verbindet. Es sind die einzigen Länder, welche Europa mit Amerika verknüpfen. Ich hatte die Faröer im Jahre 1839 besucht; die Vegetation dieses Archipels war mir aufgefallen. Obgleich inmitten der Nordsee verloren, bestand ihre Flora doch aus ganz gemeinen Pflanzen, von denen die meisten in den Ebenen Mitteleuropas, andere in den Schweizer Alpen, einige in Schottland und Grönland einheimisch sind. Indem ich meine Nachforschungen auf die Shetlandinseln und Island ausdehnte, fand ich ebenfalls, daß diese Inseln keine ihnen eigenthümliche Vegetation besitzen, sondern daß alle ihre Pflanzen vom Kontinent stammen. Es ist dasselbe Resultat, bei welchem Watson bei seinen Nachforschungen über die brittische Flora angelangt war. Hier bot sich ein neues Problem dar; kamen diese Pflanzenkolonien von Europa oder von Amerika? Da eine große Anzahl von Pflanzen den nördlichen Theilen der alten und neuen Welt gemeinsam sind, bot die Frage einige Schwierigkeiten dar. Immerhin fand ich mehr als hundert ausschließlich europäische Arten unter den auf den Inseln verbreiteten Pflanzen, welche ich unter sich verglich, alle übrigen waren Europa und Amerika gemeinsam. Europa hat demnach den größten Antheil an der Besiedelung dieser Inselgruppen gehabt; eine große Pflanzenwanderung hat sich durch England, Schottland, die Orkaden, Shetland und Faröer bis Island erstreckt. Einige Arten sind direkt von den Küsten Norwegens gekommen. Zu gleicher Zeit aber verfolgten die auf Grönland einheimischen arktischen Pflanzen einen umgekehrten Weg und verbreiteten sich über Island, die Faröer

Digitized by Google

und Shetland bis in die Gebirge Schottlands, wo sie ein zweites Vaterland antrafen. Diese doppelte Wanderung zeigt sich in Zahlen. Wenn man den bezüglichen Antheil der ausschließlich europäischen Arten, welche in der Flora der Shetland enthalten sind, berechnet, so findet man, daß derselbe ein Viertel beträgt; auf den Farör beträgt er nur ein Siebentel, auf Island gar nur ein Zehntel. Je mehr man sich also von Europa entfernt, desto mehr vermindert sich die Zahl der diesem Kontinent eigenthümlichen Gewächse, zugleich aber nimmt der Antheil der grönländischen Pflanzen fast im selben Verhältnisse zu.

Sämmtliche Ideen Edward Forbes', so gewagt zur Zeit, wo er sie laut werden ließ, sind durch die späteren Beobachtungen der Naturforscher Englands und Schottlands bestätigt worden. Man hat deutlich das Vorhandensein von zwei Eiszeiten erkannt. Die erstere folgt unmittelbar auf das Dasein der untermeerischen Wälder an der Küste von Norfolk zwischen Cromer und Kessingland, welche den Braunkohlenlagern von Uznach und Dürnten in der Schweiz entsprechen. Die Bäume im Walde von Cromer, von denen einige noch stehen, gehören den jetzt noch lebenden Kieferarten an; zwischen diesen Stämmen findet man Haselnüsse, Samenkörner von Sumpfpflanzen, wie Bitterklee (Menyanthes trifoliata), nebst Seerosen und Knochen von Elephanten (E. antiquus Falc, E. meridionalis und E. primigenius Blumb.), vom Nashorn (R. etruscus Falc), vom Flußpferd, von Ochsen, Pferden, Hirschen und Bibern. Dieser Wald lag in der Nähe des Meeres, denn er ist unmittelbar mit feinem Sand und mit Thon bedeckt, welcher Muscheln enthält, die Brakgewässer bewohnen. Ueber dieser Schicht bemerkt man ungeschichtete Haufen eckiger, geglätteter, gestreifter oder gereifelter Kiesel, von denen einige Syenite und Porphyre sind, die durch die Eisberge von Skandinavien herübergeführt

Digitized by Google

wurden. Diese Gletscherformationen submarinen Ursprunges haben zuweilen 130 Meter Dicke und beweisen, daß die Küste sich seit der Zeit, wo sie sich im Meere ablagerten, gehoben hat; um diese Zeit bildeten die brittischen Inseln einen aus einer beträchtlichen Anzahl kleiner Inseln bestehenden Archipel, woselbst die von den Gletschern Norwegens kommenden und mit diesem Lande eigenthümlichen Blöcken und Grandmassen belasteten Züge von Eisbergen an den Strand trieben. Allmälig hob sich dieser Archipel mit dem Boden des ihn umgebenden Meeres zu einer um wenigstens 500 Meter die jetzige übertreffenden Höhe.

Sandschichten bildeten sich in den aufgetauchten Thälern, Torfmoore überzogen alle niedrigen und feuchten Theile, aber Dank der größeren Erhebung des Kontinents setzten sich in den Gebirgen Schottlands und Englands Gletscher fest und stiegen bis in die Ebenen hinab; dies ist die zweite Gletscherperiode. Der Mensch erschien wahrscheinlich zwischen beiden, auch ist es die Zeit, wo der irische Riesenhirsch (Cervus euryceros) lebte, dessen Skelet sich in den Torfmooren dieses Landes wiederfindet. Um diese Zeit war der Pas de Calais nicht vorhanden und England eine Halbinsel wie Dänemark. Seitdem hat eine neue Senkung stattgefunden, sie beträgt etwa 200 Meter; es sind dies die größten Tiefen, welche das Senkblei in dieser Meerenge anzeigt, und es würde genügen, daß der Grund desselben sich um eben diese Menge höbe, um England von neuem zu einer Halbinsel Europas zu machen.

Doch Dank einer neuen Vertheilung von Land und Wasser verschwanden, da sich das Klima verbessert hatte, die Gletscher, und die brittischen Inseln nahmen ihre gegenwärtige Gestalt an, allein die Oberfläche ihres Bodens bewahrte die unauslöschlichen Eindrücke dieser Veränderungen in Temperatur, Niveau, Fauna und Flora, welche die Ausdauer und der

Digitized by Google

Scharfsinn der jetzt lebenden Geologen in dem oberflächlichen Boden der brittischen Inseln zu erkennen gewußt hat. Nur eine, während einer unberechenbaren Anzahl von Jahrhunderten sich fortsetzende Reihe langsamer Vorgänge vermag die Mächtigkeit und Mannichfaltigkeit dieser verführten Gebirge zu erklären. Die Zeit hat gethan, was die gewaltigsten Wasserfluten nicht hervorzubringen vermocht hätten. Alles lehrt uns, daß sie das Agens ist, welches die Erdoberfläche umgewandelt hat und noch vor unsern Augen umwandelt. Die Erkenntniß von der Macht der jetzigen umwandelnden Ursachen, vermehrt durch die Wirkung der Zeit, ist die kostbarste Eroberung der heutigen Geologie. Vordem, in der theologischen Periode dieser Wissenschaft, stürzte man sich entschlossen in die ungeheuerlichsten Phantasiegebilde hinein. Je nach Bedürfniß nahm man plötzliche Umwälzungen, ungeheure Zerstörungen, riesige Kräfte, unbekannte Triebfedern, eingebildete Ursachen an. Jetzt suchen aufrichtige Geister erst den Grund der geologischen Thatsachen in den natürlichen Kräften, innerhalb der Machtgrenzen wirkend, die sie vor unsern Augen entfalten, und betreten das Feld der Hypothese erst, nachdem sie das der Wirklichkeit erschöpft haben.

Digitized by Google

Zwanzigste Verſammlung der Brittiſchen Geſellſchaft zu Edinburg im Auguſt 1850.

Zu Anfang des Jahres 1831 machte David Brewſter, einer der größten Phyſiker Großbrittanniens und der Welt, Profeſſor Phillips den Vorſchlag, zu York, etwa im Mittelpunkte Englands, eine Anzahl von Gelehrten zu dem Ende zu verſammeln, am Fortſchritte der Wiſſenſchaften zu arbeiten, indem man wichtige, alljährlich von denſelben aufgeworfene Fragen erörterte und Aufgaben ſtellte, deren Löſung von Belang für die Zukunft des geſammten Menſchengeſchlechts iſt. Der Ruf fand Gehör, und eine Anzahl Männer, jeder von der Wiſſenſchaft, die er verherrlicht hatte, ſozuſagen abgeordnet, kamen zuſammen, um ſie auf dieſem im Entſtehen begriffenen Kongreſſe zu vertreten. Mehre hohe Herren, welche es ſich zur Ehre anrechnen, zum Fortſchritte des menſchlichen Wiſſens durch ihre Arbeiten, ihren Einfluß und ihr Vermögen beizutragen, verbanden ſich mit ihnen. Auf den feſten Grundlagen der Einheit, der gegenſeitigen Achtung und der Liebe zum Guten errichtet, wuchs die Brittiſche Geſellſchaft ſehr ſchnell. Alljährlich eine der hauptſächlichſten Städte Großbrittanniens als Sitzungsort ihrer Zuſammenkünfte erwählend, verſammelte

Digitized by Google

ſie ſich nach einander zu York, Orford, Cambridge, Edinburg, Dublin, Briſtol, Liverpool, Newcaſtle, Birmingham, Glasgow, Plymouth, Manchester, Cork, und kam nach dreizehn Jahren wieder auf ihren Geburtsort York zurück. Im Jahre 1850, nach einem Zwiſchenraum von vierzehn Jahren, fand ſie ſich abermals in Edinburg, vor andern der Stadt der Wiſſenſchaft und Litteratur, zuſammen, die noch nicht von dem ungeheuren induſtriellen Strome, welcher ganz Großbrittannien mit ſich fortreißt, überſchwemmt iſt. Allein Dank jenem fruchtbaren Genoſſenſchaftsgeiſte, welcher das engliſche Volk beſeelt, hat der beſcheidene Verein von 1831 alle Verhältniſſe einer mächtigen Geſellſchaft angenommen, welche eine entſcheidende Rolle in der wiſſenſchaftlichen Welt zu ſpielen berufen iſt. Dieſes Jahr beſtand ſie aus 1225 Perſonen, nämlich 954 Engländern, Schottländern oder Irländern, 247 Damen und 24 Fremden. Die eingegangene Summe, bei einem Satz von einer Guinee auf die Perſon, belief ſich auf 27,500 Francs, deren Verwendung wir angeben werden. Die Damen waren faſt ſämmtlich Töchter oder Frauen von Mitgliedern der Geſellſchaft, oder von Einwohnern Edinburgs und der Umgegend; ſie benutzten dieſe Gelegenheit, um ſich eine Vorſtellung von jenen Wiſſenſchaften zu verſchaffen, die weniger Anziehendes als die Künſte haben, deren Intereſſe aber auch ein reelles iſt. Wenn die Sinne nicht erregt oder entzückt werden, ſo wird dagegen der Verſtand befriedigt; das ruhige Licht der Wahrheit blendet die Einbildungskraft nicht, klärt aber die Einſicht auf. Auch denke man nicht, daß dieſe Damen dem hinfort erloſchenen Geſchlecht der Blauſtrümpfe angehörten; meiſt jung und hübſch, folgten ſie regelmäßig den Sitzungen der verſchiedenen Sektionen. Die meiſten hatten ſich der geologiſchen Sektion beigeſellt, und es war keine geringe Ermunterung für die zahlreichen Freunde dieſer Wiſſenſchaft, vor einem zugleich ſo ge-

Digitized by Google

bietenden und so reizenden Auditorium zu reden. Mehre bemühten sich, in die erhabenen aber schwierigen Kenntnisse einzubringen, welche das Gebiet der Astronomie und der Physik bilden, andere wurden von der Zoologie oder von der Botanik gefesselt. Die Vögel und die Blumen, diese entzückenden Schöpfungen, welche der Poesie, der Malerei und der Naturgeschichte zugleich angehören, hatten sie von der Kunst zur Wissenschaft hingezogen. Ja, einige hatten es nicht gescheut, die Statistik in Angriff zu nehmen, Erörterungen über Staatswirthschaft beizuwohnen und den Reihen von Ziffern, sowie ihren obligaten Gefährtinnen, den Proportionalzahlen, zu trotzen.

Die Mehrzahl der berühmtesten Gelehrten Englands hatte sich zu der Versammlung nach Edinburg begeben; sie betrachten diese Pünktlichkeit als eine Pflicht gegen die Wissenschaft und als eine Höflichkeit gegen bescheidenere und minder begünstigte Mitgenossen, sei es von Seiten der Natur, welche ihnen nicht gleich hervorragende Fähigkeiten verlieh, sei es von Seiten des Glücks, welches ihnen nicht gestattete, dieselben zu entwickeln; sie ehren und ermuntern auch den uneigennützigen Eifer des bescheidenen Arbeiters, der bei seinen Bemühungen der Leitung und Unterstützung bedarf. Betrachtet man die Einfachheit im Wesen, die Umgänglichkeit und Vertraulichkeit dieser hervorragenden Männer, so wird man ihr Genie darunter nicht vermuthen, sie verbergen es mit eben so viel Sorgfalt, als hohe Herrschaften ihre Titel und Reichthümer. Es ist dies eine Gerechtigkeit, die ich glücklich bin dieser Elite der englischen Gesellschaft widerfahren zu lassen. Die vollkommenste Gleichheit herrscht unter all' diesen, in mehr als einem Betracht bedeutenden Männern, auch gefallen sich die Tiefergestellten darin, eine Hierarchie anzuerkennen, welche die Höhergestellten sich unablässig bemühen vergessen zu machen. Man bestreitet nie eine Ueberlegenheit, die sich nicht aufdrängt, und das Gefühl einer

achtungsvollen Zuneigung verbindet ſich ganz natürlich mit dem einer wohlverdienten Bewunderung.

Ein anderes unterſcheidendes Merkmal dieſes Vereins iſt es, daß er weit davon entfernt iſt, ausſchließlich aus Gelehrten von Fach, d. h. Profeſſoren, Aerzten oder Ingenieuren, zu beſtehen. Bei den meiſten Mitgliedern iſt die Liebe zur Wiſſenſchaft vollkommen ſelbſtlos; die durch ihr Verdienſt hervorragendſten Männer widmen ihr, weit entfernt, den mindeſten Vortheil aus der Wiſſenſchaft zu ziehen, ihre Einſicht, ihre Zeit, ihr Vermögen, ohne andere Hintergedanken, als einige neue Wahrheiten zu entdecken und ſich die Achtung ihrer Mitbürger zu erwerben. Mehre der bedeutendſten Gelehrten Englands und der Welt ſind Dilettanten, und ihre Namen ſind ſehr zahlreich in dem folgenden Verzeichniſſe vertreten, worin auch hohe Herren figuriren, die in den Studien eine edle Zerſtreuung von den Arbeiten der Politik, des Krieges oder der Verwaltung ſuchen.

Unter den phyſikaliſchen und mathematiſchen Wiſſenſchaften bemerkte man: Brewſter, Airy, Scoresby, J. D. Forbes, Philips, Laſſell, General Brisbane, Biſchof Terrot, Lord Wroteſſley, Oberſt Sykes, Nasmyth, Osler u. ſ. w.

Unter den Chemikern: Chriſtiſon, Gregory, Daubeny, Joule.

Die Geologen, ein fahrendes Volk, waren die zahlreichſten; hier die Namen der berühmteſten: Jameſon, Murchiſon, Egerton, Maclaren, Sedgewick, Mantell, der Herzog von Argyle, Lord Enniſtillen, Flaming, der Marquis von Northampton, Pentland, Oldham, Philips, Pratt, Ramſay, Smith von Jordanhill, Strickland, Edward Forbes und Hugh Miller.

Unter den Naturforſchern begnüge ich mich zu nennen: Richard Owen, Goodſir, Richardſon, Greville, Bentham, Babington, Balfour, Cleghorn, Walker Arnott, Trevelyan und

Boyle; unter den Aerzten: Syme, Bennet, Hyrtl und A. Thompson.

Für die Statistik und die mechanischen Wissenschaften: Lee, Gordon, Alisson, Porter, Robinson, Scott Russell, Straug und Stevenson.

Unter der kleinen Anzahl Fremder, welche sich zu dem Kongreß begeben hatten, bemerkte man: Herrn Hitchcock, einen amerikanischen Geologen, Herrn Kupffer, einen russischen Physiker, Herrn Parlatore, einen italienischen Botaniker, Herrn Hyrtl, Professor der Anatomie zu Wien. Es waren da fünf Deutsche, drei Holländer, drei Italiener, zwei Russen, acht Amerikaner und ein einziger Franzose, der, welcher die Ehre hat diese Zeilen zu schreiben. Nachdem nunmehr das Personal des Kongresses unseren Lesern bekannt ist, wollen wir versuchen, ihnen eine Idee von den Arbeiten desselben zu geben.

Am 31. Juli war die Gesellschaft in dem großen und schönen Konzertsaale der Stadt Edinburg versammelt. David Brewster, dieser tüchtige Physiker, dessen Name mit allen großen Entdeckungen auf dem Gebiete der Optik seit Anfang dieses Jahrhunderts verknüpft ist, trug eine bedeutende Rede über die Fortschritte der Gesellschaft und die der physikalischen und astronomischen Wissenschaften in den letzten Jahren vor. Nachdem er den Schutz des Staates für die positiven Wissenschaften angerufen hatte, schloß er mit folgenden bedeutsamen Worten: „Dieser Schutz aber genügt nicht. Es hieße nicht in wirksamer Weise zum Frieden und zum Glück der Gesellschaft beitragen, wollte man die Wissenschaft einzig und allein auf die Kaste der Gelehrten und Philosophen beschränkt sein lassen, eine derartige Konzentrirung würde keine Wohlthat sein; die Wissenschaft muß bis in die äußersten Zweige des sozialen Körpers eindringen, dann erst kann sie ihn ernähren und stärken. Wenn das Verbrechen ein Gift ist, so ist Bildung das Gegengift des-

Digitized by Google

ſelben. Die Geſellſchaft würde vergebens den Seuchen und der Hungersnoth zu entrinnen ſuchen, wenn der Dämon der Unwiſſenheit, von ſeinen abſcheulichen Begleitern, dem Laſter und der Ausſchweifung, gefolgt, ſich in alle Klaſſen des Volkes eindrängte, die bürgerlichen Einrichtungen erſchütternd und die Grundlagen der Familie und der Geſellſchaft zerſtörend. Der Staat hat alſo eine hohe Pflicht zu erfüllen; wenn er das Recht in Anſpruch nimmt, das Verbrechen zu ſtrafen, ſo übernimmt er damit auch die Verpflichtung, demſelben aus allen Kräften vorzubeugen; wenn er Unterwerfung unter die Geſetze fordert, ſo muß er das Volk lehren, dieſelben zu leſen und zu verſtehen, er muß ihm die unſterblichen Wahrheiten beibringen, welche die Bürger zu Freunden der Ordnung, frei und glücklich machen werden. Es iſt eine große Frage, was bei dem grenzenloſen Wachsthum menſchlicher Macht über die phyſiſche Welt und des materiellen Wohlſeins aus unſerm geſellſchaftlichen Zuſtande werden wird, wenn dieſer doppelte Fortſchritt nicht von einer entſprechenden Verbeſſerung der ſittlichen und geiſtigen Natur deſſelben begleitet iſt. Mögen die Geſetzgeber, die Häupter der Völker alſo ernſtlich auf die Herſtellung eines Syſtems von Volksbildung bedacht ſein, welches die Nationen über ihre wahren Intereſſen aufklärt und die Täuſchungen vernichtet oder die Vorurtheile zerſtreut, welche ſie in's ſichere Verderben ſtürzen würden."

Dieſe Rede ward mit Beifall überſchüttet, und die Verſammlung ging auseinander. Während der folgenden Tage trennte ſie ſich in Sektionen, welche Tag für Tag von elf bis drei Uhr Sitzung hielten, um dem Vortrage von Abhandlungen zu lauſchen, intereſſante Fragen zu erörtern oder Experimenten beizuwohnen. Ich werde eine Vorſtellung von den vornehmſten Arbeiten, welche die öffentliche Aufmerkſamkeit feſſelten, zu geben verſuchen.

Digitized by Google

Scoresby, der große Seefahrer, welcher einundzwanzigmal die Gegenden von Spitzbergen besucht und eines der hervorragendsten Werke über die Polarmeere*) herausgegeben hat, theilte Beobachtungen über die Größe und Schnelligkeit der Wogen des Atlantischen Ozeans zwischen Nordamerika und Europa mit. Nach ziemlich heftigem Winde, welcher sechsunddreißig Stunden geweht hatte, fand er, daß eine Woge zehn Sekunden brauchte, um die Länge eines Schiffes von 66 Metern zurückzulegen, ihre Geschwindigkeit betrug demnach 60 Kilometer in der Stunde. Die bedeutendste hatte 13 Meter Höhe, und die Entfernung der beiden Kämme, welche die Länge der Welle ergiebt, betrug 180 Meter. Ich werde die Mittheilungen über Astronomie von Airy, über Optik von Brewster oder über Magnetismus von den Herren Philips und Allan Brown nicht näher berühren; sie erfordern, um verstanden zu werden, vorgängige Kenntnisse, welche leider noch allzu selten sind. Jedermann aber würde entzückt gewesen sein, die bewunderungswürdigen Zeichnungen der Mondoberfläche zu sehen, welche Herr Nasmyth mit Hülfe seines großen Teleskops auszuführen vermocht hat. Die Krater der sogenannten Vulkane des Mondes sind, in diesem Teleskop gesehen, eben so deutlich wie die eines Erdgebirges in der Entfernung von drei bis vier Meilen. Man erkennt sehr gut die kreisrunde Böschung und den Kegel in der Mitte, doch gewahrt man keine Spur von jenen Ausbrüchen oder Lavaströmen, deren Vorhandensein allein die Vergleichung dieser Krater mit den Vulkanen der Erde rechtfertigen könnte. Die Meteorologie nahm einen bedeutenden Platz in den Sitzungen der Sektion ein. Man theilte Uebersichten über die verschiedensten und entferntesten Klimate — Christiania und die Azoren, die Ebenen von York-

*) Siehe S. 72.

Digitized by Google

ſhire und die Plateaus von Tibet, 3000 Fuß über dem Meere — mit.

Eine Kommiſſion, beſtehend aus den Herren Airy, Forbes, Kupffer, Philips, Brewſter, A. Thomſon und Ch. Martins, war beauftragt worden, einen in der Nähe von Edinburg vom Blitz zerſchmetterten Baum zu unterſuchen; ſie ſtellte eine Sprengung des Baumes feſt, deſſen Rinde und Splitter weit weggeſchleudert waren. Eins der Ausſchußmitglieder machte darauf aufmerkſam, daß dieſer vom Blitz getroffene Baum genau ſo beſchaffen war, wie die durch die Verdunſtung des Waſſerdampfes während der Waſſerhoſen von Chatenay, Monville u. ſ. w. geſpaltenen Bäume, ſo daß die elektriſche Natur jener nicht länger bezweifelt werden kann.

Wir ſagten, daß die Abtheilung für Geologie die beſuchteſte geweſen ſei; die Mitglieder derſelben haben dieſen Eifer auch zu rechtfertigen geſucht, und der Vorſitzende, Herr Murchiſon, hat die Verhandlungen mit hoher Einſicht und Unparteilichkeit geleitet. Die Abhandlungen waren danach gruppirt, allgemeine Diskuſſionen herbeizuführen; letztere waren voll Leben und Intereſſe, ohne daß irgend einer der Redner ſich je von den Regeln der vollkommenſten Höflichkeit entfernt hätte. Der Vorſitzende machte ſeine Entdeckung von dem Steinkohlengebirge angehörenden Lagern in der Kette des Forez in der Umgegend von Vichy bekannt. Herr Edward Forbes zeigte, daß die neokomiſchen Schichten (Purbeck-Schichten) der Küſte von Dorſet ſehr zahlreiche Abwechſelungen von Süßwaſſermuſcheln, den tertiären Arten ſehr ähnlich, darbieten, während die Seemuſcheln weſentlich davon abweichen. Eine ganze Sitzung war der Unterſuchung über den Urſprung der gereifelten Felſen, der erratiſchen Blöcke, der geſtreiften Kieſel und des in der Umgegend von Edinburg ſie einſchließenden Thones gewidmet. Die Meinungen waren getheilt zwiſchen denen, welche meinen, daß

Digitized by Google

Schottland ehedem, wie Spitzbergen noch heute, mit Gletſchern bedeckt geweſen iſt, und Andern, welche die fraglichen Phänomene vom Norden gekommenen Eisbergen zuſchreiben. Wie dem auch ſei, beide Hypotheſen ſetzen gleichmäßig das Vorhandenſein der Gletſcher in Gegenden voraus, wo ſie gegenwärtig nicht mehr vorhanden ſind, nur daß einige Geologen ihre Ausdehnung mehr als andere beſchränken. Die alte Annahme von diluvialen Fluten fand keinen Anwalt. Herr Murchiſon legte ſodann eine Skizze der geologiſchen Karte von Spanien unſeres Landsmannes, Herrn Verneuil, vor, indem er ſeinem Eifer und ſeinem Talent eine Huldigung darbrachte, welche mit einſtimmigem Beifall aufgenommen ward. Desgleichen machte er die ſchönen und gelehrten Unterſuchungen eines andern Franzoſen, des Herrn Barrande, früheren Erziehers des Grafen von Chambord, über die Foſſilien der unteren Gebirgsarten Böhmens bekannt. Allein und ohne Unterſtützung irgend welcher Art ſetzt Herr Barrande ſeine Zeit und ſein beſcheidenes Vermögen daran, die Thiere bekannt zu machen, welche zuerſt auf der Erdoberfläche erſchienen und um Millionen von Jahren nicht nur dem Menſchen, ſondern auch den großen Säugethieren und Reptilien, welche jüngere Schichten bergen, vorangegangen ſind. Welcher Einſichtige begriffe nicht, wie belangreich es iſt, die erſten Spuren des Lebens auf der Oberfläche dieſes alten Erdballes, den wir erſt ſeit geſtern bewohnen, aufzuſuchen. Die Geologie Schottlands ſollte und hat auf dem Kongreſſe eine bedeutende Rolle geſpielt. Ein junger Pair, einer der größten Namen der nationalen Geſchichte, der Herzog von Argyle, las eine Arbeit über die Geologie von einem Theil ſeines eigenen Gebietes. Es war ein erhebendes Schauſpiel, zu ſehen, wie dieſer junge Mann, Herr eines großen Vermögens, die edlen Genüſſe des Geiſtes aufſuchte und ſeinen Mitbürgern die Frucht ſeiner Arbeiten darbot, über welche er ſich das aufgeklärte Urtheil der Meiſter der Wiſſenſchaft

Digitized by Google

erbat. Möchte ein derartiges Beiſpiel Nachahmer bei uns finden! Möchten diejenigen, welche in Frankreich hiſtoriſche Namen tragen, ſich des Grafen von Buffon, des Präſidenten Malesherbes, Duhamels de Monceau, des Herzogs von Chaulnes erinnern, ſtatt der Parteihäupter, welche Frankreich getheilt und zerriſſen haben!

Hätte ich über mehr Raum zu gebieten, ſo würde ich über die belangreichen Denkſchriften ſprechen, welche bei der Abtheilung für Botanik und Zoologie eingereicht waren; die Unterſuchungen von Henry Strickland über den Dodo, einen Vogel der Isle de France, welcher ſeit dem vorigen Jahrhundert gänzlich verſchwunden iſt; die von Royle über die Veränderungen, welche die Kultur in den Eigenſchaften der Baumwolle hervorbringt, die Bedingungen, unter welchen die Samenkörner ihre Lebenskraft bewahren, und die angeſtellten Verſuche, Farne in künſtlichen Atmoſphären leben zu laſſen, um die Frage über den Urſprung der Steinkohle aufzuklären, die bekanntlich großentheils aus Pflanzen dieſer Familie gebildet iſt; auch will ich die Abhandlung des Profeſſors Parlatore aus Florenz über die beſondern Organe, welche ſich im Stengel der Waſſerpflanzen finden, anführen.

Es drängt mich zur Statiſtik und Staatswirthſchaft zu kommen, Wiſſenſchaften von allgemeinerem und unmittelbarerem Intereſſe als die phyſikaliſchen und Naturwiſſenſchaften.

Herr Strang, Schatzmeiſter der Stadt Glasgow, las einen Bericht über das Wachsthum dieſer Stadt; wir entnehmen demſelben eine Ueberſicht mit um ſo größerem Vergnügen, als derſelbe eine Vorſtellung von der ungeheuern Entwickelung der großen Manufakturſtädte Englands geben wird. Die amtliche Stellung des Verfaſſers und die Sorgfalt, womit er ſeine Arbeit unternommen hat, berechtigen uns, ſeinen Ergebniſſen vollen Glauben zu ſchenken.

Digitized by Google

Glasgow bietet den auffallenden Charakterzug dar, daß es alle Arten des Gewerbfleißes verbunden mit einem ſehr lebhaften Exporthandel darbietet; ſo findet man hier die Spinnereien Mancheſters, die Zeugfabriken Norwichs, die Seidenmanufakturen Macclesfields, die Hüttenwerke Birminghams, die Glas- und Töpferwaaren Newcaſtles, Handel und Gewinnung der Steinkohle, kurz alle in den einzelnen Städten Großbrittanniens zerſtreuten Induſtriezweige beiſammen. Glasgow iſt eine der älteſten Städte Schottlands; die Gründung ſeines Domes erſtreckt ſich bis in den Anfang des 11. Jahrhunderts zurück, als induſtrielle Großſtadt iſt ſie eine der neueſten Schottlands. Hier der Fortſchritt ſeiner Bevölkerung ſeit Anfang dieſes Jahrhunderts:

1801 . . .	77,385	Einwohner
1811 . . .	100,749	„
1821 . . .	147,043	„
1831 . . .	202,427	„
1841 . . .	282,134	„
1850 . . .	367,800	„

Demnach hat ſich ſeine Bevölkerung ſeit fünfzig Jahren um das Fünffache vermehrt, und der jährliche Zuwachs beläuft ſich auf etwa 2000 Seelen.

Dieſer Zuwachs rührt nicht von vermehrten Geburten, ſondern von einer fortwährenden Einwanderung her; auch zählt die Stadt, welche im Jahre 1800 nur 55 Kilometer an Straßen enthielt, gegenwärtig 177. Welches ſind die Urſachen dieſer ungeheuern Zunahme? 1) Seine Lage inmitten eines reichen Steinkohlen- und Erzdiſtriktes, 2) ſein Fluß, welcher durch Kunſt ſchiffbar gemacht iſt. Zu Anfang des Jahrhunderts ging die Tiefe des Clyde an vielen Stellen nicht über 1,50 M. hinaus, und nur mühſam vermochten Fahrzeuge von 30 bis 40 Tonnen denſelben hinaufzufahren; jetzt beträgt die mittlere

Digitized by Google

Tiefe bei Flut 4,8 M. und bei Hochflut im Frühjahr 5,8 M., auch können Fahrzeuge von 1000 Tonnen bis Glasgow hinaufgehen, und Dampfſchiffe von 2000 Tonnen, überdies noch mit ihrer Maſchine belaſtet, gehen von den Quais deſſelben ab. Im Jahre 1850 ſind 392,033 Tonnen durch Segelſchiffe, 873,159 durch Dampfer zugeführt worden. Die Einnahme an Tonnengeld, welche im Jahre 1820 82,000 Francs betrug, belief ſich im Jahre 1850 auf 1,606,100 Francs, hat ſich alſo binnen 50 Jahren zweimal um das Zehnfache vermehrt. Dieſes Reſultat iſt nicht ohne bedeutende Ausgaben erzielt worden, produktive Ausgaben, welche hohe Zinſen tragen. Eine Unterſuchung der Zollabgaben führt zu denſelben Ergebniſſen. Die Marine von Glasgow, erſt von geſtern ſtammend, iſt bereits bedeutend; vor dem Jahre 1812 gab es noch keine der Kaufmannſchaft von Glasgow angehörende Schiffe, jetzt giebt es ihrer 507, mit einem Tonnengehalt von 137,999.

Die erſte Dampfmaſchine, um die Spulen einer Baumwollenmanufactur in Bewegung zu ſetzen, ward im Jahre 1792 in Glasgow eingeführt, gegenwärtig giebt es in dieſer Stadt 1,800,000 Spulen, welche jährlich 120,000 Ballen Baumwolle einrollen.

Die Zahl der Hochöfen für die Eiſeninduſtrie betrug im Jahre 1830 16, im Jahre 1849 79; ſie produziren jährlich 475,000 Tonnen Gußeiſen.

Glasgow brennt jährlich 132,000,000 Kubikmeter Leuchtgas. Das Waſſer wird durch zahlreiche Leitungen in der ganzen Stadt und in allen Stockwerken der Häuſer vertheilt, ein bedeutender Theil dieſes Waſſers wird 74 Meter hoch gehoben, und zieht man dasjenige, was in den Hüttenwerken verbraucht wird, ab, ſo ſtellt ſich heraus, daß jeder Einwohner täglich etwa 120 Liter verbraucht. Addirt man die von drei Geſellſchaften für die gewerblichen und häuslichen Bedürfniſſe der Stadt ge-

Digitized by Google

lieferte Wassermenge zusammen, so gelangt man zu der ungeheuern Zahl von 54,000,000 Liter im Tage, während in Paris, der Hauptstadt Frankreichs, Wasser und Licht nicht in der ganzen Stadt zirkuliren. In den Häusern steht man noch bei den mit dem Namen Wachskerzen (bougies) beehrten Talglichten, beim Petroleumöl und dem Wasserträger, während in Schottland selbst die in einem gewissen Umkreise der Städte gelegenen Landhäuser wie sie beleuchtet und bewässert werden.

Herr Strang beschränkt sich nicht darauf, das Bild des Wohlstandes und der Fortschritte der Stadt zu entwerfen, welche ihm die Verwaltung ihrer Finanzen anvertraut hat, als ächter Philanthrop und strenger Statistiker zeigt er uns auch die Kehrseite der Medaille, die Armuth neben dem Reichthum. Im Jahre 1784 verausgabte Glasgow nur 27,050 Francs für seine Armen, jetzt beläuft sich diese Ausgabe jährlich auf eine Million. Ein Beweis von dem tiefen Elend eines Theils der Bevölkerung ist die Anzahl der auf Gemeindekosten stattgefundenen Begräbnisse, welche in jedem der letzten Jahre nicht weniger als etwa 4000 betrug. Die Verbrechen und Vergehen bieten auch eine betrübende Gesammtsumme dar, da im Jahre 1849 3194 Männer und 1825 Frauen vor den Strafpolizeirichtern erschienen sind und die Zahl der für längere oder kürzere Zeit gefänglich eingezogenen Personen sich auf 5088 belaufen hat.

Trotz dieser bedauernswerthen Schatten im Gemälde der Blüthe Glasgows schreitet diese Stadt doch auf der Bahn der Humanität vorwärts. Je mehr seine Manufakturen zunehmen und sein Handel sich ausbreitet, desto mehr Armenhäuser, Hospitäler und Versorgungskassen gründet und errichtet der Wohlthätigkeitssinn und ist er darauf bedacht, jene Plage, die Armuth, welche sich wie eine Pest an die blühendsten Städte und glücklichsten Staaten zu heften scheint, zu verringern. Und da der

Digitized by Google

Gegenſatz zur allgemeinen Wohlfahrt die Häßlichkeit des Elends noch erhöht, ſo ſcheint es, als ob die Dürftigkeit in England noch entſetzlicher ſei, als in Spanien, Portugal oder Italien, wo die Natur den Armen nicht von dem herrlichen Tiſche ausſchließt, den ſie freigebig allen ihren Kindern anbietet, ſondern ihn zur Theilnahme an dem Glücke und den Vergnügungen zuläßt, welche unter einem rauhen Himmel und auf einer kargen Erde das ausſchließliche Vorrecht der Wohlhabenden ſind.

Ich kann die Statiſtik nicht verlaſſen, ohne einige Worte über die Unterſuchungen des Herrn Porter hinzuzufügen, jenes Freihandelsapoſtels, der von ſeinen Glaubensgenoſſen zu Paris, ſobald das Glück ſie zur Regierungsgewalt gelangen läßt, beſtändig im Stiche gelaſſen wird. Die Sektion lauſchte mit lebhaftem Intereſſe ſeiner Arbeit über die freiwilligen von den Arbeiterklaſſen gezahlten Steuern, die enormen Summen nämlich, welche den Reichen und dem Staate die künſtlichen Bedürfniſſe des Armen einbringen. Es giebt nichts Beredteres als die folgenden Zahlen. Die Arbeiter Englands, Schottlands und Irlands geben jährlich an gegohrenen Getränken (Branntwein, Gin, Whisky, Rum) 402,286,450 Francs, den fünften Theil des Budgets von Frankreich, aus! Man wundere ſich alſo nicht, wenn der Mißbrauch der ſtarken Getränke in Großbrittannien der Art iſt, daß er eine ernſtliche Gefahr für die Geſellſchaft wird; er iſt eine Geißel, welche die ganze Beſorgniß redlicher Menſchen erregt, denn ſie iſt die Haupturſache jenes unheilbaren Elends der niedern Klaſſen. Danken wir dem Himmel, welcher geſtattet, daß die Rebe faſt auf der geſammten Oberfläche Frankreichs wächſt, denn der Wein berauſcht und erheitert den Armen, ohne ihn zu verdummen oder zu vergiften. Die Trunkenheit des Weins iſt eine Betäubung, die des Gin iſt der Tod.

Nach Schluß der Sitzungen fand eine abermalige General-

Digitized by Google

verſammlung ſtatt, wo die von der Geſellſchaft ausgeſetzten Unterſtützungen bekannt gemacht wurden, nämlich 7500 Francs für das meteorologiſche Obſervatorium von Kew bei London, die einzige Anſtalt in Europa, welche ausſchließlich der Beobachtung der atmoſphäriſchen Phänomene gewidmet iſt, 1250 Francs für die Herren Forbes und Kelland, um auf experimentalem Wege die mathematiſchen Geſetze der Wärmeverbreitung feſtzuſtellen, eine gleiche Summe für eine mit der Unterſuchung der chemiſchen und elektriſchen Einflüſſe der Sonnenſtrahlen und der Entwickelung der Pflanzen in künſtlichen Atmoſphären beauftragte Kommiſſion, endlich kleinere Summen für Experimente über die Lebensfähigkeit der Samenkörner, über die Luft und das Waſſer in den Städten, ſowie die periodiſchen Phänomene der Pflanzen und die Anatomie der Anneliden.

Die Arbeiten, von denen wir höchſtens den zwanzigſten Theil analyſirt haben, nahmen nicht jeden Augenblick des Kongreſſes in Anſpruch. Auch das Vergnügen hatte ſeinen Theil daran. Zwei geologiſche Ausflüge wurden unternommen, einer unter Leitung von Herrn Chambers, der andere unter der der Herren Maclaren und Murchiſon, um die Umgegend von Edinburg näher in Augenſchein zu nehmen. Die Botaniker begaben ſich auf die Hügel von Pentland, die Phyſiker beſuchten die Leuchtthürme an der Küſte auf einem Dampfboote, welches die Adminiſtration zu ihrer Verfügung geſtellt hatte. Zwei große Abendunterhaltungen wurden von der Stadt im Concertſaale gegeben. Endlich hielten drei Gelehrte, die Herren Bennet, Mantell und Nasmyth, Vorleſungen, der Erſtere über das Blut, der Zweite über die erloſchenen Rieſenvögel Neuſeelands und der Dritte über die Erſcheinungen auf der Mondoberfläche. Nicht ohne Grund rechne ich dieſe drei Sitzungen unter die der Geſellſchaft gegebenen Feſte, es waren geiſtige Feſte. Man ſtelle ſich z. B. Herrn Mantell vor prachtvollen, kolorirten Zeichnungen

Digitized by Google

redend vor, welche erſt die Küſte von Neuſeeland, wo dieſe Thiere gefunden worden ſind, ſodann dieſe Vögel ſelbſt in ihrer natürlichen Größe von 3 bis 4 Meter darſtellten, und vor dem Redner die ungeheuren Knochen, welche bewieſen, daß ſeine Reſtaurirung keineswegs ein Werk der Einbildung war; ferner ſeitwärts jene eigenthümlichen noch lebenden Vögel Neuſeelands, welche von der Natur der Flügel beraubt ſind und diejenigen im Kleinen darſtellen, denen ſie gefolgt ſind. Um Geſtalt und Erſcheinungen der Blutkügelchen zur Anſchauung zu bringen, hatte Herr Bennet ihnen den Umfang einer Untertaſſe geben laſſen, und die Erläuterungen des Vortragenden kamen an Klarheit dieſen Darſtellungen gleich. Endlich ſei noch Herrn Nasmyth's gedacht, der eine Stunde lang ſein ſtilles und aufmerkſames Auditorium durch die Gebirge, Thäler und ins Innere der Krater des Mondes führte.

Ein Kongreß ohne Diners iſt nicht denkbar; dieſelben waren zahlreich und vortrefflich; dasjenige aber, welches Profeſſor Syme, der erſte Wundarzt Schottlands, im Namen der mediziniſchen Fakultät der Univerſität Edinburg zum Beſten gab, war eins der glänzendſten. In einem herrlichen Garten, gegenüber dem grünen Hügel von Blackford, von wo Marmion ſein Heer betrachtete, und wo Walter Scott ſchon als Kind ſpielte und träumte,*) war ein eleganter Pavillon errichtet, exotiſche Stauden und Blumen ſchmückten den ganzen Umkreis deſſelben. Hundertundfünfzig Gäſte nahmen an einer langen Tafel Platz, die Muſik eines Regiments Bergſchotten wechſelte mit dem düſtern Geſumm von ſechs Dudelſackpfeifern in Nationaltracht ab. Beſſer als Alles, was ich geleſen, hat mir dieſe eintönige, unausgeſetzte, raſt- und ruheloſe Muſik eine Vorſtellung von jenen blutigen Schlachten gegeben, in denen die Schotten ihre Feinde

*) Marmion, IV. Geſang, 24. Strophe.

Digitized by Google

von Tagesanbruch bis in die Nacht hinein bekämpften, so lange der Dudelsack sich hören ließ und ein Lebensodem ihre erschöpften Leiber belebte. Bei Herrn Syme jedoch waren diese Dudelsäcke nur dazu da, den Appetit der Gäste, der durch die an der Tafel sich folgenden ausgesuchten Gerichte und köstlichen Weine bereits hinlänglich gereizt war, rege zu erhalten. Eine Menge eleganter Damen schweiften in den Gartenanlagen umher; als die offiziellen Toaste auf die Königin, die Armee und die Marine, sowie auf die Rettung des Seefahrers Franklin ausgebracht waren, rief ein Gentleman aufstehend und das Glas erhebend aus: The ladies! (die Damen!), worauf rauschender Beifall, wiederholte Bravos folgten. Herr Syme, dessen Fest der Himmel so sehr begünstigt hatte, an demselben Tage, wo ein Platzregen Paris überschwemmte, konnte sich in einer Anwandlung von Dankbarkeit nicht enthalten, einen Toast auf das schöne Wetter vorzuschlagen, diesen in Schottland so seltenen Gast, der sich aber, seit die Brittische Gesellschaft tagte, dort unveränderlich festgesetzt zu haben schien. Nach diesem Toast wurden andere auf die Stadt Edinburg, die Universität, den Präsidenten der Gesellschaft, den berühmten David Brewster, die Fremden u. s. w. ausgebracht. Nachdem unter letzteren mehre im Namen ihres Vaterlandes gesprochen, erhob sich der einzige bei diesem Banket gegenwärtige Franzose und sprach: „Ich bringe einen Toast aus auf das Gedeihen Schottlands, dessen Geschichte eng mit derjenigen Frankreichs verknüpft ist. (Beifall.) Ich bringe einen zweiten Toast aus auf die stete Eintracht Großbrittanniens und Frankreichs als sicheres Unterpfand des Friedens der Welt und der Fortschritte der Civilisation!..." Wenn ich hundert Jahre lebte, ich würde nie den Ausbruch von Begeisterung vergessen, welcher diesen Worten folgte. Diese Engländer, welche für so kalt gelten, erhoben sich wie ein Mann, die Gläser schwingend mit dem Rufe: Hurrah for ever!.... Ich wünschte, ganz

Digitized by Google

Frankreich hätte ihren Beifallsſturm gehört und gleich mir begriffen, daß nichts die geſitteten Nationen Europas trennen darf, deren Einigkeit allein die Welt vor den Umſtrickungen des Deſpotismus und einem abermaligen Hereinbrechen der Barbarei zu retten vermag.

Digitized by Google

Die Alpengletſcher und ihre ehemalige Ausdehnung in den Ebenen der Schweiz und Italiens.

Im Monat Auguſt 1815 kam ein Geologe von einer langen Exkurſion auf die Gletſcher zurück, welche den Hintergrund des Lourtier-Thales ausfüllen, das ſich von dem Hauptthale, welches zum Kloſter des großen St. Bernhard führt, ſeitlich abzweigt. Da er ſich am folgenden Tage über einen ſchwierigen und wenig bekannten Paß auf das Hoſpiz zu begeben wünſchte, ſo verbrachte er die Nacht in der Hütte eines Gemſenjägers Namens Jean Pierre Perraudin, welcher ihm am andern Tage als Führer dienen ſollte. Vor dem Herde ſitzend, auf welchem Alpenroſenbüſchel brannten, deren duftender Rauch oben durchs Dach abzog, plauderten der Geologe und der Aelpler von den Hochregionen, welche ſie beide ſo oft durchſtreift hatten. Bald fiel die Unterhaltung auf jene mächtigen Granitblöcke, welche man oft in ſo weiter Entfernung von den Felſen, von denen ſie ſich abgelöſt haben, antrifft. Der Geologe erklärte dem Bergbewohner lang und breit, wie die Gelehrten mit Hülfe ſcharfſinniger Berechnungen nachgewieſen hätten, daß dieſe erratiſchen Blöcke vordem durch große Waſſerſtröme verführt worden ſeien. Auf das Alles vermochte Jean Perraudin nicht

Digitized by Google

zu antworten, doch schüttelte er mit zweifelnder und ungläubiger Miene den Kopf. „Mich dünkt," sagte er endlich, „daß die Gletscher unserer Alpen ehemals weit ausgedehnter waren, als sie es jetzt sind. Unser ganzes Thal bis zu einer bedeutenden Höhe über dem Bergbache der Drance ist von einem mächtigen Gletscher erfüllt gewesen, welcher bis Martigny hinabreichte, wie es die Felsblöcke beweisen, welche man im Umkreise dieser Stadt findet, und die zu groß sind, als daß das Wasser sie hätte dahin führen können." Indem er so sprach, versah sich Perraudin nicht von ferne, eine große Entdeckung gemacht und mit seinem gesunden Menschenverstande ein Problem gelöst zu haben, welches die berühmtesten Geologen, ausgerüstet mit allen Hülfsmitteln der Wissenschaft, erfolglos in Angriff genommen hatten.

Zum Glück war der Gelehrte, dem er das Resultat seiner einsamen Beobachtungen mitgetheilt hatte, ein praktischer Mann, der sich mehr um Thatsachen, als um Theorien kümmerte. Das Samenkorn, welches der Bauer in seinen Geist gestreut, entwickelte sich in demselben frisch und frei, und die Idee einer ehemaligen Ausdehnung der Gletscher über ihre gegenwärtigen Grenzen hinaus ward zwanzig Jahre lang der beständige Gegenstand seiner Untersuchungen und seines Nachdenkens. Einer seiner Freunde, ein Ingenieur, Herr Venetz, war seinerseits durch das Studium der erratischen Blöcke von Wallis zu denselben Ansichten hingeleitet worden. Endlich im Jahre 1834, als seine Ueberzeugung vollständig und durch zahlreiche und unwiderlegliche Beweise gestützt war, ließ Herr de Charpentier (denn dieser war der Vertraute Perraudin's gewesen) seine Meinungen auf dem Kongresse der zu Luzern versammelten Schweizer Naturforscher laut werden. Wie jede neue Idee ward auch diese kalt aufgenommen oder verächtlich zurückgewiesen; aber da sie eine Wahrheit war, so brach sie sich ganz allein

Digitized by Google

Bahn, und heute ist sie eine der bestaufgeklärten Fragen unter allen denen, welche das geologische Publikum bewegt haben. Dank den zahlreichen über diesen Gegenstand erschienenen Arbeiten*) hat das erst in den Alpen beobachtete Phänomen die Verhältnisse einer langen Kälteperiode angenommen, welche über einen beträchtlichen Theil der beiden Erdkugeln herrschte. Wenn der menschliche Geist sich eines Tages zu der Ursache dieser Gletscherperiode aufzuschwingen vermag, so wird er helles Licht auf die letzte Phase der geologischen Geschichte des Erdballs, auf die geheimnißvolle, dem Erscheinen des Menschen auf der Erde unmittelbar gefolgte Epoche und auf jene Ueberschwemmungen geworfen haben, deren Spuren sich noch in sämmtlichen Ueberlieferungen der Völker Asiens, Europas und beider Hälften Amerikas vorfinden. Der enge Zusammenhang, welcher diese beiden Phänomene mit einander verknüpft, kann nicht bestritten werden, denn er wird uns durch das Nachdenken und durch die Beobachtung zugleich bezeugt. Trotzdem wollen wir das Studium der Gletschererscheinungen in allen den Ländern, wo sie angezeigt worden sind, nicht weiter verfolgen, sondern uns darauf beschränken, sie in den Alpen näher zu betrachten, wo die Thatsachen, wohl bekannt und besser gewürdigt, alljährlich von zahlreichen Reisenden beglaubigt werden können.

Sind die Gletscher der Schweiz und Savoyens stets auf ihre gegenwärtigen Grenzen beschränkt gewesen, oder haben sie sich

*) Unter diesen Arbeiten wollen wir die der Herren Agassiz, Desor, A. Guyot, J. Forbes, Studer, A. Escher von der Linth, Blanchet, Alph. Favre, de Mortillet, Hogard, Tyndall, Ramsay, Heer, Gastaldi und Omboni in den Alpen; Leblanc, Renoir, Hogard u. E. Collomb in den Vogesen; Agassiz, Lyell, Buckland, Smith, Maclaren, Ramsay in Schottland, England und Irland; Al. Brongniart, Selfström, Keilhau, Böthling, Siljeström, Daubrée, Murchison, de Verneuil, Durocher, Kjerulf, Nordenskjöld und A. Torell in Finland und Skandinavien; Agassiz, Desor, Hitchcock und Darwin in Amerika; Hochstetter in Neuseeland u. s. w. anführen.

Digitized by Google

ehedem in den großen, die Alpenkette umgebenden Ebenen ausgebreitet? So lautet die Frage, möglichſt einfach ausgedrückt. Meine Abſicht iſt, die Thatſachen darzulegen, worauf ſich die Verfechter der ehemaligen Ausdehnung der Gletſcher ſtützen. Um dieſer Idee Geltung zu verſchaffen, haben ſie bei den Gelehrten altgewurzelte Ueberzeugungen, geſtützt auf die unantaſtbarſten Autoritäten in der Geologie, und bei der großen Menge das Zeugniß der bibliſchen Ueberlieferung und dasjenige aller unſerer Sinne zu bekämpfen gehabt, welche ſich bei dem bloßen Gedanken ſträuben, daß dieſe ſo fruchtbaren und bevölkerten Ebenen während langer Perioden unter einer unermeßlichen Schnee- und Eisdecke begraben geweſen ſein ſollen. Beide haben das Recht, zahlreiche und ſichere Beweiſe dafür zu verlangen; dieſe Beweiſe ſind vorhanden; bevor wir dieſelben jedoch unterſuchen, iſt es unerläßlich, einige Vorſtellungen von den gegenwärtigen Gletſchern zu gewinnen, denn die Methode, welche von jenen Geologen befolgt wurde, denen man die Reſultate, welche wir darlegen werden, zu verdanken hat, iſt immer diejenige geweſen, welche Conſtant Prévoſt und Lyell in die Wiſſenſchaft eingeführt haben, und die ſich in die Worte zuſammenfaſſen läßt: „Die Wirkungsart der natürlichen Elemente unterſuchen, welche wir vor unſeren Augen thätig ſehen, und die Wirkungen, welche ſie hervorrufen, mit denjenigen vergleichen, deren Eindruck die Oberfläche des Erdballs bewahrt hat.“ Indem wir ſo verfahren, werden wir ſehen, daß man überall in den ungeheuren Ebenen, welche die Alpen umgeben, den Spuren jener gigantiſchen Gletſcher begegnet, wovon die heutigen ſozuſagen nur ein Bild im Kleinen ſind. Allein obgleich auf geringe Verhältniſſe zurückgeführt, bieten uns die gegenwärtigen Gletſcher doch im Kleinen all' die Erſcheinungen dar, welche die Eisdecken ehedem in größerem Maßſtabe darboten. Die Wirkungen ſind dieſelben, und aus ihrer Identi-

Digitized by Google

tät können wir auf die der Kräfte ſchließen, welche ſie hervorgerufen haben.

Jetzige Gletſcher.

Von der Höhe der Jurakämme, welche das Becken des Genfer Sees beherrſchen, umfaßt man mit Einem Blicke die ganze Alpenkette vom Wallis bis zum Dauphiné. Die rieſige Maſſe des Montblanc, auf ihrer breiten Baſis thronend, erhebt ſich majeſtätiſch über dieſem langen zackigen Grat. Die höchſten Zinken unterſcheiden ſich von den minder hohen Gipfeln durch die blendende Weiße des ſie bedeckenden Schnees. Im Sommer bildet die untere Grenze dieſes ewigen Schnees eine gerade, ſcharfgezogene, horizontale Linie, welche gegen das dunkle Grün der am Fuße der Berge ſich ausbreitenden Waldungen abſticht. Ueber derſelben herrſcht allein der Winter, unterhalb verfolgen die Jahreszeiten ihren regelmäßigen Lauf. Oberhalb iſt Leben kaum vorhanden und wird nur durch einige Alpen-Pflanzen und einige Eintagsinſekten vertreten, unterhalb giebt es ſich unter tauſend verſchiedenen Formen kund, von den höchſten Regionen an, wohin ſich nur Arve und Gemſe wagen, bis hinab in die von den Menſchen bewohnten Ebenen, wo die Ernten gelben und der Weinſtock ſeine Trauben reift.

In der Schweiz liegt die untere Grenze des ewigen Schnees 2700 Meter über dem Meeresſpiegel; wenn man ſich aber den Alpen nähert und in die engen Thäler eindringt, welche in die Hauptmaſſive, wie die des Montblanc, des Monte Roſa, des St. Gotthardt, der Jungfrau, einſchneiden, ſo gewahrt man, daß dieſe Grenze keine gerade Linie iſt, wie ſie es zu ſein ſcheint, wenn man ſie aus der Ferne betrachtet. Die ewigen Schneefelder entſenden ſozuſagen Zweige, welche in die Thäler unter der Form von Eismaſſen, ähnlich gefrorenen Bergſtrömen, hinabſteigen. Dieſe Maſſen ſind *Gletſcher*. Ihr Fuß liegt oft

Digitized by Google

mehr als 1500 Meter unter der Grenze des ewigen Schnees und tritt oft dicht an größere Dörfer, wie Chamouni, Courmayeur und Grindelwald heran, deren durchschnittliche Höhe 1120 Meter über dem Meere beträgt. Doch giebt es eine bedeutende Anzahl von Gletschern, welche nicht so tief herabsteigen und an jenen hohen Abhängen stillstehen, wo man nur noch zerstreute Sennhütten antrifft, welche blos einige Monate im Jahre bewohnt werden.

Welches sind die Beziehungen, die zwischen diesen Gletschern und den Schneefeldern, mit denen sie zusammenhängen, obwalten? Das ist die erste Frage, welche wir untersuchen müssen. Die Wissenschaft hat sie bereits gelöst. Im Winter, Frühling und Herbst fallen auf den Alpengipfeln beträchtliche Schneemassen.*) Dieser von den Winden weggefegte, von den Wirbeln fortgeführte Schnee häuft sich namentlich in den großen an die Hochgipfel grenzenden Vertiefungen auf. Diese Vertiefungen sind unter dem Namen Cirkus bekannt, denn sie enden gewöhnlich in einem halbkreisförmigen Raume, welcher von hohen Spitzen umgeben ist. Dergleichen sind in der Nähe von Chamouni der Cirkus, welcher auf den Col du Géant, jenes große Plateau führt, welches nur 800 Meter unter dem Gipfel des Montblanc liegt; bei Grindelwald der Cirkus, welcher auf die Strahleck führt; bei der Grimsel die des Lauteraar und Finsteraar. Der Schnee, welcher sich in diesen Mulden anhäuft, bleibt nicht auf einer Stelle liegen, er ist mit einer fortschreitenden Bewegung begabt, welche ihn nach dem Thale hinzieht. Aehnlich jenen Seen, welche einen Fluß speisen, und deren Gewässer langsam zu fließen anfangen, sobald der Einfluß des Gefälles sich

*) Die Höhe des auf der Grimsel, 1860 Meter über dem Meere, gefallenen Schnees hat seit dem Monat November 1845 bis zum Monat April 1846 16,60 M. betragen. Die aus dem Schmelzen dieses Schnees sich ergebende Wasserschicht würde 1,40 M. Dicke gehabt haben.

Digitized by Google

fühlbar zu machen anfängt, können diese Schneefelder auf sehr schwach geneigten Bodenflächen hingleiten. Je mehr dieser Schnee in die gemäßigten Regionen hinabsteigt, unterliegt er, namentlich in der schönen Jahreszeit, wichtigen Veränderungen, welche die Natur und das Aussehen desselben vollständig verändern: er verwandelt sich in Eis. Hier die Art, wie diese Verwandlung vor sich geht. Vor der Wärme der Sonnenstrahlen beginnt die Oberfläche des Schnees zu schmelzen; das aus diesem Schmelzen hervorgehende Wasser sickert in die unteren Schichten, welche sich unter dem Einflusse der Nachtfröste in eine körnige Masse verwandeln, die aus kleinen, noch lockeren Schollen besteht, welche aber doch schon mehr unter sich zusammenhängen als die Flocken, welche ihnen das Dasein gaben. Dieser Zustand des Schnees ist von den Schweizer Physikern mit dem Namen Firn (névé) bezeichnet worden. Den ganzen Sommer hindurch wird dieser Firn von neuen Wassermassen durchsickert, welche immer von dem Schmelzen an der Oberfläche oder dem des umgebenden Schnees herrühren, dessen Gewässer sich in der Vertiefung sammeln, welche die Wiege des Gletschers bildet. Da das Thermometer in diesen Regionen, selbst mitten im Sommer, allnächtlich unter Null sinkt, so gefriert dieser Firn zu wiederholten Malen. In Folge dieses abwechselnden Schmelzens und Gefrierens bietet er den Anblick eines weißen, kompakten, aber von einer zahllosen Menge sphärischer und sphäroidischer Luftbläschen erfüllten Eises dar: es ist das Gletschereis oder blasige Eis (glace bulleuse) der Autoren, welche über diesen Gegenstand geschrieben haben. Da das Durchsickern und Gefrieren der Masse immer vollständiger wird, je mehr der Gletscher zu den bewohnten Regionen hinabsteigt, so ersetzt das Wasser endlich sämmtliche Luftbläschen; dann ist die Verwandlung vollständig, das Eis erscheint gleichartig und bietet jene schönen azurblauen Tinten dar, welche das Entzücken der Rei-

Digitized by Google

senden bilden. Das ist in wenig Worten die Geschichte der Gletscherbildung; in Wirklichkeit bestehen sie, wie man sieht, aus allen den seit einer langen Reihe von Jahren angehäuften Schneeschichten, die sich allmälig in mehr oder minder festes Eis verwandelt haben.

Wenn die Sommerhitze nicht das Anwachsen der Gletscher beschränkte, so würden sie unendlich an Länge und Mächtigkeit zunehmen; jeder Sommer aber sieht eine beträchtliche Dicke der Eisoberfläche schwinden*); es ist dies das Phänomen, welches Herr Agassiz mit dem Namen Abschmelzung (ablation) bezeichnet hat. Zu gleicher Zeit schmilzt das untere Ende rasch, und der Gletscher würde mit jedem Jahre abnehmen, wenn ein unaufhörliches Vorrücken dieser Wirkung nicht die Wage hielte. So stellt sich eine Art von Gleichgewicht her zwischen der Sommerschmelze einerseits und dem jährlichen Vorrücken andererseits. Ist die Jahreszeit heiß und trocken, so ist es das Schmelzen, was überwiegt, und der Gletscher zieht sich zurück, ist der Sommer kalt und regnerisch, so wiegt das Vorrücken reichlich die Wirkungen des Schmelzens auf, und der Gletscher rückt vor.

Man begreift gegenwärtig, welches die Einflüsse sind, die den Gletschern eine mittlere Grenze anweisen, um die herum sie schwanken können. Weniger leicht ist es, sich Rechenschaft davon zu geben, warum gewisse Gletscher in die bewohnten Thäler hinabsteigen, während andere an den Seiten der höchsten Berge hängen bleiben. Diese Unterschiede rühren von der Größe und Höhe der Mulden ab, welche zur Speisung dieser Gletscher dienen. Je größer und höher diese Mulden, und je beträchtlicher die daselbst sich ansammelnden Schneemassen sind, desto weiter werden die Abflüsse der Schneefelder auch in die Tiefthäler hinabsteigen und sozusagen das Terrain wieder gewinnen,

*) Auf dem Aargletscher etwa drei Meter.

Digitized by Google

welches sie jedes Jahr durch das Schmelzen einbüßen. Auf diese Weise steigt der Glacier des Bossons, dessen Quelle sich auf dem großen Plateau des Montblanc, einem mächtigen, nahe an 4000 Meter über dem Meere gelegenen Cirkus, befindet, bis auf 1040 Meter herab und rückt inmitten der Wohnungen, Obstgärten und Aecker vor. Die Gletscher von Aletsch, Viesch, Grindelwald, Zermatt befinden sich im gleichen Falle. Alljährlich kann der erstaunte Reisende goldige Ernten zur Seite des Brenvagletschers, eines der hauptsächlichsten Abflüsse auf der Südseite des Montblanc, zu Gesicht bekommen; der Einfluß der Größe und Erhebung der Cirkus wiegt selbst, der Bemerkung des Herrn Desor zufolge, den der Lage auf und erklärt den überraschenden Umstand, daß die längsten und mächtigsten Gletscher der Berner Alpen sich am Südabhange der Kette befinden.

Wir haben gesehen, daß diese Gletscher von einer vorwärtsrückenden Bewegung belebt sind, welche sie nach der Ebene hinzieht. Welches sind die Gesetze dieser Bewegung? Das Aufsuchen dieser Gesetze hat die Physiker, welche sich dieser Art von Arbeiten widmeten, fortwährend beschäftigt, ohne daß sie bisher die Ursache dieses Vorrückens aus der Gesammtheit der eigenthümlichen Phänomene, welche es begleiten, abzuleiten vermocht hätten. Herr J. D. Forbes hat sie auf dem Eismeere von Chamouni studirt; doch sind auf den Aargletschern die Beobachtungen mit der meisten Sorgfalt und Ausdauer fortgesetzt worden. Seit dem Jahre 1842 haben sich die Herren Agassiz und Desor, durch die Mitwirkung der Herren Wild, Oz und Dollfus-Ausset unterstützt, unabläßig mit dieser Frage beschäftigt; sie haben festgestellt, daß dieser Gletscher in seinem mittleren Theile 71 Meter jährlich vorrückt. Gegen das untere Ende wird die Geschwindigkeit des Vorrückens so sehr gehemmt, daß sie nur noch 39 Meter beträgt, dagegen nach oben

Digitized by Google

etwas beschleunigt, wo der Gletscher jährlich einen Raum von 75 Meter zurücklegt. *)

Die Neigung des Abhanges, auf welchem der Gletscher herabsteigt, scheint keinen Einfluß auf die Geschwindigkeit seines Ganges zu haben, doch wird sie eigenthümlich modifizirt durch die Wände des Trichters, in welchem er sich bewegt. Die Reibung des Eises wider diese Wände hemmt das Vorrücken der Seitentheile des Gletschers bedeutend. Noch mehr; wenn ein Vorgebirge sich nach der Mitte des Thales vorschiebt, so windet sich der Gletscher, an einer seiner Seiten gehemmt, mit äußerster Langsamkeit um dieses Hinderniß herum oder diese Seite bleibt vielmehr zurück, während der mittlere Theil und der entgegen gesetzte Rand mit ihrer relativen Geschwindigkeit weiter ziehen.

---

*) Hier kurz die Methode, wie man das Vorrücken des Gletschers gemessen. Man wählte auf den beiden Ufern zwei einander gegenüberliegende Felsen aus; jeder dieser Felsen war mit einem weißen auf den Stein gemalten Kreuze bezeichnet; nun pflanzte man im Eise eine Reihe zwischen diesen beiden Punkten gerichteter Pflöcke derart auf, daß sie eine gerade, perpendikulär auf der Axe des Gletschers stehende Linie bildeten. Nach Verlauf mehrer Tage stellte sich ein Beobachter vor eins der Kreuze und richtete ein mit einer Wasserwage und einem Fadenringe versehenes Fernrohr auf dasjenige, welches gegenüber angebracht war. Da der Gletscher und die Pflöcke mit ihm gerückt waren, so befanden letztere sich nicht mehr in der ursprünglichen geraden Linie. Nun steckte ein auf dem Gletscher postirter Führer eine Stange, welche von einem deutlich sichtbaren Gegenstande überragt war, in der Richtung der alten Linie auf. Diese Richtung ward ihm durch die Signale des Beobachters, dessen Auge sich am Fernrohr befand, angedeutet. Dieser ließ die Stange so lange nach oben oder unten rücken, bis sie sich genau auf dem ursprünglich von dem Pflocke eingenommenen Punkte befand. Nachdem dies geschehen, maß der Führer auf dem Eise die Entfernung vom Fuße der Stange bis zu dem des Pflockes. Dieser Zwischenraum war genau die von dem Gletscher zwischen den beiden Beobachtungen durchlaufene Länge. Im Jahre 1846 ist dieses Verfahren von den Herren Dellfus, Oty und mir in der Weise vervollkommnet worden, daß es uns die tägliche von dem Aargletscher zurückgelegte Strecke mit einer solchen Genauigkeit zu verfolgen gestattete, daß der Beobachtungsfehler keine 2 Millimeter oder eine Linie etwa überschreiten konnte.

Digitized by Google

Von den jetzigen Gletſchern geglättete und gereifelte Felſen.

Die Reibung, welche der Gletſcher auf ſeinen Grund und auf ſeine Wände ausübt, iſt zu beträchtlich, um nicht Spuren auf den Felſen, mit denen er in Berührung kommt, zurückzulaſſen; ſeine Wirkung iſt aber je nach der mineralogiſchen Natur dieſer Felſen und der Geſtalt des Bettes, welches er einnimmt, verſchieden. Dringt man, die Eishöhlen benutzend, welche ſich zuweilen an ſeinen Rändern oder an ſeinem Ende öffnen, zwiſchen den Boden und die untere Fläche des Gletſchers, ſo kriecht man auf einer waſſergetränkten Schicht von Kieſeln und feinem Sande. Nimmt man dieſe Schicht weg, ſo erkennt man, daß der darunter liegende Fels durch die Reibung abgeflächt, geglättet, geſchliffen und mit geradlinigen Streifen bedeckt iſt, welche bald kleinen Furchen, öfter noch ſchnurgeraden, wie mit einem Griffel oder ſelbſt mit einer ganz feinen Nadel radirten Strichen gleichen. Der Mechanismus, vermittelſt deſſen die Striche gravirt werden, iſt derſelbe, welchen die Induſtrie verwendet, um die Steine und Metalle zu poliren. Mit Hülfe eines feinen, Schmirgel genannten Pulvers reibt man die Metallfläche und verleiht ihr einen Glanz, der von dem durch eine zahlloſe Menge kleiner, äußerſt feiner Striche zurückgeworfenen Lichte herrührt. Die zwiſchen den Gletſcher und den darunter liegenden Fels geſchobene Kieſel- und Schlammſchicht iſt der Schmirgel. Der Fels iſt die Metallfläche, und die Gletſchermaſſe, welche die Schlammſchicht drückt und rückt, indem ſie beſtändig thalwärts zieht, vertritt die Thätigkeit der Hand des Polirers. Auch laufen die Striche, von denen die Rede iſt, ſtets in der Zugrichtung des Gletſchers; da dieſer aber kleinen Seitenabweichungen unterworfen iſt, ſo kreuzen ſich die Striche zuweilen, ganz kleine Winkel unter ſich bildend. Unterſucht man die Felſen, welche den Gletſcher einfaſſen, ſo trifft man dieſelben

Digitized by Google

radirten Striche auf denjenigen Theilen wieder an, welche mit der gefrorenen Maſſe in Berührung gekommen ſind. Ich habe mir oft ein Vergnügen daraus gemacht, das auf den Fels drückende Eis zu zerbrechen, und unter dieſem Eiſe fand ich dann geglättete und mit Strichen bedeckte Flächen. Die Kieſel- und Sandkörner, welche dieſelben gravirt hatten, ſaßen noch im Gletſchereis eingefügt, wie der Diamant des Glaſers am Ende des zum Glasſchneiden dienenden Inſtrumentes befeſtigt iſt.

Die Schärfe und Tiefe der Streifen hängt von mehren Umſtänden ab. Wenn der zur Stelle befindliche Fels kalkig iſt und der Schmirgel aus Kieſeln und Sand beſteht, der von härteren Geſteinen, wie Gneis, Granit oder Protogin, herrührt, ſo werden die Streifen ſehr markirt ſein. Man kann ſich hiervon am Fuße der Roſenlaui- und Grindelwaldgletſcher im Kanton Bern überzeugen. Gehört der Fels dagegen dem Gneis, Granit oder Serpentin an, d. h. iſt er ſehr hart, ſo werden die Streifen weniger tief und ſcharf ſein, wie man dies auf den Aar-, Zermatt- und Chamonigletſchern wahrnehmen kann. Der Schliff wird in beiden Fällen derſelbe und oft eben ſo vollkommen ſein, wie der des Marmors, welcher unſere Gebäude ſchmückt.

Die von dem Gletſcher auf die unterliegenden Felſen gravirten Striche laufen meiſt horizontal oder mit der Oberfläche deſſelben parallel. Bei den Verengungen der Thäler jedoch richten ſich dieſe Striche auf und nähern ſich der Vertikale. Dies darf nicht Wunder nehmen. Gezwungen, einen Engpaß zu überſchreiten, erhebt der Gletſcher ſich mit ſeinen Rändern und ſteigt an den Bergwänden, welche ihm den Durchgang verſperren, hinan. Dies ſieht man prächtig bei den Sennhütten der Stieregg, eines Engpaſſes, welchen der untere Grindelwaldgletſcher genöthigt iſt zu überſchreiten, bevor er ſich im Thale gleichen Namens ausbreitet. Auf dem rechten

Digitized by Google

Ufer des Gletſchers ſind die Streifen 45 Grad gegen den Horizont geneigt, auf dem linken Ufer erhebt derſelbe ſich zuweilen bis zu den benachbarten Forſten und reißt große Erdſchollen, mit Alpenroſenbüſchen und Eller-, Birken- oder Tannengruppen bedeckt, mit ſich fort. Weiches oder blättriges Geſtein wird durch die gewaltige Kraft des Gletſchers gebrochen und geſtürzt. Hartes Geſtein widerſteht ihm; allein die Oberfläche dieſer Felſen, abgeflächt, geſchliffen, geglättet und geſtreift, zeugt hinlänglich von dem ungeheuren Drucke, den ſie auszuhalten gehabt haben. So iſt auf dem Aargletſcher der Fuß des Vorgebirges, auf welchem ſich der Pavillon des Herrn Dollfus erhebt, in bedeutender Höhe polirt, und auf der thalaufwärts gewandten Seite habe ich um 64 Grad geneigte Streifen beobachtet. Das wider dieſe Böſchung aufgerichtete Eis ſcheint dieſelbe erklimmen zu wollen, allein der Granitfels hält Stand, und der Gletſcher iſt gezwungen, ſich langſam um ihn herumzuwinden.

Faſſen wir das Geſagte noch einmal zuſammen, ſo wirkt der beträchtliche Druck eines Gletſchers, verbunden mit ſeiner vorrückenden Bewegung, zugleich auf die Sohle und auf die Seiten des Thales, welches er durchzieht. Er glättet alle die Felſen, welche hinlänglich Widerſtand leiſten, um nicht von ihm niedergeriſſen zu werden, und drückt ihnen oft eine beſondere und charakteriſtiſche Form auf. Indem er alles Eckige an dieſen Felſen zerſtört, flacht er ſie oberhalb ab und rundet ſie bergwärts, während ſie thalwärts zuweilen ihre ſchroffen, rauhen und unebenen Formen bewahren. Allerdings iſt es begreiflich, daß die Gewalt des Gletſchers ſich hauptſächlich auf der dem Cirkus zugewandten Seite, woher er kommt, geltend macht, ebenſo wie die Pfeiler einer Brücke ſtärker ober- als unterhalb des Stromes von den Schollen, welche der Fluß im Winter mit ſich führt, beſchädigt werden. Von weitem geſehen, erinnert

Digitized by Google

eine Gruppe derartig abgerundeter Felsen an den Anblick einer Schaafheerde, daher der Name Rundhöcker (roches moutonnées), den ihnen Sauſſure gegeben hat, und der ihnen geblieben iſt.

Moränen und erratiſche Blöcke der jetzigen Gletſcher.

Noch eine andere Ordnung von Phänomenen ſpielt eine große Rolle in der Geſchichte der gegenwärtigen Gletſcher der Schweiz und derer, welche ſie ehemals bedeckten; ich will hier von den Felstrümmern jeglicher Größe und jeglicher Art, welche der Gletſcher mit ſich führt, ſprechen. Die Alpen ſind, dies ſagt uns ihr Anblick, ungeheure Ruinen. Alles wirkt zu ihrer Zerſtörung zuſammen, alle Elemente ſcheinen verſchworen zu ſein, ihre ſtolzen Gipfel zu erniedrigen. Die Schneemaſſen, welche während des Winters auf ihnen laſten, der Regen, welcher ſich während des Sommers zwiſchen ihren Schichten einſaugt, die plötzliche Wirkung der reißenden Bergwaſſer, und die langſamere aber noch mächtigere der chemiſchen Verwandtſchaften beſchädigen, lockern und zerſetzen die härteſten Felſen. Ihre Trümmer fallen von den Gipfeln in die von den Gletſchern eingenommenen Mulden, unter der Form mächtiger Bergſtürze, begleitet von einem fürchtbaren Getöſe und großen Wolken von Staub. Selbſt mitten im Sommer habe ich dieſe Lauinen von der Höhe der Schreckhorngipfel herabſtürzen und auf dem fleckenloſen Schnee einen langen ſchwarzen Streifen, beſtehend aus ungeheuren Felsblöcken und einer endloſen Zahl kleinerer Bruchſtücke, bilden ſehen. Im Frühjahr erzeugt ein ſchnelles Schmelzen des Winterſchnees oft gelegentliche Gießbäche von ungeheurer Gewalt. Geht das Schmelzen langſamer vor ſich, ſo bringt das Waſſer in die geringſten Felsſpalten ein, gefriert darin und ſpaltet die ſprödeſten Maſſen. Dieſe von den Gebirgen abgelöſten Blöcke haben zuweilen rieſige Verhältniſſe; man findet

Digitized by Google

solche, deren Länge 20 Meter erreicht, und solche, welche nach allen Seiten 10 Meter messen, sind in den Alpen nicht selten.

Rührte sich der Gletscher nicht, so würden diese Trümmer sich daselbst ohne die mindeste Ordnung aufthürmen; allein das Vorrücken desselben führt in der Vertheilung dieser Materialien eine gewisse Anordnung, ja eine gewisse höchst auffällige Regelmäßigkeit herbei. Die Blöcke vertheilen sich auf dem Gletscher in langen, mit seinen Ufern parallel laufenden Wällen, oder häufen sich am Ende unter der Form großer Querdämme auf. Diese wie jene sind mit dem Namen Moränen bezeichnet worden.

Nachstehend der Mechanismus der Bildung dieser Moränen.

Indem die Trümmer der umliegenden Berge auf die Ränder des Gletschers fallen, nehmen diese Trümmer an der Bewegung desselben Theil und rutschen mit ihm fort; da aber täglich andere Bergstürze hinzukommen, so reihen sie sich an die andern an, und alle vereint bilden jene langen Züge von Materialien, welche sich die beiden Ufer des Gletschers entlang erstrecken; — dies sind die Seitenmoränen. Ein Gletscher bietet oft mehre Seitenmoränen dar, weil die Erdfälle auf ungleich von der Mitte entfernte Punkte niederfallen, deren Geschwindigkeit daher auch verschieden ist. Die meisten Touristen, welche die großen Gletscher der Schweiz besucht haben, kennen diese Seitenmoränen, und mehr als einer erinnert sich noch mit Schmerzen der Beschwerden, welche er erduldet hat, um diese Haufen auf einander gethürmter Blöcke zu übersteigen. Es ist, als ob von Riesenhand ein Wall errichtet wäre, um den Zugang zu diesen ewigen Schneefeldern zu vertheidigen, wo die Natur das Geheimniß der letzten Umwandlungen unseres Erdballs verborgen hat. Nachdem der Reisende die Seitenmoräne überschritten hat, entdeckt er fast immer einen noch beträchtlichern

Digitized by Google

Wall, welcher der Länge nach über die Mitte des Gletſchers ſich hinzieht, und den man Mittelmoräne nennt. Dieſelbe entſteht aus der Verbindung zweier Gletſcher von faſt gleicher Mächtigkeit. Am Ende des ſie trennenden Vorſprunges lehnt ſich die linke Seitenmoräne des einen an die rechte Seitenmoräne des andern an. Dieſe beiden Seitenmoränen verſchmelzen alsbald zu einer einzigen und bilden die Mittelmoräne des neuen Gletſchers, der ſelbſt aus den beiden vereinigten Zuflüſſen beſteht. So ſieht man bei der Verbindung der Arve und der Rhone die trüben Gewäſſer des Bergbaches ſich in der Mitte des Zuſammenfluſſes mit den durchſichtigen Wellen des durch ſeinen Durchgang durch den Genfer See geklärten Fluſſes miſchen. Die Mittelmoräne nimmt an der Bewegung des mittlern Theiles des Gletſchers Theil; nach einer mehr oder minder langen Reiſe erreicht jeder Block ſeinerſeits den Schlußabhang, rollt die Böſchung deſſelben hinab und hält am Fuße dieſes Eiswalles inne. Auf dem Aargletſcher, deſſen Länge 8 Kilometer beträgt, braucht ein Block 133 Jahre, um den zwiſchen dem Vorgebirge des Abſchwung, welcher die beiden Hauptzuflüſſe trennt, und dem untern Ende liegenden Raum zu durchmeſſen. Die Anhäufung dieſer Blöcke bildet einen gegen dieſes Ende konzentriſch gerichteten Damm; es iſt dies die Endmoräne oder der Stirnwall, welcher ſich von allen bisher beſchriebenen dadurch unterſcheidet, daß er nicht auf dem Gletſcher, ſondern vor demſelben auf der Thalſohle ruht.

Wir kennen jetzt drei Arten von Moränen: die einen oberflächliche, über die Oberfläche des Gletſchers verbreitete, welche in Seitenmoränen und Mittelmoränen zerfallen, je nachdem ſie ſich auf den Seiten oder in der Mitte deſſelben befinden, und die Endmoräne, welche von der Anhäufung der an der Endböſchung des Gletſchers niederfallenden Blöcke herrührt, die auf dem Boden ruhen. Noch eine andere

Digitized by Google

Art von Moräne giebt es, nämlich die Sand- und Kieselschicht, welche zwischen die untere Fläche des Gletschers und den darunterliegenden Fels geschoben ist. Ich will sie mit dem Namen Grundmoräne (moraine profonde) bezeichnen, um sie von den oberflächlichen und Endmoränen zu unterscheiden.

Von den jetzigen Gletschern gestreifte Kiesel.

Langsam auf der Oberfläche des Gletschers verführt, bewahren alle Blöcke der oberflächlichen und Endmoränen ihre ursprünglichen Formen. Die Kanten dieser Blöcke sind scharf, die Winkel spitz, wie im Augenblicke, da sie auf das Eis fielen. Sie bieten nicht jene Spuren der Schleifung und Reibung dar, welche man auf den durch die Thätigkeit der Gewässer gerollten und gerundeten Steinen bemerkt. Man kann hübsche Gruppen von Krystallen, eben so unversehrt wie in ihrer ursprünglichen Lagerstätte, davon ablösen, denn außer dem ersten Falle, welcher sie auf den Gletscher stürzte, sind diese Massen seitdem keiner gewaltsamen Berührung unterworfen gewesen. Nur die Verwitterung kann sie zerbröckeln oder zersetzen; darum bewahren auch die aus hartem und sprödem Gestein bestehenden Blöcke oft die riesigen Verhältnisse, von denen die Rede gewesen.

Nicht so verhält es sich mit den Bruchstücken, welche nicht zu den oberflächlichen Moränen gehören. Die Seitenwände des Gletschers stehen keineswegs in unmittelbarer Berührung mit den Thalseiten, fast immer ist eine kleine Lücke zwischen ihnen befindlich. Eine Menge von Blöcken und Trümmern geräth zwischen diese Eiswand und die Felsen, welche sie glättet. Einige bleiben in dieser Lücke hangen, andere gewinnen allmälig die untere Fläche des Gletschers und bilden die Grundmoräne. Diesen Blöcken schließt sich ein Theil derjenigen an, welche in

Digitized by Google

die zahlreichen, von den unerfahrenen Reiſenden ſo ſehr gefürchteten Querſpalten und Brunnen fallen.*) Alle dieſe zwiſchen dem Fels und dem Gletſcher eingeſchloſſenen Trümmer, gepreßt, zerrieben, zermalmt von dieſer unaufhörlich thätigen Plattmühle, bewahren nicht die Verhältniſſe, welche ſie hatten, als ſie ſich von den Bergen ablöſten. Die meiſten verwandeln ſich in einen ganz feinen Schlamm, der, gemiſcht mit dem Waſſer, das von dem Gletſcher herabfließt, die Schlammſchicht bildet, worauf er ruht. Die übrigen tragen die unauslöſchlichen Spuren des Druckes, welchem ſie unterworfen waren, an ſich. Ihre Ecken ſtumpfen ſich ab, ihre Kanten verwiſchen ſich, ſo daß ſie die Form gerundeter Kieſel annehmen oder unregelmäßige Flächen darbieten, welche durch verlängerte Reibung entſtehen. Wenn der Fels weich iſt, wie es die Kalkarten ſind, ſo wird der Kieſel nicht nur gerundet, ſondern er bietet auch eine Menge in allen Richtungen gekreuzter Streifen dar. Dieſe geſtreiften oder geriebenen Kieſel ſind von großer Wichtigkeit für das Studium der ehemaligen Ausdehnung der Gletſcher, es ſind abgenutzte Münzen, deren Gegenwart faſt ſicher das ehemalige Daſein eines verſchwundenen Gletſchers verräth. In der That hat nur der Gletſcher die Macht, dieſe Kieſel ſo zu formen, abzuſchleifen und zu ſtreifen. Das Waſſer glättet und rundet ſie, ſtreift ſie aber nicht. Ja mehr, es löſcht die von den Gletſchern radirten Striche aus. Man kann ſich von der Wahrheit dieſer Thatſache am Fuße der Grindelwaldgletſcher überzeugen. 300 Meter unterhalb der Endböſchung rollen die Gewäſſer der aus demſelben hervorbrechenden Bäche nur noch runde, aber glatte und von Streifen gänzlich freie Kieſel. Ich habe

*) Einer dieſer von den Herren Dollfus, Oz und mir gemeſſenen Brunnen auf dem Aargletſcher hatte 58 Meter Tiefe. Auf dem Finſteraargletſcher hat Herr Deſor einen andern ſondirt und erſt bei 232 Meter unter der Oberfläche Grund gefunden.

Digitized by Google

mich auf's entschiedenste davon überzeugt. Edward Collomb hat die Frage seinerseits in experimentaler Weise gelöst. Er hat von den Gletschern gestreifte Kiesel genommen und sie mit Sand und Wasser in einen horizontalen Cylinder gethan, der nur fünfzehn Umdrehungen in der Minute machte. Nach Verlauf von zwanzig Stunden waren sämmtliche Streifen verschwunden. Auch würde man ihre Spur vergebens auf den von Gießbächen gerollten Kieseln oder auf den Strandsteinen suchen, welche die Gezeiten des Meeres fortwährend drehen und wenden, indem sie sie auf das sandige Ufer schleudern, um sie hernach wieder mit sich ins offene Meer zu führen.

Dank diesen Einzelheiten, sollen, so hoffen wir wenigstens, die Zeugnisse, welche wir als Nachweis der ehemaligen Ausdehnung der gegenwärtigen Gletscher anführen wollen, hinlänglich verständlich werden. Wir haben absichtlich Alles weggelassen, was keine unmittelbare Anwendung auf das Studium dieses großartigen Phänomens zuließ. Die Methode, welche wir befolgen, um diese ehemalige Ausdehnung zu beweisen, ist die einfachste und sicherste zugleich, welche man in der Geologie anwenden kann. Wir werden die Länder, welche die Alpen umgeben, durchstreifen und sehen, ob sie uns nicht unzweifelhafte Spuren von der Einwirkung der Gletscher darbieten. Wenn wir diese Spuren überall eben so zahlreich, eben so deutlich, wie in der Nähe der gegenwärtigen Gletscher, vorfinden, so werden wir unvermeidlich einräumen müssen, daß diese vordem in die Ebene hinein sich erstreckten und den Zwischenraum, welcher die Alpen vom Jura trennt, ausfüllten. Die ehemalige Ausdehnung der Gletscher wird nachgewiesen werden, auch ohne daß wir uns von den meteorologischen Störungen, welche sie bestimmt haben, Rechenschaft geben können; denn bei einem Studium, welches erst fünfundzwanzig Jahre alt ist, kann man sich nicht schmeicheln, eine hinlängliche Anzahl von Thatsachen gesammelt

Digitized by Google

zu haben, um zu der allgemeinen Ursache, welche das Phänomen hervorgerufen hat, aufzusteigen. Nur die Behauptung ist gestattet, daß diese ungeheure Entwickelung der Gletscher unter den jetzigen klimatischen Bedingungen unmöglich wäre, und daß sie nothwendig eine merkliche Veränderung in der Temperatur und folglich eine andere atmosphärische Beschaffenheit voraussetzt, als die ist, welche seit den historischen Zeiten in Europa herrscht.

Ehemalige Ausdehnung der Montblanc-Gletscher von Chamouni bis Genf.

Bevor ich eine Vorstellung von der Ausdehnung der ehemaligen Gletscher zu geben versuche, habe ich es für angemessen gehalten, einen dieser Gletscher seiner ganzen Länge nach von seinem Ursprunge bis zu seiner Endmoräne zu verfolgen. Auf dieser Reise werden wir überall den Spuren begegnen, welche er auf seinem Zuge zurückgelassen hat, und wir werden mit Leichtigkeit die Identität dieser Spuren mit denjenigen feststellen, welche man in der Nähe der gegenwärtigen Gletscher antrifft. Als Beispiel wähle ich die Gletscher des Montblanc aus, welche ehemals das ganze Arvethal erfüllten und sich von Chamouni bis Genf erstreckten.

Versetzen wir uns auf den Montanvert, 850 Meter über dem Dorfe Chamouni. Das Eismeer liegt zu unseren Füßen, es steigt von dem mächtigen Cirkus des Jardin und der Aiguille du Géant herab. Ohne kühne Bergbewohner zu sein, können wir die Ponts überschreiten, über die linke Seitenmoräne wegsetzen und uns dem Vorgebirge des Angle nahen. Die ganze Oberfläche dieses Vorgebirges ist abgerundet, geglättet und gestreift, ober- wie unterhalb der Gletscherfläche. Man kann sich hiervon überzeugen, indem man zwischen das Eis und die

Digitized by Google

Granitwand hinabſchaut. Setzen wir dieſe Unterſuchung noch etwas weiter fort, ſo werden wir ſehen, daß die Felſen bis zu einer bedeutenden Höhe geglättet und gereifelt ſind, und daß die Spuren der Einwirkung des Gletſchers erſt am Fuße der hohen ihn beherrſchenden Spitzen innehalten. Da nun die Streifen, welche das Eis vor unſern Augen radirt hat, eins ſind mit denen, welche ſich 300 Meter über unſern Köpfen befinden, ſo ſind wir berechtigt, daraus zu ſchließen, daß die Dicke des Gletſchers oder ſeine Mächtigkeit, um die Sprache der Geologen zu reden, vordem größer war, als ſie es heutzutage iſt; wenn aber ſeine Mächtigkeit größer war, ſo war es ſeine Länge auch, denn es beſteht ein nothwendiger Zuſammenhang zwiſchen den drei Verhältniſſen eines Gletſchers. Demnach lag die Endmoräne ſtatt beim Weiler des Bois, 3 Kilometer oberhalb Chamouni, damals viel weiter vorn. Man ſieht, daß man ſich, ohne die Oberfläche des gegenwärtigen Gletſchers zu verlaſſen, ſchon die Gewißheit verſchaffen kann, daß ſeine Ausdehnung ehedem beträchtlicher war, als in unſern Tagen. Die übrigen Beweiſe werden uns nicht mangeln.

Statt, wie der Gletſcher, am Fuße des Chapeau genannten Felſens einzuhalten, verlängert ſich die rechte Seitenmoräne unter der Geſtalt eines ungeheuren Dammes, welcher das Thal von Chamouni verſperrt und den Weiler Lavangi trägt. Die Arve hat ſich eine enge Bahn zwiſchen dieſem Damm und dem nördlichen Thalgehänge gebrochen. Bei Anlegung der Straße iſt man genöthigt geweſen, dieſen natürlichen Damm zu durchſtechen, und hat ſich bei dieſer Arbeit davon überzeugen können, daß derſelbe aus Sand, Kieſeln und großen, eckigen, bunt übereinander gehäuften Blöcken, wie bei den wirklichen Moränen, beſteht. Einer dieſer Blöcke, welcher auf dem Kamme liegt, iſt unter dem Namen der Pierre de Lisboli bekannt. Dieſer Damm iſt die ehemalige Seitenmoräne des Eis-

Digitized by Google

meeres; der Wald jedoch, welcher ſie bedeckt, beweiſt, daß die Oberfläche des Gletſchers ſich ſeit langer Zeit zu dem Niveau, worauf wir ſie gegenwärtig ſehen, herabgeſenkt hat. Schon Sauſſure*) hatte das Daſein dieſer ehemaligen Moräne erkannt, welches ſich ſo augenſcheinlich herausſtellt, daß die vorurtheilsvollſten Geiſter es nicht würden leugnen können. Sie erſtreckt ſich thalaufwärts bis zum Weiler des Jſles, 2 Kilometer vom Dorfe Argentière entfernt. Die Arve, in ihrem Laufe durch die Moräne von Lavangi geſperrt, bildete vormals einen See, deſſen allmälige Waſſerſtände noch durch die horizontalen Terraſſen, welche den Stromlauf einfaſſen, angezeigt werden.

Von der Höhe dieſer Seitenmoräne kann ein aufmerkſamer Beobachter in dem Thale die ehemalige Endmoräne des Eismeeres zur Zeit ſeiner geringſten Ausdehnung erkennen. Die Geſtalt dieſer Moräne iſt charakteriſtiſch; es iſt die eines Bogens, deſſen konkave Seite bergwärts gerichtet iſt. Das Dorf Chamouni iſt zum Theil auf dieſer Moräne und auf Koſten der erratiſchen Blöcke, welche ſie bilden, erbaut. Der kleine auf dem linken Ufer der Arve liegende Hügel gegenüber dem Hotel de l'Union iſt einer der hervorragendſten Punkte. Jm Jahre 1845 konnte ich die innere Struktur dieſes Hügels unterſuchen, während man den Grund zu dem neuen Hotel grub, welches ſich dem ſoeben genannten gegenüber erhebt, und ich habe gefunden, daß ſie identiſch mit der der gegenwärtigen Moränen iſt.

Aber, wird man ſagen, wo iſt der Beweis dafür, daß die erratiſchen Blöcke der Moräne von Chamouni dort durch das Eismeer abgelagert ſind? Jſt es nicht natürlicher, anzunehmen, daß ſie von dem Brevent herabgekommen ſind, deſſen beſtändige Bergſtürze unaufhörlich das Dorf bedrohen und das große ge-

*) Voyage dans les Alpes §. 623.

Digitized by Google

neigte Delta bilden, deſſen öſtliche Ecke er einnimmt? Die Antwort iſt leicht. Der Brevent iſt ein Gneisgebirge, und faſt ſämmtliche Blöcke der Moräne ſind von Protogin, einer charakteriſtiſchen Granitart, welche die Maſſe des Montblanc und der umliegenden Gipfel ausmacht.

Setzen wir unſern Weg längs des Thales fort. Nachdem man auf einer hölzernen Brücke die Arve überſchritten hat, gelangt man zu dem Weiler Montcuar, welcher auf allen Seiten von ungeheuern Protoginblöcken umgeben iſt. Das Terrain wird ſtatt ſchlicht, uneben, und der Weg führt über mehre Dämme von geringer Höhe. Man befindet ſich auf einer neuen Endmoräne, welche einer größern Ausdehnung des Mer de Glace und des Glacier des Boſſons vereint entſpricht, es iſt die von Montcuar, deren Breite, an den Ufern der Arve gemeſſen, etwa 400 Meter beträgt. Dieſe Moräne endet ein wenig jenſeit des Gießbaches, welcher vom Glacier de Taconnay herkommt. Die Blöcke, aus denen ſie beſteht, ſind wahrhaft rieſig. Jeder Fremde bemerkt die in dem Ellerwäldchen befindlichen, das ſich am Strome entlang zieht. Einer dieſer Blöcke, Pierre Belle genannt, hat nicht weniger als 24 Meter 7 Decimeter Länge bei 9 Meter Breite und wenigſtens 12 Meter Höhe. Es iſt kein Stein, es iſt ein wahrer Hügel, der ſich über alle ihn umgebenden Bäume erhebt. Sollten dem Beobachter noch einige Zweifel über die Natur der Kraft zurückbleiben, welche dieſe Blöcke verführt hat, ſo braucht er ſich, falls er die ſchwierigen Wege nicht ſcheut, nur über die Böſchungen zu erheben, welche das rechte Ufer der Arve beherrſchen. Auf dem rohen Pfade, welcher zum Weiler Merlat führt, wird er zwiſchen 336 und 350 Meter über dem Thale Rundhöcker finden, d. h. Felsblöcke, welche gerundet und geglättet ſind wie die, welche man unter den jetzigen Gletſchern antrifft.

Nachdem er die Ebene von Montcuar überſchritten hat,

Digitized by Google

wandert der Reiſende auf einem aus Rollſteinen gebildeten Terrain, welche durch die Gießbäche hierher geführt wurden, deren ausgetrocknete Betten er noch erkennt; wirft er den Blick aber auf das rechte Ufer der Arve, ſo bemerkt er von weitem erratiſche Blöcke und große glatte, faſt ſenkrechte Flächen. Er befindet ſich bei dem Dorfe des Ouches, dem letzten im Chamounithale. Dort hat der Gletſcher die verſchiedenartigſten und augenſcheinlichſten Spuren ſeines Vorüberziehens hinterlaſſen. Der ungeheure Druck, den er hat ausüben müſſen, um ſich den Eingang in die enge Schlucht der Montées zu erzwingen, die Veränderung in der Thalrichtung, alles trug dazu bei, jene Erſcheinungen der Reibung und Abſchleifung hervorzurufen, welche wir am Fuße der Vorgebirge oder bei den Verengungen beobachten, welche das Bett der gegenwärtigen Gletſcher einengen.

Dem Dorfe des Ouches gegenüber, auf dem rechten Ufer der Arve, erheben ſich drei Hügel von charakteriſtiſcher Form: bergwärts ſind ſie abgerundet, thalwärts ſteil abfallend. Man erkennt leicht, daß die Kraft, welche die geneigten Schichten des thonigen Talkſchiefers, woraus ſie beſtehen, abgeſchliffen hat, das Thal herabkam und die nach unten gekehrte Seite verſchont hat; daher der runde Rücken aufwärts, welcher plötzlich mit einer nach der entgegengeſetzten Richtung gekehrten Böſchung endet. Unterſuchen wir dieſe Hügel etwas näher. Ueberall, auf der Spitze wie an den Seiten, werden wir jene geradlinigen Reifen, jene feinen in der Richtung des Thales laufenden Striche finden, welche nur die Gletſcher zu reißen vermögen, und um den Nachweis vollſtändig zu machen, ruhen zahlreiche Protoginblöcke, oft ungeheuer groß, mit ſpitzen Ecken und ſcharfen Kanten, auf dieſen geglätteten und gereifelten Flächen. Bis zur Höhe von 593 Meter hinauf iſt die ganze Montagne de Coupeau über dem rechten Ufer der Arve mit Rundhöckern bedeckt,

Digitized by Google

welche ſozuſagen unter zahlloſen erratiſchen Blöcken verſchwinden. Die Striche, welche dieſe Felſen durchfurchen, ſind nicht horizontal, ſie können es nicht ſein, denn dieſer Berg bildete ein in das Thal vorſpringendes Vorgebirge, ſo daß der Gletſcher ſich wider das Hinderniß, welches ſeinem Marſche entgegentrat, aufrichtete und aufſteigende Linien einradirte, gleich denen, welche wir auf dem Aargletſcher am Fuße des Vorgebirges, welches den Pavillon des Herrn Agaſſiz trägt, angezeigt haben.

So finden ſich die unwiderleglichſten Spuren, welche ein Gletſcher von ſeinem Durchzuge beim Eintritte eines Paſſes zurücklaſſen kann: Hügel, aufwärts abgerundet, abwärts ſchroff, Rundhöcker mit geradlinigen Riefen und Strichen, horizontal auf dem Boden des Thales, anſteigend auf dem Vorgebirge, welcher daſſelbe einengt, eine Seitenmoräne, beſtehend aus eckigen an den Seiten der Berge hangenden Blöcken — Alles dieſes findet ſich vereint beim Eingange der Schlucht der Montées vor.

Es giebt noch immer verſchiedene Gelehrte, welche alle dieſe Erſcheinungen der Wirkung großer Waſſerſtröme zuſchreiben. Sie meinen, daß dieſe Diluvialfluten die Macht gehabt hätten, die erratiſchen Blöcke fortzuführen, ohne die Ecken derſelben abzuſtumpfen, ohne die Kanten zu verwiſchen. Sie meſſen dem raſchen Hingleiten dieſer Blöcke die abgerundeten Formen der Rundhöcker und die Streifen, womit ſie bedeckt ſind, bei; ſie ſcheuen nicht vor der Nothwendigkeit zurück, Ströme von 400 bis 500 Meter Tiefe, während langer Zeitabſchnitte fließend, einzuräumen, was wahrhaft unberechenbare Waſſermaſſen, deren Urſprung nicht zu erklären ſein würde, vorausſetzt. Doch, glaube ich, würde der ſtarke Glaube des hartnäckigſten Diluvialiſten erſchüttert werden, wenn er die Spuren des ehemaligen im Thale von Chamouni mündenden Gletſchers mit der ſäkularen Wirkung der Arve vergleicht, deren Gießbäche ſich in demſelben Terrain, welches der Gletſcher gebildet hat, ein Bett ge-

Digitized by Google

graben haben. Einerſeits Rundhöcker, von innen geſtreiften Riefen durchfurcht; geglättete Flächen mit feinen, ſtets geradlinigen, oft anſteigenden Streifen; ungeheure erratiſche Blöcke mit ſcharfen Ecken und Kanten an den Seiten der Berge gelagert; — das iſt das Werk des Gletſchers. Andererſeits Ausfreſſungen, gewundene verzweigte Kanäle mit glatten und ſchlichten Wänden, ſtets in der Richtung des Abhanges laufend; cylindriſche Vertiefungen, Rieſentöpfe genannt; Blöcke von mittlerer Größe, gerollt, rund mit abgeſtumpften Kanten und Ecken, auf dem Boden des Thales gelagert; — das ſind die Wirkungen eines Gießbachs. Man kann ſie im Arvebett neben den Spuren des Gletſchers ſtudiren. Im erſtern Falle iſt es ein feſter Körper, welcher den Fels abflächt und ritzt, im zweiten eine Flüſſigkeit, welche ihn unaufhörlich angreift, aushöhlt, glättet, aber ohne ihn zu ſtreifen.

Vom Dorfe des Ouches aufbrechend, durchſchneidet der Reiſende eine kleine Ebene und verwickelt ſich ſodann in die Schlucht der Montées, welche das Thal von Chamouni mit dem von Servoz verbindet. Zur Rechten brauſt die Arve in der Tiefe eines Abgrundes, zur Linken dehnt ſich ein niedriger und ſumpfiger Raum bis an den Fuß des Prarion aus. Alle Abhänge der Gorge des Montées, alle Felſen, welche im Thale auftauchen, ſind rundhöckrig, mit großen erratiſchen Blöcken beſäet und von geradlinigen Riefen durchfurcht, deren Länge oft mehre Meter beträgt. Ohne ſich von der Hochſtraße zu entfernen, kann man einen dieſer Hügel auf dem linken Ufer der Arve ſehen, nachdem man über den Pont Peliſſier gelangt iſt; es iſt der, welcher die maleriſchen Ruinen des Thurmes von Saint-Michel trägt. Ueberall um dieſe Hügel herum trifft man Protoginblöcke an, welche geglättete und geriefelte Felſen bedecken. Oft erſcheinen dieſe Blöcke wie hangend an den Seiten der Hügel, daß man ſchlechterdings zu dem Schluſſe geführt

Digitized by Google

wird, ſie ſeien durch eine Kraft dahin geführt, welche ſie ſanft und ohne Erſchütterung auf der Stelle abſetzte, wo ſie im Gleichgewicht liegen geblieben ſind, während ein ungeſtümer Strom ſie mit ſich fortgeriſſen und in die Tiefe des Thales geſchleudert haben würde.

Welches war die Gewalt des Gletſchers im Augenblicke, wo er über den Engpaß der Montées wegſetzte? Um dieſe intereſſante Frage zu löſen, bin ich an die beiden Ufern der Arve empor geſtiegen. Zur Rechten über den Felſen, deren ſteile Böſchungen ſich in den Strom ſenken, habe ich geglättete Felſen und erratiſche Blöcke bis zur Höhe von 758 Meter über dem Pont Peliſſier gefunden. Zur Linken, nicht weit vom Forklazpaſſe, erhoben ſich die Blöcke bis zur Höhe von 683 Meter. Dieſe beiden Punkte, einander gegenüberliegend, ſind durch einen horizontalen Abſtand von wenigſtens 4 Kilometer getrennt. Der Gletſcher hatte auf dieſem Punkte alſo eine Breite von einer Stunde, und ſeine durchſchnittliche Mächtigkeit betrug wenigſtens 720 Meter (2215 Fuß), denn bei dieſer Art von Meſſungen iſt man nie ſicher, das Barometer genau über dem letzten polirten Felſen oder bei dem letzten erratiſchen Blocke aufgehängt zu haben.*)

Jenſeit des Dorfes Servoz verſchwinden die Spuren des Arvegletſchers (mit dieſem Namen wollen wir ihn künftighin bezeichnen) eine Zeit lang. Man kommt nämlich über entſetzliche Bergſtürze, welche die Rundhöcker und die Moränenblöcke unter einer dicken Schuttſchicht begraben haben. Einer dieſer Bergſtürze, der vom Jahre 1751, war von einem ſo fürchterlichen Getöſe und einer derartig ſchwarzen Staubwolke begleitet, daß die Behörden der nächſten Stadt einen Kurier nach Turin ab-

*) Dieſe Dicke hat nichts Ueberraſchendes, wenn man bedenkt, daß die des gegenwärtigen Aargletſchers bei dem Abſchwung wenigſtens 400 Meter beträgt.

Digitized by Google

ſchickten, um zu verkünden, daß ſich ein Vulkan in den Alpen geöffnet habe.

Auf dem linken Ufer der Arve ſind die Spuren des ehemaligen Gletſchers keineswegs wie auf dem rechten verdeckt worden. Wenn man den Weg, welcher vom Dorfe du Chède zu den Bädern von Saint-Gervais führt, verfolgt, ſo ſtößt man an den Ufern des Bergbaches beim Austritt aus der engen Schlucht, der er entſchlüpft, um ins Thal von Sallenches zu treten, wieder auf die Protoginblöcke. Einer dieſer Blöcke wird von einem Taubenhauſe überragt, welches ihn der Aufmerkſamkeit der Reiſenden ſchon von weitem ankündigt.

Die Bäder von Saint-Gervais liegen am äußerſten Ende des Thales von Montjoie, welches ſich am Weſtabhange des Montblanc hinzieht und in das der Arve unter einem beinahe rechten Winkel einmündet. Der Gießbach Bonnant, welcher hinter den Bädern eine unter den Touriſten berühmte Kaskade bildet, fließt im Grunde des Thales. Wenn die Theorie der ehemaligen Ausdehnung der Gletſcher keine leere Hypotheſe iſt, ſo muß das Thal von Montjoie wie das von Chamouni den Abfluß eines Gletſchers bilden, und beim Punkte ſeines Zuſammentreffens mit dem der Arve müſſen wir die Spuren der Phänomene wieder antreffen, welche auf den jetzigen Gletſchern bei der Vereinigung von zwei Zuflüſſen ſtattfinden. Wenn dieſe Zuflüſſe von gleicher Stärke ſind, ſo vereinigen ſie ſich und laufen parallel neben einander her; ſind ſie aber von ungleicher Größe, ſo wird der kleinere von dem größern zurückgedrängt und bildet nur eine Art von Keil, der mehr oder weniger in den Hauptgletſcher dringt. Die Vereinigung des Lauteraar- und Finſteraargletſchers iſt ein Beiſpiel des Zuſammenfluſſes erſterer Art; die kleinen Gletſcher des Thierbergs, des Silberbergs, des Grünbergs, welche ſich in den der Aar ergießen, machen uns den zweiten Fall anſchaulich. Im Vergleich zu dem der Arve war

der Gletscher des Bonnant nur ein schwacher Zufluß; nichtsdestoweniger hat er seine Blöcke am Eingange des Montjoiethales abgesetzt, wo sie auf einer Strecke von mehren Kilometern allein die Bergabhänge zwischen Saint-Gervais und Comblour bedecken; zugleich aber hat der Bonnantgletscher die Seitenmoräne des Arvegletschers gegen die Mitte des Thales zurückgedrängt und die Protoginblöcke gezwungen, sich vom Ufer zu entfernen. Auch haben sich, als der Arvegletscher schmolz, diese Blöcke, statt an den Wänden des Thales von Sallenches hängen zu bleiben, auf dem Grunde gelagert, und wir finden sie heutzutage um die von den Bädern von Saint-Gervais eingenommene Schlucht umherliegen. Ja wir sehen vor dem Bade-Etablissement geneigte Schichten von Rollsteinen, untermischt von eckigen Blöcken: sichere Beweise vom ehemaligen Vorhandensein eines kleinen Gletscherses, ähnlich dem des Tacul, welcher sich in dem durch die Vereinigung des Géant- und Léchaudgletschers, Hauptzuflüssen des Eismeeres von Chamouni, gebildeten Winkel befindet.

Mehre Kilometer weiter werden die von dem Gletscher des Bonnant abgesetzten erratischen Blöcke von denen der Seitenmoräne des Arvegletschers ersetzt, welcher wieder die Bergabhänge einnimmt und ohne Unterbrechung vom Dorfe Comblour bis zu der kleinen Stadt Sallenches herrscht. Dem gelehrten Bischof von Annecy, Msgr. Rendu, verdankt man die Entdeckung dieser Moräne. Mit Ueberraschung hatte er wahrgenommen, daß der Zusammenhang der Ackerfelder, welche sich von der Thalsohle bis zu bedeutender Höhe erheben, durch einen Gürtel von Wäldern unterbrochen wurde. Den Schatten der düstern Tannen betretend, erkannte er sofort die Ursache dieser Eigenthümlichkeit. In diesem Gürtel verschwindet der Boden unter einem Haufen von erratischen übereinander gethürmten und sich bis zur Höhe der Bäume erhebenden Blöcken.

Digitized by Google

Ueberall erblickt man Protoginmaſſen, welche 10 bis 20 Meter nach allen Seiten meſſen. Die Kanten dieſer Maſſen ſind eben ſo ſcharf, die Ecken eben ſo ſpitz, wie in dem Augenblick, da ſie ſich von den Zinken des Montblanc ablöſten. Nicht nur ſind die Bäume zwiſchen dem Geſtein emporgeſchoſſen, ſondern ſie haben auch die Blöcke ſelbſt überzogen und oft gedeiht eine prächtige Gruppe von Tannen und Birken gleich einem hängenden Walde, auf einem Sockel von Granit. Der Reiſende hat eben ſo viel Mühe, ſich in dieſem Irrſal einen Durchgang zu bahnen, als ob er ſich in die Moränen des Eismeeres von Chamouni verirrt hätte. Ueberall, wo die Bäche den Boden durchfurcht haben, bemerkt er jenes Gemiſch von Sand, Kieſeln und eckigen, bunt auf einander gehäuften Blöcken, welches die von den Gletſchern gebildeten Ablagerungen kennzeichnet. Erſt in der Tiefe von mehren Metern trifft er die Schieferlager des Gebirges an. Die rieſigſten Blöcke der Comblourmoräne finden ſich am Waldſaume unterhalb des Dorfes gleiches Namens, ein anderer, nahe beim Weiler des Caches in geringer Entfernung von Sallenches befindlich, iſt im Lande unter dem Namen der Pierre à Mabert berühmt.

Die große Anhäufung von Blöcken, welche die Moräne von Comblour zu einer der hervorragendſten in den Alpen macht, erklärt ſich leicht, wenn man in Erwägung zieht, daß auf dieſem Punkte das Thaljoch genau der Servozſchlucht gegenüber liegt, durch welche der Arvegletſcher in die Ebene von Sallenches mündete. Dieſe Moräne war demnach eine Seiten- und Stirnmoräne zugleich, wie die des jetzigen Lauteraargletſchers beim Bärenritz. Die Einbildungskraft wagt kaum den Zeitraum zu ſchätzen, während deſſen der Gletſcher die den Spitzen in der Umgegend des Montblanc entriſſenen Blöcke dort abgelagert hat; einige ſind nebſt denen des Bonnantgletſchers in das Hochthal von Mégève, welches ſich zwiſchen Saint-Gervais

Digitized by Google

und Comblour öffnet, vorgedrungen, doch haben ſie keineswegs die Waſſerſcheide zwiſchen der Arve und der Iſère überſchritten. Da das Val de Mégève nicht mit einem von hohen Bergen umgebenen Cirkus abſchließt, ſo begreift ſich, daß es nicht wie das Montjoiethal einem Gletſcher das Daſein gegeben hat; da es ſich aber auf der einen Seite ins Arvethal, auf der andern in das der Iſère öffnet, ſo iſt es wahrſcheinlich, daß zwei Zweige der Gletſcher gleiches Namens ſich an der Stelle begegneten, wo ſich gegenwärtig der Flecken Mégève befindet, denn darüber hinaus am Abhange der Iſère trifft man nicht mehr jene Protoginblöcke an, welche die Montblancgletſcher charakteriſiren.

Schreitet man weiter den Lauf der Arve hinab, ſo betritt man das Maglanthal, und man kann ſich überzeugen, daß die Moräne von Comblour nicht bei Sallenches aufhört. Unzählige Protoginblöcke bedecken ſämmtliche Abhänge, welche das linke Ufer des Fluſſes beherrſchen. Beim Cluſespaſſe ſind mehre unter dieſen Blöcken von der Hauptſtraße aus ſichtbar, und ich habe ſie bis zur Höhe von 286 Meter verfolgt, welche ſicherlich nicht die äußerſte Höhengrenze der Moräne iſt. Die erratiſchen Blöcke fehlen gänzlich auf dem rechten Ufer im ganzen Maglanthale. Woher rührt dieſer Unterſchied? Warum treffen wir Tauſende von Protoginblöcken auf dem linken Ufer der Arve und keinen einzigen auf dem rechten Ufer an? Von Servoz bis Saint-Martin, Sallenches gegenüber, könnte man glauben, daß die Blöcke unter den Bergſtürzen der Montagne des Fis und der Aiguille de Varens vergraben ſeien, oberhalb des anmuthigen Waſſerfalles des Nant d'Arpenaz und des Dorfes Maglan aber bietet das Gebirge entblößte Stufen dar. Mſgr. Rendu hat dieſe Schwierigkeit bereits gelöſt; er macht darauf aufmerkſam, daß in der Höhe von Servoz ein mächtiger vom Buet kommender Gletſcher in den der Arve über den Col d'An-

Digitized by Google

terne hinüber abfließen mußte. Dieser beträchtliche Zufluß, parallel mit dem Arvegletscher laufend, dessen rechte Flanke er bildete, führte keineswegs Protoginblöcke mit sich; seine Moräne war kalkig, wie die ihn beherrschenden Berge. Da nun die Joche des Maglanthales derselben Art sind, so vermischt sich diese Moräne mit Felsen der Bergstürze. Nichts ist in der That schwieriger, als die erratischen Blöcke zu unterscheiden, wenn sie dasselbe Aussehen und dieselbe mineralogische Structur wie der Fels, auf dem sie ruhen, besitzen. Andererseits haben diese Schiefer-, Kalk- und Sandsteintrümmer nicht wie der Protogin dem langen Einflusse der Verwitterung Widerstand geleistet und sind zum großen Theil zerstört.

Man sieht, daß die Theorie der ehemaligen Ausdehnung der Gletscher sehr gut die Trennung der Protogin-Blöcke und derjenigen der Kalkmoräne erklärt. Die Annahme eines Diluvialstromes vermag diese Schwierigkeit nicht zu lösen. Wie könnte man es auch fassen, daß ein ungestümer Bergbach, welcher die Kalktrümmer und die Granitblöcke, bunt durcheinander gewürfelt, mit sich fortgerissen hätte, die einen auf dem linken, die andern auf dem rechten Ufer absetzen sollte, ohne sie mit einander zu vermischen? Diese Annahme ist unzulässig und beweist die Unzulänglichkeit der Diluvialhypothese.

Die lange Seitenmoräne, welche sich von Cluses bis Bonneville ausdehnt, bildet einen ununterbrochenen Damm längs der ganzen linken Thalwand. Die letzten Blöcke dieser Moräne liegen oft 640 Meter über der Arve. Beweis hierfür diejenigen, welche man in der Nähe der Kirche des Mont Saxonet bemerkt, deren hohe Lage und malerischer Anblick das Auge des Reisenden schon von weitem auf sich zieht. Die ganze zwischen Bonneville und dem Mont Salève liegende Ebene ist mit zahlreichen erratischen Blöcken besäet, dennoch fehlen diese Blöcke gänzlich auf einem 17 Kilometer langen Streifen von veränder-

Digitized by Google

licher Breite, welcher ſich vom Eingange des Bornandthales bis Rangy, einem auf dem Wege von Bonneville nach Genf gelegenen Dorfe, erſtreckt. Dieſer lange Streifen, unter dem Namen der Rocailles bekannt, iſt faſt gänzlich unbebaut und ſticht durch ſeine Dürre gegen den kräftigen Pflanzenwuchs der umliegenden Ebene ab. Die kleine Stadt la Roche, die Dörfer Saint-Laurent und Cornier ſind auf dieſen Rocailles gebaut, während die von Pers, von Saint Romain und von Rangy an den Rändern liegen. Inmitten dieſer Felſen, von denen mehre, 30 bis 40 Meter hoch, die imponirenden Ruinen der Schlöſſer de la Roche, du Chatelet und die Thürme von Saint-Laurent und Bellecombe tragen, ſieht ſich der Geologe plötzlich in ein Kalkland verſetzt. Die mineralogiſche Natur der ihn umgebenden Felſen, der weiße Schlamm, welcher die Straße bedeckt, Alles beſtärkt ihn in dieſer Vorſtellung. Der Botaniker erkennt ſofort die den Kalkgebirgen eigenthümlichen Pflanzen: Burbaum, Schweinsbrot, Schwalbenwurz; allein dieſe Erſcheinungen ſind trügeriſch; überall, wo die Bergbäche den Boden durchſchnitten haben, ſieht man die Molaſſebänke, auf denen dieſe Kalkmaſſen ruhen. Die foſſilen Muſcheln, welche ſie enthalten, zeigen vollends, daß dieſe Maſſen hier nicht anſtehen, ſondern ehedem den hohen Theilen der Berge des Bornand entriſſen und in die Ebene verführt worden ſind. Man gewinnt endlich die Ueberzeugung, daß die Rocailles eine große Kalkmoräne ſind, die vom Bornandthale ausgegangen iſt, wo ein Gletſcher aus dieſem Thale mündete, um ſich mit dem der Arve zu vereinigen. An mehren Punkten kann man ſehen, wie ſich die Granit- und die Kalkmoräne berühren, ohne ſich zu vermiſchen, am Eingange der Stadt la Roche auf der Seite von Bonneville z. B. und bei der Brücke von Bellecombe unterhalb des Dorfes Rangy. Einen Kilometer oberhalb dieſes Dorfes bemerkt der Reiſende zwei ſteile Felſen,

Digitized by Google

welche sich neben der Straße erheben. Der eine trägt einen Pavillon, es ist das Chateau de Pierre, der andere ein Föhrendickicht von malerischster Wirkung. Diese beiden Felsen sind die letzten Blöcke der Kalkmoräne des Bornand, vormals vom Gletscher bis auf das rechte Ufer der Arve geschoben.

Jenseits Nangy ist die zwischen dem Südabhange der Voirons und dem östlichen Rücken des Salève liegende Ebene mit Protogingblöcken besäet, welche sich hauptsächlich auf dem hinter diesen Bergen liegenden Plateau des Bornes aufgehäuft haben; doch muß man auf der Ostseite der beiden Salèves die Endmoräne des Arvegletschers suchen. Trotz einer schon mehre Jahre währenden rührigen Ausbeutung ist der abgerundete Rücken dieser beiden Berge doch überall von diesen Blöcken bedeckt. Eine bedeutende Anzahl derselben ist in die Schlucht von Monetier gedrungen, andere sind oben auf dem Absturz, welcher nach Genf zuliegt, hangen geblieben oder in die Ebene, deren Mittelpunkt diese Stadt einnimmt, hinabgestürzt worden. Bei dem auf dem östlichen Rücken des kleinen Salève liegenden Dorfe Morner trifft man auch geglättete Felsen und beträchtliche Haufen von Sand, Kies und gestreiften Kieseln an. So sind alle Beweise für das ehemalige Dasein eines Gletschers auf dem Ostabhange des Salève eben so sichtlich, eben so unstreitig vereinigt, als im Thale von Chamouni, der Wiege jenes riesigen Gletschers, dessen Spuren wir verfolgt haben. Für ihn war die Kette des Salève kein unübersteiglicher Wall, er hat sich um die Enden derselben herumgewunden, um seine letzten Blöcke auf dem Mont Sion, einer molassischen, im Süden von Genf gelegenen Anschwellung, und der Wasserscheide der Gewässer, welche sich in den Genfer See oder den von Annecy ergießen, abzulegen. Die Protogingblöcke nehmen die höchsten Theile des Mont Sion ein, und die letzte Gruppe krönt die Spitze eines Hügels, welcher sich unter dem

Digitized by Google

Dorfe Vers neben der Straße von Genf nach Chambery erhebt.

Auf den beiden Abhängen des Mont Sion findet der Geologe erratiſche Blöcke ſehr mannichfaltiger Art, und wenn er ſich an die Gebirge erinnert, in denen die Geſteine dieſer Blöcke anſtehen, ſo erlangt er die Ueberzeugung, daß er ſich auf dem Punkte des Zuſammenſtoßes von drei großen antediluvianiſchen Gletſchern befindet, desjenigen der Rhone, welcher das ganze Becken des Genfer Sees erfüllte, desjenigen der Iſère, welcher durch die Seen von Annecy und des Bourget mündete, und desjenigen der Arve, welcher, wie ein ſpitzer Keil ſich zwiſchen ſie ſchiebend, bei dem Dorfe Vers endete. Der beſcheidene Mont Sion war, wie Herr Arnold Guyot, dem man dieſe ſchöne Entdeckung verdankt, ſich ausdrückt, der Punkt, wo dieſe mächtigen Gletſcher, welche die Oberfläche der zwiſchen den Alpen und dem Jura liegenden Ebene ſo bedeutend veränderten, zuſammenliefen. Wir werden ſie nicht alle ihrer Erſtreckung nach verfolgen, denn alle würden uns Eigenthümlichkeiten darbieten, denen des Arvegletſchers analog. Ziehen wir nur in großen Umriſſen die Grenzen der ehemaligen Ausdehnung dieſer Gletſcher.

Der Rhonegletſcher entſprang in allen den Seitenthälern, welche in die beiden parallelen Ketten des Wallis einſchneiden und woſelbſt ſich die höchſten Berge der Schweiz, der Monte Roſa, der Mont Cervin, die Jungfrau, der Velan u. ſ. w., befinden. Dieſer Gletſcher erfüllte das Wallis und dehnte ſich in der zwiſchen den Alpen und dem Jura liegenden Ebene vom Fort l'Ecluſe bei der Perte du Rhône bis in die Umgegend von Aarau aus. Er war der Hauptgletſcher der Schweiz; er hat jene zahlloſen Blöcke, welche den Jura bis zur Höhe von 1040 Meter über dem Meere bedecken, verführt. Die übrigen Gletſcher waren nur ſchwache Zuflüſſe des Rhone-

Digitized by Google

gletſchers, unfähig, ihn von ſeiner Richtung abzulenken. So erkennt man, wenn der Arvegletſcher ihm auf dem Kamme der Salèves oder an den Abhängen der Voirons begegnet, an der Vertheilung der Moränen, daß der Rhonegletſcher ſeinen Marſch fortſetzt, während der der Arve plötzlich ſtillſteht. Desgleichen drängt ein reißender Strom das kleine Bächlein zurück, welches ihm den Tribut ſeiner Welle zuträgt.

Die übrigen ſekundären Gletſcher nahmen die Hauptthäler der Schweiz ein. Dergleichen waren der Aargletſcher, deſſen letzte Moränen die Hügel in der Umgegend von Bern krönen. Der Reußgletſcher, welcher die Ufer des Vierwaldſtädterſees mit den den Spitzen des St. Gotthard entriſſenen Blöcken bedeckt hat. Der Linthgletſcher hielt am Ende des Züricher Sees inne, und die Stadt iſt auf der Endmoräne deſſelben gebaut. Der Rheingletſcher endlich, weniger als die andern unterſucht, nahm das ganze Becken des Konſtanzer Sees ein und dehnte ſich bis zu den Grenzpartien Deutſchlands aus.

So war alſo während der Kältezeit, welche dem Erſcheinen des Menſchen auf der Erde gefolgt iſt, die Schweiz ein mächtiges Eismeer, deſſen Wurzeln ſich in die Hochthäler der Alpen ſenkten, während die Endböſchung ſich auf den Jura ſtützte. Desgleichen ſtiegen auf dem Südabhange der Kette die Gletſcher in die Ebenen Piemonts und der Lombardei hinab. Die der Südſeite des Montblanc vereinigten ſich, um den Gletſcher des Aoſtathales zu bilden. Die Endmoräne deſſelben erhebt ſich wie ein rieſiger Damm in der Umgegend der Stadt Ivrea, es iſt die Serra von Piemont.*) Die Mehrzahl der Seen Oberitaliens verdankt ihr Daſein den Stirnwällen dieſer gro-

*) Siehe über dieſen Gegenſtand: Essai sur les terrains superficiels de la vallée du Po aux environs de Turin par Ch. Martins et B. Gastaldi (Bulletin de la Société géologique de France, 2e série, 1850, t. VII, p. 250).

Digitized by Google

ßen Gletscher; indem sie den Lauf der Flüsse stauten, zwangen sie dieselben, sich unter der Form stiller Wasserspiegel auszubreiten. Unter den hervorstechendsten Moränen will ich die drei konzentrischen Bögen erwähnen, welche das Ende des Lago Maggiore bei Sesto Calende umschreiben; die des Gardasees sind nicht minder gut in der Nähe von Desenzano und Peschiera charakterisirt. Die Schlacht von Solferino ist auf diesen alten Moränen geliefert worden, die Oesterreicher hatten die Höhen derselben besetzt. Der Mensch hat in seinem Grimm diese fruchtbaren Hügel, welche aus verführten Gebirgen bestehen, die sämmtliche, den verschiedensten Kulturen günstige mineralogische Elemente in sich vereinigen, mit Blut getränkt. Aber durch das hochherzige Blut Frankreichs ist ein köstlicherer Baum als alle Früchte der Erde daraus emporgesprossen, der Baum der Freiheit, dessen mächtige Aeste Italien bereits von den Alpen bis Viterbo und von Terracina bis Syrakus bedecken. Und eines Tages wird seine breite Krone keine Lücke mehr darbieten; Rom, ein ehrwürdiges Denkmal des katholischen Mittelalters und des heidnischen Alterthums, wird gleich Neapel und Florenz in die große Gemeinschaft der befreiten Städte eintreten.

Klima der Eiszeit.

Stellt sich die Einbildungskraft alle die Alpen umgebenden Länder auf die Entfernung von mehren Myriametern unter Eis vergraben vor, so zittert sie sozusagen vor dem Gedanken an die entsetzliche Kälte, welche diese erstaunliche Entwickelung der Gletscher voraussetzt. Es scheint, als ob die Klimate Sibiriens nichts genügend Strenges darbieten, um das beständige Vorhandensein dieses über Gegenden ausgebreiteten Eismantels zu erklären, welche jetzt ein gemäßigtes Klima ge-

Digitized by Google

nießen. Es läßt sich zeigen, daß diese Vorstellungen sehr übertrieben sind.

Nach dem, was wir über die Umwandlung des Schnees in Eis durch wiederholtes Schmelzen und Gefrieren gesagt haben, wird man begreifen, daß es keine Gletscher bei einem Klima von übermäßiger Kälte, wie das im Norden von Asien, geben könnte. Spitzbergen, welches im höchsten Grade die Vorstellung eines von Gletschern überzogenen Landes verwirklicht, indem sie überall bis ans Meer hinabsteigen, besitzt eine mittlere Temperatur von 8 Graden C. unter Null, die des Sommers beträgt 2°,4 darüber. Island, wo die Gletscher am Meeresufer Halt machen, dasselbe aber nicht überschreiten, wie die von Spitzbergen, bietet auf seinen verschiedenen Punkten eine mittlere, zwischen Null und + 4° liegende Temperatur dar. Uebrigens können wir uns vermöge einer sehr einfachen Berechnung eine Vorstellung von dem Klima machen, welches die Gletscher des Montblanc bis an die Gestade des Genfer Sees zu führen vermochte. Die mittlere Temperatur dieser Stadt beträgt 9°,16. Auf den umliegenden Bergen befindet sich die Grenze des ewigen Schnees, wie wir gesehen haben, 2700 Meter über dem Meere. Die großen Gletscher des Chamounithales steigen bis auf 1550 Meter unter diese Linie herab. Nehmen wir nun an, daß die mittlere Temperatur von Genf nur um 4 Grad fiele und folglich 5°,16 würde. Da die Abnahme der Temperatur mit der Höhe einen Grad auf 188 Meter beträgt, so wird die Grenze des ewigen Schnees auf 750 Meter sich erniedrigen und nur noch 1950 Meter über dem Meere betragen. Man wird ohne Schwierigkeit zugestehen, daß die Gletscher von Chamouni unter diese neue Grenze um eine mindestens gleiche Menge herabsteigen würden, als zwischen ihrer jetzigen Grenze und ihrem untern Ende vorhanden ist. Nun befindet sich gegenwärtig der Fuß dieser Gletscher 1150 Meter über dem Ozean;

Digitized by Google

bei einem um 4 Grad kältern Klima wird er ſich 750 Meter tiefer, d. h. auf gleicher Höhe mit der Schweizer Ebene befinden. Demnach würde das Fallen der ewigen Schneelinie hinreichen, um die Gletſcher von Chamouni bis Genf gelangen zu laſſen. Doch darf man nicht vergeſſen, daß ein Gletſcher um ſo tiefer ſteigt, je weiter der Cirkus iſt, aus dem er hervorkommt; nun werden Gletſcher, welche als Speiſungsbecken alle über 1950 Meter Höhe erhabenen Thäler und Schluchten beſitzen, allein darum ſchon weit tiefer herunterſteigen als früher. So macht die vereinte Wirkung dieſer beiden Urſachen, das Fallen der Linie des ewigen Schnees und die Vergrößerung der Mulden, Urſachen, deren jede einzeln genommen hinreichen würde, die ehemalige Ausdehnung der Gletſcher zu erklären, es begreiflich, wie der Arvegletſcher ehemals bis in die Umgegend von Genf vordringen konnte. Vergeſſen wir nicht, daß dieſe Ausdehnung das Werk einer langen Reihe von Jahrhunderten geweſen iſt, deren Zahl uns ſozuſagen durch jene Millionen von Blöcken enthüllt wird, welche der Gletſcher langſam und allmälig vom Fuße des Montblanc bis an die Ufer des Genfer Sees mit ſich geführt hat.

Das Klima, welches dieſe erſtaunliche Entwickelung der Gletſcher begünſtigte, hat nichts, wovon wir uns nicht eine ganz genaue Vorſtellung machen könnten, es iſt das Klima Upſalas, Stockholms, Chriſtianias und des nördlichen Theiles von Amerika im Staate New-York. Den Geologen, welche nicht zaudern, die mittleren Temperaturen der kalten oder gemäßigten Zonen um 10 bis 15 Grade zu erhöhen, um das Vorkommen im Schoße der Erde von tropiſchen Farnen oder Thieren der heißen Länder zu erklären, würde es, dünkt mich, ſchlecht anſtehen, ſich über dieſe Veränderung der mittlern Jahrestemperatur zu ereifern, weil die Umwandlung in anderer Richtung vor ſich geht und das Thermometer fällt, ſtatt zu ſteigen. Wenn man zugiebt,

Digitized by Google

daß das Klima eines Theiles des Erdballes ſich hat verändern können, ſo iſt es eben ſo zuläſſig, anzunehmen, daß es ſich abgekühlt, als daß es ſich erwärmt habe. Die mittlere Temperatur einer Gegend um 4 Grade vermindern, um eine der größten Umwälzungen des Erdballs zu erklären, iſt ſicher noch lange nicht die verwegenſte Hypotheſe, welche die Geologie ſich erlaubt hat.

Die Urſachen zu erörtern, welche dieſes Sinken der Temperatur hervorgerufen haben, die geologiſchen oder meteorologiſchen Veränderungen anzugeben, welche dieſe lange Kälteperiode herbeigeführt haben, ſcheint mir ein durchaus verfrühter Verſuch zu ſein. Vor Allem muß man die Karte der ehemaligen Ausdehnung der Gletſcher entwerfen; nun iſt dieſelbe kaum für die Alpen, die Vogeſen und die ſchottiſchen Gebirge ſkizzirt. Alte Moränen ſind in den Pyrenäen, dem Altai, dem Kaukaſus und dem Atlas vorhanden, doch hat noch Niemand die Topographie der Gletſcher unternommen, welche dieſelben vor ſich her geſchoben haben. Schweden, Norwegen, Dänemark, Finland, der Norden Amerikas waren mit großen Eisflächen bedeckt, deren ſüdliche Grenze noch zu beſtimmen bleibt. Was kann man alſo Sicheres über die Urſachen eines Phänomens ſagen, deſſen Ausdehnung wir nicht kennen? Ahmen wir nicht unſere Vorgänger nach, deren glänzende Einbildungskraft die kühnſten allgemeinen Theorien auf die gebrechliche Unterlage einiger iſolirter und unvollſtändiger Thatſachen ſtützte. All' dieſe voreiligen Werke ſind dazu beſtimmt, unterzugehen. Die Wiſſenſchaft hat uns einen neuen Abſchnitt in der Geſchichte unſeres Planeten enthüllt, ein mächtiges Feld eröffnet ſich den Phyſikern, Aſtronomen und Naturforſchern. Fürchten wir nicht, einen forſchenden Blick in die Tiefen jener fernen Vergangenheit zu werfen, deren Spur die Oberfläche der Erde bewahrt hat; verwerfen wir dagegen jene Hypotheſen, welche den Thatſachen

Digitized by Google

vorangehen und welche der anſcheinend geringfügigſte Umſtand unerbittlich über den Haufen ſtößt. Doch hüten wir uns auch, in das entgegengeſetzte Extrem zu verfallen. Neben der Diluvialperiode ſehen wir die Gletſcherperiode auftauchen, denn ſie iſt uns durch das aufmerkſame Studium wohlbeobachteter Thatſachen und nicht durch eitle Spekulationen enthüllt worden. Erneuern wir nicht die müßigen Streitfragen der Neptuniſten und Vulkaniſten; die gerechte Nachwelt hat zwiſchen ihnen gerichtet. Sie hatten beide gleich unrecht als leidenſchaftliche Parteigänger einer ausſchließlichen Idee, ſie hatten beide gleich recht durch die Thatſachen und Beobachtungen, welche ſie zur Unterſtützung ihrer abſoluten Theorien vorbrachten. Alle Geologen der Gegenwart ſind Neptuniſten und Vulkaniſten zugleich, die Wiſſenſchaft iſt auf Seite des Waſſers wie des Feuers getreten. Ebenſo wird es ſich mit Gletſchern und Strömungen verhalten. Die einen wie die andern haben ihre Rolle in der Vergangenheit geſpielt, wie ſie ſie noch gegenwärtig ausfüllen. Die Erſcheinungen ſind dieſelben geblieben; ſtatt jener gigantiſchen Kundgebungen aber, welche charakteriſtiſch für die dem unſerigen vorangegangenen geologiſchen Abſchnitte ſind, beſchränken ſie ſich auf die Thätigkeitsgrenzen, welche ihnen durch das Gleichgewicht der bezüglichen Ruheperiode, worin der Menſch auf der Erde erſchien, auferlegt werden.

Digitized by Google

Zwei wissenschaftliche Besteigungen des Montblanc.

Seit mehren Jahren sind die Bergbesteigungen in die Mode gekommen; jeden Sommer brechen Touristen von allen Punkten Europas auf, um sich den Alpen zuzuwenden, und erklimmen um die Wette die unzugänglichsten Gipfel. Bald werden alle jene Schneespitzen, deren jungfräuliche Weiße ein bei den Dichtern sehr beliebtes Sinnbild war, ihres Magdthums beraubt sein. Alpenklubs haben sich in England, in der Schweiz, in Oesterreich, in Italien gebildet. Die Mitglieder derselben suchen es einander an Eifer und Kühnheit zuvorzuthun, ein edler Wettstreit, eine berechtigte Eigenliebe reizt und beseelt sie. Die kleine Anzahl von Gipfeln, welche ihr Fuß noch nicht betreten hat, ist zu zählen. Wir loben diesen Eifer, wir nehmen diesen Erfolg beifällig auf. Wo wäre auch eine bessere Anwendung der Kraft, der Geschmeidigkeit und der Energie zu finden, welche die Jugend charakterisiren. Die stereotypen Uebungen der regelmäßigen Gymnastik, die kleinen Vorfälle und Hindernisse auf der Jagd in den wohlbekannten Ebenen, welche das väterliche Erbgut umgeben, können unternehmenden Geistern, von gesunden und kräftigen Körpern bedient, nicht genügen. Die

Digitized by Google

Alpen sind ein Tummelplatz, wo sie alle ihre physischen und moralischen Fähigkeiten entfalten können. Nächte, in den Sennhütten oder selbst unter einem Felsen nahe der Grenze des ewigen Schnees zugebracht, die wirklichen Schwierigkeiten und ernstlichen Gefahren der Gletscher, die unvorhergesehenen Hindernisse senkrechter den Zugang zu dem gewünschten Gipfel versperrender Felswände, die plötzliche Kälte, die Wirkungen der Luftverdünnung, Wolken, welche plötzlich das Gebirge in einen dicken Nebel einhüllen, die Gewitterstürme, deren Blitz so häufig die Spitzen trifft, die Dunkelheit, welche den Reisenden inmitten dieser Schnee- und Eiswüsten überrascht: das sind Abenteuer, würdig der Kraft und des Strebens einer männlichen und abgehärteten Jugend. Welch ein Vergnügen, Hindernisse zu besiegen und Gefahren zu trotzen, bei denen das Leben eigentlich selten auf dem Spiele steht, und welche Belohnung nach dem Siege! Von der Höhe des überwundenen Gipfels sieht man die Welt zu seinen Füßen liegen, das Auge schweift in die Ferne über Berg und Thal. Eine köstliche Ruhe folgt einer augenblicklichen Ermüdung, ein in der Ebene unbekannter Appetit würzt das bescheidene Mahl, welches der Führer auf dem mit Alpenblumen geschmückten Rasenteppich ausbreitet; eine reine Luft, ein glänzendes Licht verleihen allen Gegenständen eine in der dicken Atmosphäre der bewohnten Regionen unbekannte Schönheit, das Wohlbehagen des Körpers wirkt auf die Verfassung des Geistes zurück, der sich von edlen Wünschen und hohen Gedanken durchdrungen fühlt. Die armseligen Interessen und lächerlichen Eitelkeiten der Welt verschwinden in ihrer Kleinlichkeit, man erstaunt, sich je damit befaßt zu haben, gelobt sich, ihnen fürder fremd zu sein. Der Art sind die lebhaften und ungemischten Genüsse beschaffen, welche jeder gutgeartete Mensch in Gegenwart des großartigen Schauspiels, dessen Mittelpunkt er ist, empfinden wird. Noch

Digitized by Google

innigere Genugthuung ist demjenigen vorbehalten, welcher diesen Gipfel in der Absicht erklimmt, die Gesetze der physischen Welt, die Erscheinungen der Atmosphäre, die Ereignisse der Natur in diesen kalten Regionen zu untersuchen oder den Bau dieser Gebirge zu zergliedern, welche ein Chaos zu sein scheinen und in Wirklichkeit doch nur der Ausdruck einer noch unbekannten Regel sind. Diese Besteigungen sind wissenschaftliche; sie haben zur Summe unseres Wissens beigetragen; jene sind malerische Besteigungen, demjenigen, der sie unternimmt, Genugthuung gewährend, im Allgemeinen aber unnütz, denn Empfindungen theilen sich nicht mit; die Eindrücke sind persönlicher Art, und Alles geht in einer Reihe von Ausrufungen auf, welche der Bewunderung, der Befriedigung und dem gerechten Stolze des triumphirenden Touristen Ausdruck geben.

Ich möchte in diesem Bericht den Leser mit zwei wissenschaftlichen, in einem Zwischenraume von 57 Jahren unternommenen Besteigungen des Montblanc bekannt machen, den Nutzen derselben beweisen, den Vortheil zeigen, welchen die Wissenschaft daraus gezogen hat, und denjenigen andeuten, den sie noch von ähnlichen Unternehmungen erwartet. Die Gipfel der Alpen sind die höchsten Europas, nicht der Erde. Es sind Besteigungen unternommen worden in den Anden und auf dem Himalaya; hervorragende Gelehrte haben dort in Höhen, welche die des Montblanc übertreffen, verweilt und wichtige Entdeckungen gemacht; persönliche Erinnerungen und Arbeiten aber führen mich zu den Alpen hin, und ich ziehe es vor, mich zu beschränken, um mit Einsicht und Sachkenntniß von dem zu reden, was ich selbst gesehen und empfunden.

Bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts war das Centralmassiv der Alpen nur für seine Bewohner vorhanden, die der Ebene drangen niemals dahin. Das Fehlen oder die Schwierigkeit der Wege, welche weiter nichts als Fußpfade waren, der

Digitized by Google

Mangel an Gasthäusern, die Scheu vor dem Unvorhergesehenen überwogen die Neugierde. Am Fuß des Montblanc gelegen, der damals der verwunschene Berg (Montagne maudite) hieß, war das Chamounithal den Bevölkerungen an den Ufern des Genfer Sees unbekannt, obgleich die Priorei oder das Kloster der Benediktiner seit dem Jahre 1090 existirte und die Bischöfe von Genf dasselbe seit Mitte des 15. Jahrhunderts besuchten. Einer derselben, Franz von Sales, kam am 30. Juli 1606 dort an und blieb mehre Tage da. Nichtsdestoweniger ist es ein durch seine Wanderungen im Morgenlande berühmter Engländer, Richard Pococke, in Begleitung eines Landsmannes, Windham, welcher das Chamounithal im Jahre 1741 wirklich entdeckt, seine Schönheiten kennen gelehrt und die lächerlichen Befürchtungen zerstreut hat, welche die vorgebliche Barbarei der Einwohner einflößte. Allein zu sehr von den unsinnigen und lügnerischen Berichten eingenommen, welche zuversichtlich feil geboten wurden, um sie von ihrem Vorhaben abzubringen, umgaben sich Pococke und Windham mit unnöthigen Vorsichtsmaßregeln, gingen in kein Haus hinein und kampirten ziemlich weit von der Priorei von Chamouni bei einem erratischen Blocke, der noch Pierre des Anglais heißt. Das Chamounithal ist also von einem Fremden entdeckt worden; doch sind es Genfer, Bourrit, de Sauſſure, Pictet und Deluc gewesen, welche es wirklich bekannt machten. Was von den Umgebungen des Montblanc gilt, gilt noch weit mehr von denen des Monte Rosa, ja selbst der Berner und Walliser Alpen. Zur Zeit, von der die Rede ist, kannte man nur die besuchten Pässe, welche nach Italien führten, den Mont Cenis, den großen und kleinen St. Bernhard, den Monte Moro, den Simplon, den St. Gotthard, den Splügen, den Bernhardin, den Septimer oder auch die übrigen Pässe, wodurch die Längsthäler der Alpen unter sich in Verbindung stehen, die Gemmi, die Grimsel, den

Digitized by Google

Julier, die Albula, den Panix u. s. w. Die Reisen des Naturforschers Scheuchzer, die beschreibenden Werke von Altmann und Grüner enthüllten die Schweiz Europa zu Anfang des 18. Jahrhunderts; aber erst am Ende dieses Jahrhunderts machten sie die Arbeiten Saussure's und Bourrit's populär. Seit dieser Zeit hat der Strom von Reisenden, welche sie jährlich besuchen, unaufhörlich zugenommen. Gegenwärtig ist die Schweiz ein von Eisenbahnen und Dampfböten durchkreuzter Park, der Fußreisende ist aus den Ebenen verschwunden und findet sich nur noch im Gebirge. Die Touristenbesteigungen haben sich vermehrt, während die der Gelehrten stets selten sind; beginnen wir mit der berühmtesten von allen, der Besteigung Saussure's im Jahre 1787.

Besteigung von Saussure.

Zu Genf im Jahre 1740 geboren, begann Horace Benedict de Saussure seine Reisen in die Alpen im Alter von zwanzig Jahren. Die Meteorologie, die Topographie, die Geologie, die Botanik, das malerische Aussehen und die Sitten der Bewohner hatten wechselsweise seine Aufmerksamkeit gefesselt. Um sein Werk zu vollenden, wollte er auf den Montblanc steigen und von dieser hohen Warte aus die ungeheure Bergregion, welche er durchstreift hatte, mit einem Blicke umfassen. Diese imposante Masse, welche er in ihrer ganzen Majestät von den Ufern des Genfer Sees und fast aus den Fenstern seines Hauses gewahrte, war für ihn eine beständige Herausforderung. Auch hatte er einen Preis für denjenigen ausgesetzt, der zuerst den für unersteiglich geltenden Gipfel des Montblanc erreichen würde. Einige schüchterne Versuche finden im Jahre 1775 statt und werden im Jahre 1783 erneuert. Bourrit macht im Jahre 1784 einen Versuch, Saussure selbst nimmt im Jahre 1785 den

Digitized by Google

Koloß vom Berge de la Côte zwischen dem Glacier des Bossons und dem von Taconnay in Angriff. Im Jahre 1786 stiegen der Doctor Paccard, Jacques Balmat und Marie Coutet, denselben Weg einhaltend, hinauf und erhoben sich über den Dôme du Gouté, ohne von da bis zum Gipfel gelangen zu können; Balmat stieg nicht wieder nach Chamouni herab, sondern brachte die Nacht auf dem Schnee zu und erkannte am andern Tage die Runsen des kleinen und des großen Plateaus, durch welche man jetzt zur Spitze gelangt. Er theilte seine Entdeckung dem Doctor Paccard mit, und alle Beide erreichten, nachdem sie von Chamouni den 7. August aufgebrochen waren, folgenden Tags um sechs Uhr Abends den Gipfel.

Der Weg war nun bekannt. Den 1. August 1787 brach Saussure mit achtzehn Führern von Chamouni auf und übernachtete unter einem Zelte auf der Höhe des Berges de la Côte, 2563 Meter über dem Meere. Am folgenden Morgen betrat er von sechs Uhr an den Gletscher, um ihn nicht mehr zu verlassen. Querspalten, welche er umgehen mußte, verzögerten seinen Marsch, und er bedurfte drei Stunden, um an die kleine Kette isolirter Felsen am Zusammenflusse des Glacier des Bossons und des Glacier de Taconnay zu gelangen, welche den Namen der Grands Mulets tragen. Saussure wollte sich so hoch wie möglich erheben, um folgenden Tags frühzeitig auf dem Gipfel anzulangen. Er übernachtete auf dem Grand Plateau in der Höhe von 3890 Meter über dem Meere, 180 Meter höher, wie er selbst sagt, als der Gipfel des Piks von Teneriffa. Bereits durch einen langen Marsch ermüdet und die Wirkungen der Luftverdünnung erleidend, hatten die Führer große Mühe, im Schnee eine Vertiefung auszugraben, welche hinreichte, den ganzen Trupp aufzunehmen. Die Vertiefung ward mit dem Zelte bedeckt; die Führer aber, stets mit der Furcht vor der Kälte beschäftigt, schlossen die Fugen so genau,

Digitized by Google

daß Sauſſure viel von der Hitze und der durch die Ausdünſtung von zwanzig in engem Raume zuſammengedrängter Perſonen verdorbenen Luft zu leiden hatte. „Ich war," ſagt er, „während der Nacht genöthigt, hinauszugehen, um Athem zu ſchöpfen. Der Mond ſtrahlte in höchſtem Glanze mitten an einem Himmel ſchwarz wie Ebenholz. Jupiter kam ebenfalls ganz ſtrahlend von Licht hinter der höchſten Spitze im Oſten des Montblanc hervor, und die von dieſem ganzen Schneebecken zurückgeworfene Helle war ſo blendend, daß man nur die Sterne erſter Größe zu unterſcheiden vermochte." Kaum war die Mannſchaft eingeſchlafen, als ſie durch das Getöſe einer Lauine geweckt wurde, welche den Abhang hinabrollte, den man am folgenden Tage überſchreiten ſollte. Mit Tagesanbruch war Jedermann auf den Beinen, das Thermometer zeigte 4 Grad unter Null. Das äußerſte Ende des Grand Plateau gewinnend, ſtieg Sauſſure an einer ſteilen Böſchung in öſtlicher Richtung empor und entdeckte, ſich über die Rochers Rouges erhebend, die Gebirge von Piemont, kam an den Petits Mulets vorbei, welche den Schnee 4680 Meter über dem Meere durchbrachen, ruhte daſelbſt einige Augenblicke aus und gelangte, langſam ſteigend und alle fünfzehn oder ſechzehn Schritte innehaltend, um elf Uhr auf dem Gipfel an, wo er den Schnee in einer Art befriedigten Grimmes als Ausdruck des langen Kampfes, den er beſtanden, mit den Füßen ſtampfte. Die Zinne hatte die Form eines länglichen Kammes, in Geſtalt eines Eſelsrückens von Oſten nach Weſten gerichtet, und fiel an beiden Enden unter Winkeln von 28° bis 30° ab; ſie war ſehr ſchmal, auf der Spitze faſt ſchneidig, der Art, daß zwei Perſonen nicht neben einander gehen konnten, doch verbreiterte und rundete ſie ſich, auf der Oſtſeite ſich erniedrigend und nahm an der Weſtſeite die Form eines nach Norden vorſpringenden Wetterdaches an.

Während ſeiner ganzen Beſteigung von dem Grand Plateau

Digitized by Google

an hatte Sauſſure bemerkt, daß die über dem Schnee ſichtbaren Felſen ſämmtlich kryſtalliniſcher Natur waren, obgleich mehr oder minder in parallele Platten zertheilt; ſie gehören ſämmtlich der von den jetzigen Geologen Protogin genannten Abart des Granits an, worin der Talk zu den übrigen Gemengtheilen des Granits, dem Quarz, Feldſpath und Glimmer, hinzutritt. Die Hörner beherrſchend, von denen er bisher nur den Fuß beſucht hatte, ſtellte Sauſſure feſt, daß ſie aus großen ſenkrechten Platten beſtehen, er erkannte, daß dieſe Hörner eine gleichförmige Struktur haben, während die Gebirge mit wagerechten Lagern, wie der Buet, auf dem Gipfel von Schichten ſekundärer Gebirgsarten begrenzt werden. Indem er einen allgemeinen Blick auf die ihn umgebenden primären Gebirge warf, ſah er, daß ſie keine Ketten bilden, ſondern daß ſie in unregelmäßige und von einander getrennte Gruppen vertheilt erſcheinen. Die Zeit drängte. Sauſſure wandte ſich von dieſem großartigen Schauſpiel ab, um ſeine meteorologiſchen Inſtrumente zu befragen. Seine erſte Sorge war, ſein Barometer und ſeine Thermometer ein Meter über der Spitze aufzuhängen. Das Barometer zeigte 434,38 Mm. an, und die Temperatur der Luft betrug 2°,9 unter Null. Zwei Gelehrte beobachteten das Barometer zur ſelben Stunde; der eine, in Genf, war Senebier, welcher ſo viel zum Fortſchritt der Pflanzenphyſiologie beigetragen hat, der andere, in Chamouni, der Sohn Sauſſure's ſelbſt, Theodor, damals zwanzig Jahre alt und ſeitdem durch ſeine Arbeiten in der Chemie berühmt geworden. Sauſſure fand, indem er die Höhe des Montblanc nach dieſen Beobachtungen mit Delucs von Schukburgh abgeänderter Formel berechnete, 4824 Meter für die Erhebung der Spitze über dem Meere. Man wird weiter unten ſehen, daß dieſe Meſſung nur um 14 Meter zu hoch war, ein bemerkenswerthes Ergebniß für die damalige Zeit, wenn man die Unvollkommenheit der Inſtrumente, die Unzulänglichkeit der

Digitized by Google

Formeln, welche den Berechnungen als Grundlage dienten, im Vergleich zu den ſeitdem von Laplace und Beſſel gegebenen, und die Unſicherheit in Betracht zieht, in der man ſich damals rückſichtlich der Erhebung über dem Meere der korreſpondirenden Stationen Genf und Chamouni befand. Der Montblanc war das höchſte Gebirge Europas und die Ausſicht, welche Sauſſure vor ſich hatte, die ausgedehnteſte, die man auf unſerm Kontinent genießen kann. Iſt das Meer von dieſem Gipfel aus ſichtbar? In Wirklichkeit nicht. Gegen die Grenzen des Horizonts verſchwimmen die Gegenſtände in einer Art von Höhenrauch; man unterſcheidet nichts mehr, man ſieht nur den Raum. Der Golf von Genua bei Savona iſt der dem Montblanc nächſtgelegene Theil des Mittelländiſchen Meeres, und wenn derſelbe nicht von Gebirgen eingefaßt wäre, ſo könnte der Sehſtrahl des auf der Spitze ſtehenden Beobachters das Meer zwiſchen Albenga und Noli erreichen, wo die Gruppe der liguriſchen Alpen von den Seealpen durch einen Einſchnitt getrennt iſt; von der Höhe der benachbarten Gebirge dieſer beiden Städte aber muß der Gipfel des Montblanc ſichtbar ſein, wie er es von Dijon, vom Gipfel des Mezenc in der Haute-Loire, ja, wie man ſagt, ſelbſt vom Plateau von Langres aus iſt.

Um zwei Uhr gab das Thermometer Sauſſure's für die Temperatur der Luft im Schatten —3°,1; tiefer ging es nicht herunter, und in der Sonne wies es beſtändig —1°,7. Mit Hülfe des Hygrometers, den er erfunden hatte, erkannte Sauſſure, daß die Luft ſechsmal weniger Feuchtigkeit als zu Genf enthielt. Bei ſchönem Wetter iſt dieſe Trockenheit nichts Außergewöhnliches auf einem ſo hohen Gipfel, obgleich die Luft durchſchnittlich eben ſo feucht auf dem Gebirge als in der Ebene iſt.

Das Waſſer ſiedet, wenn die Spannkraft ſeines Dampfes gleich iſt dem atmoſphäriſchen Drucke, d. h. dem Gewicht der Luftſäule, welche über der Flüſſigkeit ſteht. Es iſt klar, daß

Digitized by Google

die Höhe dieser Säule abnimmt, je mehr man sich auf einem Berge erhebt. So ist, wenn man sich 2000 Meter über dem Meere befindet, die Luftsäule, welche über unserm Kopfe steht, 2000 Meter kürzer, und das Wasser muß bei einer geringern Temperatur als am Ufer des Meeres, über welchem die atmosphärische Säule ihre ganze Höhe besitzt, ins Kochen gerathen. Saussure hatte sich am 22. April 1787 am Ufer des Mittelländischen Meeres selbst überzeugt, daß sein Thermometer, in das Wasser eines mit einer Weingeistlampe geheizten Kessels getaucht, 101°,6 unter einem atmosphärischen Drucke von 761,54 Mm. zeigte. Auf der Spitze des Montblanc kam das Wasser, da die barometrische Säule nur noch 434,38 Mm. Länge besitzt, mit 86°,0 ins Sieden. Unter diesem Drucke hätte das Thermometer Saussure's 85°,10 ausweisen müssen; doch wußte man damals noch nicht, daß die Natur des Gefäßes und seiner Wände den Moment des Siedens des Wassers verzögert oder beschleunigt, man wußte nicht, daß man das Thermometer nicht in die Flüssigkeit selbst, sondern nur in den Dampf des siedenden Wassers tauchen muß. Ueberdies hatten Dalton, Arago, Dulong und Regnault noch nicht jene großen Arbeiten über die Dämpfe ausgeführt, aus denen wir gelernt haben, wie groß die Temperatur und die Spannkraft des Wasserdampfes unter verschiedenem Drucke sind. Aus allen diesen Gründen sind die Resultate Saussure's nur annähernd richtig, aber so genau, als sie es zur Zeit, wo er beobachtete, nur sein konnten. Deluc war ihm auf diesem Wege schon vorangegangen, indem er das Wasser auf dem Gipfel des Buet, 3098 Meter über dem Meere, sieden ließ, und die von den beiden Genfer Gelehrten erhaltenen Zahlen bestätigten sich gegenseitig.

Als Saussure sein Experiment des Wassersiedens am Meeresufer mit seiner Weingeistlampe machte, gerieth das Wasser ins Sieden, indem es binnen 12—13 Minuten die Temperatur

Digitized by Google

von 101°,6 erlangte. Auf dem Montblanc war eine halbe Stunde erforderlich, um die Temperatur auf 86°,0 zu bringen, die Verdünnung der Luft und die niedrige Temperatur erklären vollkommen dieſen Unterſchied. Dieſelben Umſtände, verbunden mit der Ermüdung und der Abweſenheit des Schlafes, geben ebenſo Rechenſchaft von dem beſchwerlichen Athmen, der Beſchleunigung des Pulſes, dem Kopfſchmerz und der Neigung zum Schlaf, welche Sauſſure und ſeine Gefährten empfanden, ſo lange ſie in Bewegung waren, Symptome, welche im Zuſtande der Ruhe verſchwinden und ſich durch Gewohnheit abſtumpfen.

Um drei und ein halb Uhr, nach einem Aufenthalt von vier und einer halben Stunde auf dem Gipfel des Montblanc, ſetzte ſich Sauſſure wieder in Marſch, um hinabzuſteigen. Da der Schnee ſich erweicht hatte, ſo ſank er bei jedem Schritte ein; trotzdem langte er in fünfviertel Stunden beim großen Plateau an, wo er die vorige Nacht zugebracht hatte, überſchritt daſſelbe und ſtieg bis zum vorletzten Felſen der Kette der Grands Mulets, 3470 Meter über dem Meere erhaben, hinab; er nannte ihn den Fels der glücklichen Rückkehr (Rocher de l'heureux retour) und bemerkte daſelbſt mit Ueberraſchung das ſtengelloſe Leinkraut*) in Blüthe. Dieſe niedliche Pflanze erhebt ſich am höchſten in den Gebirgen Europas. Die Gebrüder Schlagintweit haben ſie auf dem Monte Roſa bei 3630 Meter geſehen, Ramond hat ſie auf dem Vignemale und auf dem Mont Perdu in den Pyrenäen bei 3000 Meter gepflückt. Anderſeits rückt ſie auf Spitzbergen bis zum 80. Grade der Breite vor, wo man ſie am Meeresufer findet. Es iſt alſo die am wenigſten froſtige Pflanze unſerer Erdhälfte und zugleich diejenige, welche ſich am höchſten auf dem Gebirge erhebt und ſo tief herabſteigt, als eine Landpflanze nur herabſteigen kann, da man ſie ſelbſt im nördlichen Norwegen am

*) Silene acaulis L.

Digitized by Google

Ufer des Meeres beobachtet. Sauſſure lehnte ſein Zelt gegen den Felſen. „Wir aßen," ſagt er, „fröhlich und mit gutem Appetit zu Abend, worauf ich auf meiner kleinen Matratze eine prächtige Nacht zubrachte. Da erſt genoß ich das Vergnügen, jenen ſeit 27 Jahren, ſeit meiner erſten Reiſe nach Chamouni im Jahre 1760 gefaßten Plan ausgeführt zu haben, einen Plan, den ich ſo oft aufgegeben und wieder aufgenommen hatte, und der für meine Familie einen beſtändigen Gegenſtand der Sorge und der Unruhe bildete. Es war für mich eine Art von Krankheit geworden; wenn meine Augen auf den Montblanc fielen, den man von ſo vielen Punkten in der Umgegend von Genf erblickt, ſo empfand ich eine Art von ſchmerzhafter Beklemmung. Im Augenblick, wo ich oben anlangte, war meine Befriedigung nicht vollſtändig, ſie war es noch weniger im Augenblicke meines Aufbruches; ich ſah da nur, was ich nicht auszuführen vermocht hatte. In der Stille der Nacht aber, nachdem ich mich gehörig von meiner Anſtrengung erholt hatte, als ich mir die Beobachtungen, welche ich gemacht, vergegenwärtigte, vor Allem, als ich das prachtvolle Bild der Gebirge, das ich feſt eingeprägt im Kopfe trug, noch einmal an mir vorüberziehen ließ, koſtete ich eine wahre und ungemiſchte Befriedigung."

Folgenden Tags, den 4. Auguſt, brach Sauſſure erſt um ſechs Uhr Morgens auf; er war genöthigt, ſehr ſchroffe Abhänge hinabzuſteigen, um neue Spalten zu umgehen, welche ſich während der Beſteigung gebildet hatten. Unter den Grands Mulets war der Gletſcher völlig verändert, die Spalten hatten ſich erweitert, die Brücken waren zuſammengebrochen, und nur mit unendlicher Mühe erreichte der Zug um neun und ein halb Uhr Morgens feſten Boden. Um zwölf und ein viertel Uhr langten Alle wohlbehalten wieder in Chamouni an. „Unſere Ankunft," ſagt Sauſſure, „war fröhlich und rührend zugleich,

Digitized by Google

alle Verwandten und Freunde meiner Führer kamen, sie zu umarmen und zu beglückwünschen. Meine Frau, ihre Schwestern und meine Söhne, welche zu Chamouni eine lange und und ängstliche Weile in Erwartung dieser Expedition zugebracht hatten, mehre unserer Freunde, welche von Genf herbeigekommen waren, um bei unserer Rückkehr zugegen zu sein, drückten in diesem glücklichen Augenblicke ihre Befriedigung aus, welche die Befürchtungen, die derselben vorangegangen waren, je nach dem Grade von Antheil, den wir eingeflößt hatten, um so lebhafter und rührender machten."

Das ist kurz die Erzählung der ersten großen wissenschaftlichen Besteigung, welche in den Alpen unternommen wurde, und der bündige Abriß der Hauptresultate, welche die Wissenschaft daraus gezogen hat; sie hat allen andern als Muster gedient, denn Sauſſure hatte gewissermaßen das Programm der zu unternehmenden Experimente, der anzustellenden Beobachtungen und der zu lösenden Probleme formulirt.

Während eines Zeitraumes von siebenundfünfzig Jahren von 1787 bis 1843 fanden siebenundzwanzig Besteigungen des Montblanc Statt, keine aber hat einen wirklich wissenschaftlichen Charakter. Eine edle Wißbegierde, das Verlangen, diese Welt des ewigen Schnees zu besuchen und von der Höhe des Montblanc eines der großartigsten Schauspiele zu genießen, welche es dem Menschen gegeben ist zu betrachten, der Reiz der überwundenen Schwierigkeit, das sind die Beweggründe, welche die Mehrzahl der Reisenden bestimmten, und sicherlich, diese Beweggründe sind ein genügender Ersatz für die unvermeidlichen Beschwerden und die ziemlich bedeutende Ausgabe, welche eine derartige Expedition nach sich zieht. Doch haben mehre Reisende interessante Beschreibungen herausgegeben, worin man Angaben findet, aus denen die Wissenschaft Nutzen ziehen kann. Ich will besonders die Besteigung von Francis Clissold vom 18. Au-

Digitized by Google

guſt 1822, die von Markham Sherwill vom 27. Auguſt 1825, die eines Schotten, Auldjo, den 8. Auguſt 1827, und die des Doktors Martin Barry anführen, welcher Letztere, obgleich durchaus nicht im voraus dazu eingerichtet, doch wichtige Beobachtungen über die durch die Luftverdünnung hervorgerufenen phyſiologiſchen Erſcheinungen anſtellte. Die meiſten dieſer Reiſenden ſind Engländer, doch zählt man auch vier Franzoſen darunter, Herrn Henri de Tilly, Herrn Doulat, Fräulein d'Angeville und den Doktor Ordinaire, welcher den Montblanc zweimal, am 26. und 31. Auguſt 1843 beſtieg, nachdem er inzwiſchen den Buet erklommen und ſeine Rückkehr nach Chamouni über den Brevent bewerkſtelligt hatte. Seit 1844 haben ſich dieſe Beſteigungen ſehr vermehrt, und zwanzig Jahre ſpäter, am Ende des Jahres 1863, belief ſich die Geſammtſumme auf 171, wovon 3 im Juni, 36 im Juli, 84 im Auguſt, 47 im September und eine im Oktober*) angeſtellt wurden. Die äußerſten Zeitpunkte ſind der 1. Juni 1858, Beſteigung von Herrn J. Walford, und der 9. Oktober 1834, Beſteigung von Herrn de Tilly, welcher mit erfrorenen Füßen zurückkam und lange Zeit an den Folgen eines Verſuches zu leiden hatte, der in zu vorgerückter Jahreszeit und mit einer tollkühnen Achtloſigkeit der Gefahr des Erfrierens angeſtellt war, der begründetſten, welche man in dem Schnee läuft, welcher die Spitzen des Montblanc und des Monte Roſa bedeckt.

Beſteigung von Bravais, Martins und Lepileur.

Ich komme zur Erzählung der wiſſenſchaftlichen Beſteigung, welche ich im Jahre 1844 mit meinen Freunden Auguſte

*) Siehe das vollſtändige Verzeichniß dieſer Beſteigungen in dem Werke von Herrn Dollfus-Auſſet, betitelt: Matériaux pour l'étude des glaciers, t. IV. p. 589.

Digitized by Google

Bravais, Schiffslieutenant, und Auguſte Lepileur, Doktor der Medizin, unternommen habe. Mit Erſterem hatte ich Spitzbergen in den Jahren 1838 und 1839 während der beiden Reiſen der Recherche im Eismeer beſucht. Er hatte allein zu Boſſekop in Lappland überwintert, doch hatten wir im Jahre 1841 achtzehn Tage lang zuſammen auf dem Faulhorn, 2680 Meter über dem Meere, verweilt; er ſelbſt war das Jahr darauf mit dem Phyſiker Athanaſe Peltier daſelbſt zuſammengetroffen und dreiundzwanzig Tage geblieben. Die Vergleichung der nördlichen Regionen des Erdballs mit den alpinen Hochregionen war der gewöhnliche Gegenſtand unſerer Geſpräche. Auf dem Faulhorn hatten wir eine Menge Beobachtungen angeſtellt und eine gewiſſe Anzahl von Fragen angeregt, welche nur durch eine Beſteigung und einen Aufenthalt in bedeutender Höhe gelöſt werden konnten; wir dachten an den Montblanc. Herr Pouillet und Herr Riſard intereſſirten ſich aus verſchiedenen Gründen für unſer Projekt und theilten es dem damaligen Unterrichtsminiſter, Herrn Villemain, mit. Obgleich die Litteratur ſeinen Ruhm ausgemacht hatte, ſchätzte, liebte und beſchützte Herr Villemain doch die Wiſſenſchaften. Unſer Geſuch ward bewilligt, und er verſchaffte uns die Mittel, die erſte wirklich wiſſenſchaftliche Beſteigung, welche ſeit Benedict de Sauſſure unternommen worden, ins Werk zu ſetzen. In der Zwiſchenzeit von ſiebenundfünfzig Jahren hatten die phyſikaliſchen und Naturwiſſenſchaften ſolche Fortſchritte gemacht, daß ſchon die einfache Wiederholung der Experimente dieſes Phyſikers mit den vervollkommneten Inſtrumenten und neuen Methoden von großem Belang war, doch hofften wir noch außerdem einige Verſuche anzuſtellen, an welche dieſer große Meteorologe nicht gedacht hatte, oder welche die Zeit ihn gehindert hatte auszuführen.

Den 16. Juli 1844 in Paris aufgebrochen, hielten wir in

Digitized by Google

Genf an, um unsere Instrumente mit denen der Sternwarte dieser Stadt zu vergleichen und mit dem Direktor, Herrn Plantamour, ein System von Beobachtungen zu verabreden, welche mit denen, die wir auf dem Montblanc anstellen wollten, korrespondiren sollten. Wir verließen Genf den 26. Juli. Zu Fuß einem langen vierrädrigen Wagen folgend, der unser Geräth trug, langten wir den 28. in Chamouni an. Die Vorbereitungen nahmen uns einige Tage weg. Unsere Absicht war, so hoch als möglich auf dem Montblanc zu verweilen; wir hatten von Paris ein Lagerzelt mit Pfosten und Pflöcken, Ueberzieher aus Ziegenfellen, Fußsäcke aus Schaffellen, Decken u. s. w. mitgenommen. Unsere Experimente erforderten zahlreiche physikalische und meteorologische Instrumente, man bedurfte Lebensmittel auf drei Tage. Jeder Träger konnte sich nur mit 15 Kilogrammen und seinen eigenen Vorräthen belasten, und doch hatten wir etwa 450 Kilogramme eine Höhe von 3000 Meter über dem Chamounithale hinaufzuschaffen. Wir mußten selbst alle Vorbereitungen zur Besteigung überwachen, die Gegenstände gleichmäßig nach dem Gewicht vertheilen und das Loos darüber von den Trägern ziehen lassen, um jeden Streit und jede Beschwerde zu vermeiden, uns mit der Zurüstung der Lebensmittel beschäftigen, Wein und Brot einkaufen und sie endlich eigenhändig am Tage der Abreise vertheilen. Statt jener Ruhe des Geistes, jener Sammlung, die der Mann der Wissenschaft so sehr bedarf, bevor er seine Arbeiten unternimmt, wurden wir durch tausenderlei gewöhnliche Einzelheiten, durch tausenderlei ärgerliche Schwierigkeiten zerstreut, die unter den gewöhnlichen Verhältnissen im Leben nicht vorkommen, nun aber im Augenblicke, wo wir das gebieterische Bedürfniß empfanden, durch nichts abgezogen zu werden, über uns hereinbrachen.

Unser Zug belief sich auf dreiundvierzig Personen, wor-

Digitized by Google

unter drei Führer, Michel Coutet, Jean Mugnier und Theodore Balmat, fünfunddreißig Träger und zwei junge Leute aus dem Thal, welche gebeten hatten, uns begleiten zu dürfen. Am 31. Juli, Morgens ſieben und ein halb Uhr, verließen wir endlich Chamouni. Das Wetter war ſchön, doch wehte der Wind aus Südweſten, und das Barometer war etwas geſunken; unſere Vorbereitungen aber waren beendet, wir brachen alſo auf, ohne vollkommenes Vertrauen in die Haltung des Wetters zu ſetzen, jedoch auf Beſſerung hoffend. Die lange Reihe der Träger dehnte ſich das rechte Arveufer entlang inmitten grüner Wieſen aus. Dem Weiler des Pelerins gegenüber angekommen, wandten wir uns zur Linken. Das letzte Haus im Dorfe iſt das von Jacques Balmat, des erſten Mannes, deſſen Fußſtapfen ſich dem noch jungfräulichen Schnee der Montblancſpitze eindrückten und der im Jahre 1834 elendiglich in den Gletſchern, welche das Sixtthal beherrſchen, umkam. Die Obſtgärten, welche den Flecken des Pelerins umgeben, verlaſſend, betraten wir den Wald; derſelbe beſteht aus hohen Fichten und alten Lärchen, an deren Zweigen lange Gewinde einer gräulichen Flechte*) herabhängen. Im vorigen Frühling hatte eine ungeheure, von der Aiguille du Midi herabgeſtürzte Lawine eine breite Furche im Walde gegraben. Entwurzelte Bäume bedeckten den Boden, den ſie früher beſchatteten, andere waren in der Mitte geknickt, und der abgeſchlagene Wipfel lag am Fuße derſelben hingeſtreckt, einige, nur an den Wurzeln entblößt, hingen übergeneigt nach dem Thale. Dieſe Wirkungen rühren eben ſo ſehr von dem Drucke der durch die Lawine vorwärtsgetriebenen Luft, von dem örtlichen Winde, welchen ſie hervorruft, als vom Schnee ſelbſt her. Der Zug hatte ſich im Gehölz zerſtreut, Jeder ſuchte ſich ſeinen Weg aus. So ge-

*) Usnea barbata DC.

Digitized by Google

langten wir ohne Mühe an die Pierres Pointues; es sind dies zwei große Granitblöcke, welche sich von der Aiguille du Midi abgelöst haben und an diesem Abhange liegen geblieben sind. Auf einem dieser Blöcke aufrecht stehend, hob sich der eine unserer Führer gegen den Himmel ab, während ihm die Luftperspektive eine riesige Größe wie einem Polyphem am Eingange seiner Höhle verlieh. Nach unserer barometrischen Messung befinden sich die Pierres Pointues 2060 Meter über dem Meere. Diese Höhe ist die äußerste Grenze der Baumvegetation, welche sich zu diesem Niveau über die Vorberge des Brevent erhebt. Der Pflanzenteppich bestand aus Alpenrosen, Heidelbeeren und verkrüppelten Wachholdern. Einige Arven, die einzigen, welche in dieser Höhe ausdauern können, kamen hier und da aus einer Felsspalte hervor. Der Stamm dieser Arven, erst wagerecht, richtete sich über dem Abgrunde, in welchem der Gießbach des Pelerins braust, empor. Ein schmaler Fußpfad zieht sich zur Seite des Abgrundes hin und führt zur Moräne des Glacier des Bossons, dann steigt man mitten zwischen den aufgehäuften Blöcken, welche sie bilden, hinan und erreicht endlich die Pierre de l'Echelle, einen ungeheuren Felsen, unter dem man die Leiter verbirgt, deren man sich gewöhnlich bedient, um die Querspalten des Gletschers zurückzulegen. Dieser Felsen liegt 2446 Meter über dem Meere, in derselben Höhe wie das Hospiz des St. Bernhard. Dort sagt der Reisende der Erde Lebewohl, er verläßt sie, um auf den Gletscher überzugehen, und bis zum Gipfel des Montblanc findet er nur noch vereinzelte Felsen, welche wie Eilande mitten aus den ewigen Schneegefilden emporragen.

Die ersten Schritte auf dem Eise bieten einige Gefahr dar. Ein kleiner sekundärer Gletscher, 200 Meter breit und von der Aiguille du Midi herabsteigend, endet plötzlich an einer senkrechten Felsenwand, welche diesen Theil des Glacier des Bos-

Digitized by Google

sons beherrscht. Von Zeit zu Zeit stürzt eine Lawine von Eisblöcken über diese Felsen herab, oder ein von der Aiguille du Midi losgelöster Stein beschreibt eine beunruhigende Parabel über dem Haupte des Reisenden. Trotzdem hat kein Unfall je den Antritt einer Besteigung getrübt; aber viele Touristen, welche voll Vertrauen von Chamouni aufbrechen, sind bei der Pierre de l'Echelle stehen geblieben, entmuthigt durch die Perspective von Eis und Schnee, welche sich vor ihnen eröffnete. Von diesem Punkte ab regelten wir unsern Marsch nach dem unserer Träger. Die drei Führer gingen uns voran, den Weg ausfindig machend und die bequemsten Uebergänge aussuchend, um die Querspalten zu überschreiten oder zu umgehen; Jeder folgte genau dem Eindrucke ihrer Füße. Aehnlich einem geschlängelten Bande rollte sich unsere Karawane auf dem Gletscher ab. Die dunkeln Kleider der Bergbewohner stachen gegen die Weiße des Schnees ab, und vom Chamounithale aus gesehen, glichen wir einem langen Zuge schwarzer Ameisen, welche Sturm auf ein Laib Zucker laufen. Alle Fernröhre waren auf uns gerichtet, und man erschöpfte sich in Muthmaßungen. Oft verschwand plötzlich ein Theil des Zuges; dies rührte daher, daß er auf eine Spalte stieß, die zu breit war, um sie überschreiten zu können; war die Tiefe nicht zu bedeutend, so stieg man auf den Grund nieder, um auf der andern Seite wieder emporzuklettern. Wir hielten auf die kleine Kette von Felsen zu, welche unter dem Namen der Grands Mulets bekannt sind. Halbwegs verwickelten wir uns mitten in große Massen mehr oder minder kompakten Eises, von den Einwohnern Savoyens Seracs (Gletscherkäse) nach einem würfelförmigen Käse, welcher in den Gebirgen fabrizirt wird, benannt. Die einen sind in der That ungeheure, aus regelmäßig über einander geschichteten Lagen von Firn und weißem oder blauem Eise gebildete Würfel, die andern viereckige Pyramiden von 15 bis

20 Meter Höhe. Einige bieten weniger regelmäßige, immer aber eckige Formen dar. Man hätte wähnen können ſich mitten unter den Ruinen einer alten Stadt oder eines Feldes druidiſcher Dolmen zu befinden. Ein Bach hatte ſich inmitten dieſes Labyrinths Bahn gebrochen, der Schnee, welcher unter der Hitze der Mittagsſonne ſchmilzt, hatte ihm das Daſein gegeben; bald hörte man ihn unter dem Eiſe murmeln, worin er ſich einen unterirdiſchen Kanal gegraben hatte, dann trat er ans Tageslicht in einer azurenen Furche rinnend, um in einen kleinen See zu münden, welcher in einem himmelblauen Becken ſchlummerte. Die Leiter wurde, da ſie als unnütz erkannt worden, am Fuße einer Pyramide gelaſſen; acht Tage ſpäter fanden wir ſie in tauſend Stücke zerbrochen zwiſchen den Trümmern der eingeſtürzten Pyramide.

Wir näherten uns dem Ziele: ſchon hatte der Schnee nicht mehr das Ausſehen, welches er in unſern Ebenen darbietet. Es war ein feiner und leichter Staub, in den man tief einſank, und der ſich nicht wie gewöhnlicher Schnee ballte. Der Marſch wurde ziemlich beſchwerlich, bei jedem Schritte mußte man das Bein aus dem Loche ziehen, worin es eingeſunken war. Die Anzeichen des Wetters waren keineswegs ermuthigend; der Südweſtwind ward ſtärker und führte ohne Unterlaß neue Wolken herbei, welche in gedrängten Zügen ins Chamounithal drangen. Die Ebene war unſern Blicken entſchwunden; wir waren von der bewohnten Welt durch ein Nebelmeer getrennt, welches ſich in die Ferne dehnte, und in deſſen Mitte die Berggipfel ſich gleich Klippen inmitten des Ozeans erhoben. Um drei und ein halb Uhr landeten wir auf den Grands Mulets; für uns war es ein Hafen, feſtes Land, ſicherer Boden, nach dem treuloſen Schnee, welcher uns die Spalten des Gletſchers verbarg; denn oft bildet eine dünne Schicht über einer tiefen Spalte eine

Digitized by Google

gefährliche Brücke, welche der Neuling in Bergen nicht von dem auf den vollen Theilen des Gletschers ausgebreiteten Schnee zu unterscheiden weiß. Die Grands Mulets sind aus senkrechten Platten einer krystallinischen, Protogin genannten Felsart gebildet; sie tauchen plötzlich mitten im Firn auf und trennen den obern Theil des Glacier des Bossons von dem von Taconnay. Die Felsenkette selbst ist von Nordnordost nach Südsüdwest die Flanken des Montblanc entlang gerichtet und in zwei Theile getheilt, einen untern und längern, wo man beim Ansteigen rastet, und einen obern, kürzern, wo Saussure bei der Rückkehr vom Gipfel übernachtete, und den er bekanntlich den Fels der glücklichen Rückkehr nannte. Der untere Theil liegt 3050, der obere 3470 Meter über dem Meere. Der Theil des Gletschers von Taconnay, über den man ankommt, bot in diesem Jahre eine Reihe schlichter, aber schroffer, durch schmale Plateaus geschiedener Abhänge dar. Der Cirkus des Glacier des Bossons war wie immer ein Chaos von Seracs, Nadeln und Eispyramiden, in deren Mitte die östliche Wand der Grands Mulets abfällt. Die senkrechten Platten, woraus diese Felsen bestehen, erheben sich zu verschiedenen Höhen und bilden eben so viel natürliche Stufen, welche alle Punkte zu erklimmen gestatten. Das verwitterte Gestein häuft sich zwischen den Platten an. Dort gedeihen hübsche Alpenpflanzen, geschützt von dem Felsen, erwärmt von den Sonnenstrahlen, welche er zurückwirft, befeuchtet vom Schnee, der selbst im Sommer oft diese Spitzen bleicht, aber schnell schmilzt, sobald die Sonne zwei bis drei Tage lang scheint. Binnen einigen Wochen vollenden diese Pflanzen alle Phasen ihres Wachsthums. Ich habe daselbst in drei Besteigungen 19 Phanerogamen gesammelt. Nachdem Herr Venance Payot diesem Verzeichnisse 5 Arten hinzugefügt hat, giebt es auf den Grands Mulets 24

Digitized by Google

Blüthenpflanzen*). Diesen 24 Phanerogamenarten muß man noch 26 Moosarten, 2 Lebermooſe und 30 Flechten hinzufügen, wonach die Gesammtsumme der Pflanzen, welche auf diesen mitten in einem Eismeere vereinzelten und scheinbar aller Vegetation beraubten Felsen wachsen, 82 beträgt. Wer sollte es glauben? Diese Pflanzen dienen einem Nagethiere, der Schneemaus**) zur Nahrung, demjenigen unter allen Säugethieren, welches sich am höchsten auf den Alpen erhebt, während die zum selben Geschlecht gehörenden Arten fast sämmtlich Bewohner der Ebenen sind.

Andere Studien nahmen unsere Zeit in Anspruch. Zuvörderst stellten wir das Experiment des Wassersiedens mit dem von Herrn Regnault empfohlenen Apparate an. Vor Allem galt es, den Nullpunkt unseres Thermometers durch Eintauchen in schmelzenden Schnee zu verificiren, was nach dem Versuche wiederholt werden mußte; dann setzten wir es in einen folgendermaßen eingerichteten Apparat. Auf ein Gefäß aus Blech, welches das Wasser enthält, das durch eine Weingeistlampe zum Sieden gebracht wird, passen genau zwei Cylinder, ebenfalls aus Blech, von denen der eine im andern steckt, die aber durch einen Zwischenraum von etwa 15 Millimeter getrennt sind. Das Thermometer steht in dem innern Cylinder mittelst eines diesen schließenden durchbohrten Pfropfens, über welchen seine Scala hinausreicht; es ist vollständig von Wasser-

*) Hier das Verzeichniß dieser Pflanzen: Draba fladnizensis Wulf., D. frigida Gaud., Cardamine bellidifolia L., C. resedifolia Saut., Silene acaulis L., Potentilla frigida Vill., Phyteuma hemisphaericum L., Pyrethrum alpinum Willd., Erigeron uniflorus L., Saxifraga bryoides L., S. groenlandica L., S. muscoides Auct., S. oppositifolia L., Androsace helvetica Gaud., A. pubescens DC., Gentiana verna L., Luzula spicata DC., Festuca Halleri Vill., Poa laxa Haencke, P. caesia Sm., P. alpina var. viripara L., Trisetum subspicatum Pal. Beauv., Agrostis rupestris All., Carex nigra All.

**) Arvicola nivalis Mart. Siehe Bd II. Seite 1.

dampf umgeben, der den Raum zwischen beiden Cylindern erfüllt, bevor er durch eine Seitenöffnung nach außen entweicht. Diese von unaufhörlich erneuertem heißem Dampf hergestellte Hülle schützt die innere Dampfsäule gegen die Einwirkung der sie umgebenden kalten Luft und erhält sie bei einer beständigen Temperatur. Wir fanden, daß das Wasser bei der Temperatur von 90°,17 unter einem barometrischen Drucke von 529,69 Mm. kochte. Zu Paris betrug der Siedegrad des Wassers am 14. Juli 99°,88, während das Barometer einen atmosphärischen Druck von 756,85 Mm. zeigte.

Bravais hatte es sich zur Aufgabe gestellt, die Veränderungen der magnetischen Intensität bei zunehmender Höhe zu messen. Zu dem Ende wendet man eine Boussole an, worin eine Nadel horizontal an einem ungezwirnten Seidenfaden aufgehängt ist. Man läßt diese Nadel während einer Reihe völlig gleicher Pausen oszilliren, und aus der Anzahl der Oszillationen schließt man nach unendlichen und äußerst sorgfältigen Korrektionen auf die bezügliche Intensität der magnetischen Kraft des Ortes, verglichen mit der von Paris, die als Einheit genommen wird. Man begreift die Bedeutung dieser Messungen, welche uns eines Tages die noch geheimnißvollen Gesetze der Strömungen enthüllen werden, welche um den Erdball, diesen kolossalen Magnet, kreisen, dessen beide Pole nicht mit den beiden Endpunkten der idealen Axe zusammen fallen, um welche die Erde ihre tägliche Umdrehung beschreibt.

Indessen näherte sich die Sonne dem Horizont, bereits war sie hinter den Monts Vergy verschwunden, die Thäler von Sallenche und Chamouni lagen schon längst im Schatten, während die in der Nähe befindlichen Granitspitzen rothglühend wie aus dem Feuer kommendes Eisen zu sein schienen. Alsbald erloschen die Aiguille de Varens und die Rochers des Fiz, und Dunkel hüllte die Gletscher des Montblanc ein. Dieser Schnee,

Digitized by Google

einen Augenblick zuvor noch ſo leuchtend, nahm die matte und bleierne Farbe eines Leichnams an, Todeskälte ſchien dieſe Regionen mit dem Dunkel zu überziehen und alle ihre Schrecken zu enthüllen. Die Aiguille du Goûté, die Monts Maudits erbleichten allmälig, nur die Spitze des Montblanc blieb noch einige Zeit hell; dann machte die Roſatinte, welche ſie belebte, der granblauen Tinte Platz, als ob das Leben auch ſie verlaſſen hätte. Gegen den Horizont über dem Wolkenmeere erſchien der Himmel hellgrün gefärbt, in Folge der Verbindung der gelben Strahlen der Sonne mit dem Blau des Himmelsgewölbes, die Umriſſe der einzelnen Wolken waren mit einem hellglänzenden Orangeſtreifen eingefaßt. In dieſen Hochregionen giebt es keine Dämmerung, die Nacht folgt raſch dem Tage. Wir zogen uns hinter eine Mauer zurück, die vor einer Höhlung trocken aufgeführt war. Unſere Führer waren auf den Felsſtufen um kleine Feuer gruppirt, die mit Wachholderreiſig, das ſie aus der Nähe der Pierre de l'Echelle mitgebracht hatten, unterhalten wurden. Sie intonirten einſtimmig langſame und monotone Geſänge, welche der Scene einen melancholiſchen Reiz verliehen. Allmälig verſtummte der Geſang, das Feuer erloſch und man vernahm nur noch das Getöſe mehrer von den benachbarten Höhen herabſtürzender Lauinen. Nicht lange, ſo ging der Mond hinter den Monts Maudits auf und, für uns nicht ſichtbar, den Dôme du Goûté beſtreichend, erhellte er den Schnee mit einem ganz eigenthümlichen Scheine. Als die Scheibe ſich von der Aiguille du Goûté ablöſte, war ſie mit einem grünlichen Strahlenkranze umgeben, welcher ſich auf einem Himmel ſchwarz wie Dinte abhob. Die Geſtirne funkelten ſtark, der Wind hatte ſich keineswegs gelegt, blies in plötzlichen Stößen, worauf Augenblicke völliger Ruhe folgten. Alles kündete uns für den folgenden Tag ſchlechtes Wetter an, Niemand aber dachte daran, umzukehren, wir wollten unſer Glück bis aufs

Digitized by Google

äußerſte verſuchen und erſt im Augenblicke zurückweichen, wo es uns unmöglich ſein würde, unſere Beſteigung fortzuſetzen.

Am folgenden Morgen, als wir beſchäftigt waren, die Laſten unſerer Träger, welche ihre gegenſeitigen Bürden ausgetauſcht hatten, wieder gleich zu machen, bemerkte ich plötzlich einen uns unbekannten Greis, der langſam den Abhang, welcher zum kleinen Plateau hinaufführt, erklomm; über den Schnee gebückt, ſich zuweilen mit den Händen unterſtützend und haltend, ſtieg er langſam, aber mit jenem gleichmäßigen und gemeſſenen Schritte, welcher den geübten Bergbeſteiger verräth, empor. Dieſer Greis war Marie Goutet, achtzig Jahre alt, welcher in ſeiner Jugend Sauſſure als Führer gedient hatte. Früher beſaß er eine Behendigkeit, welche ihm den Beinamen der Gemſe eingetragen hatte. Er verdiente ihn; Niemand war furchtloſer als er. Eines Tages begleitete er einen reiſenden Engländer auf ſchwierigem Pfade. Der Engländer bewahrte jene Miene von Phlegma und Gleichgültigkeit, welche den ächten Gentleman charakteriſirt. Der Anblick der gefährlichſten Uebergänge entriß ihm weder eine Geberde des Erſtaunens, noch eine Silbe, welche das geringſte Schwanken verrathen hätte. Durch dieſe unerſchütterliche Kaltblütigkeit gereizt, gewahrt Goutet eine Arve, welche wagerecht über einen Abgrund von 300 Meter Höhe hervorragt; kühn ſchreitet er auf dem Stamme hin und legt ſich, an der äußerſten Spitze angelangt, auf demſelben nieder, worauf er ſich mit den Füßen über dem Abgrunde aufhängt. Der Engländer betrachtete ihn ruhig, und als Goutet wieder zu ihm kam, gab er ihm ein Goldſtück mit der Bedingung, das Kunſtſtück nicht zum zweiten Male zu machen. So war in ſeiner Jugend der Mann beſchaffen, der uns auf unſerer Beſteigung voranſchritt. Er zuerſt hatte, um auf den Gipfel des Montblanc zu gelangen, vom Grand Plateau aus den Dôme du Gouté erſtiegen und war von dort aus über die Boſſe du Dromedaire und den ſchmalen Kamm,

Digitized by Google

welcher diese Spitze mit dem Gipfelpunkt verbindet, hinweggeklettert. Man hatte ihn von Chamouni aus gesehen; nichtsdestoweniger bestritten die Führer, daß dieser Weg passirbar sei. Im Jahre 1859 brachen zwei reisende Engländer, die Herren Hudson und Kennedy, von dem Führer Anderegg begleitet, von Chamouni auf und gelangten auf diesem Wege zum Gipfel, und im Jahre 1861 stiegen zwei andere Engländer, die Herren L. Stephen und F. F. Tuckett, von Saint-Gervais in neun und einer viertel Stunde auf die Aiguille du Goûté, übernachteten in der Hütte Saussure's und erreichten den Gipfel von diesem Punkte aus in Zeit von drei und einer halben Stunde. Doch lasse sich kein Tourist einfallen, diese Rastpunkte als einen Maßstab für die Zeit zu nehmen, welche er brauchen würde, um eben dieselbe Reise zu machen; sie können nur von jenen jungen und energischen Mitgliedern des Alpenklubs benutzt werden, deren würdigster Vertreter, was Kühnheit und Kenntniß anbelangt, eben Herr Tuckett ist. Coutet empfahl sich als Führer allen Reisenden, welche die Besteigung des Montblanc versuchten. Obgleich sein Anerbieten zurückgewiesen wurde, begleitete er sie doch als Volontair bis zu einer gewissen Höhe, um ihnen die Vortrefflichkeit des neuen von ihm entdeckten Weges zu beweisen. Da wir die Manie des Greises kannten, so hatten wir ihm sorgfältig den Tag unserer Abreise verhehlt; als er aber erfuhr, daß wir auf den Grands Mulets seien, hatte er sich noch denselben Abend auf den Weg gemacht, den Gletscher überschritten und langte gegen Mitternacht bei unserm Bivouak an, wo er am Feuer der Führer Platz nahm. Mit Tagesgrauen war er als der Erste aufgebrochen, um uns seinen Weg zu zeigen.

Gegen sechs Uhr befanden wir uns gleichfalls auf dem Marsche. Die Grands Mulets verlassend, setzt man den Fuß auf's Eis, um es nicht mehr zu verlassen. Der Zug bildete eine lange Reihe, welche zahlreiche Zickzacklinien beschrieb. Die Führer

Digitized by Google

löſten ſich nacheinander ab, um die Spitze einzunehmen und eine Furche im Schnee zu ziehen. So ſtiegen wir aufwärts, ohne zwei Stunden lang inne zu halten, dann machten wir Halt, um zu eſſen, bevor wir das kleine Plateau überſchritten. So nennt man eine ſchmale Ebene von 800 Meter Länge; gegen Südweſten wird ſie von den Abhängen des Dôme du Goûté beherrſcht; dieſelben beſtehen aus Protogin und ſehr geneigten Chloritſchiefern, an denen der Schnee nur in unvollkommener Weiſe haften bleibt. Die Böſchung wird überdies von einer ſenkrechten, in Gletſcherkäſe getheilten, oder mit Nadeln beſäeten Eismauer überragt. Auch wird das kleine Plateau gewöhnlich von den Lauinen gefegt. Bald iſt es eine Platte von verhärtetem Schnee, welche die Böſchung hinuntergleitet und in tauſend Stücke zerbricht, bald ſtürzt ein Serac, von weitem einem weißen Waſſerfall ähnelnd, ein und breitet ſich fächerförmig über die kleine Ebene aus, welche er ganz bedeckt. Es handelte ſich alſo darum, dieſe gefährliche Paſſage ſpornſtreichs zurückzulegen, die Eisblöcke aber, Trümmer einer alten Lauine, verzögerten unſern Marſch. Am Fuße des neuen Abhanges, welcher zum Grand Plateau hinaufführt, trafen wir Marie Coutet. Das Wetter war immer drohender geworden, die Windſtöße folgten ſich ohne Unterbrechung. Einige Graupelkörner fingen ſchon an uns in's Geſicht zu ſchlagen. Der alte Bergbewohner begriff, daß der Sturm heraunahte, und ohne ein Wort zu ſagen, machte er ſich eiligſt auf und ſtieg in unſern Spuren, die noch im Schnee eingedrückt waren, hinab, worauf er alsbald in den Wolken, welche die Abhänge der Berge belagerten, verſchwand.

Auf der Höhe des Abhanges angelangt, befanden wir uns am Rande einer jener tiefen Querſpalten, welche Deſor mit dem Namen „Bergſchrund" bezeichnet hat. Es war unmöglich, über dieſelben hinweg zu gelangen; wir ſtiegen alſo hinab und auf der andern Seite wieder hinauf. Einmal am

Digitized by Google

andern Rande, befanden wir uns auf dem großen Plateau. Es ist dies ein prächtiger Schnee- und Eiscirkus, dessen Hintergrund eine gegen Süden aufgerichtete Ebene ist. Doch erkannten wir kaum die Gestaltung der Oertlichkeit. Bevor wir uns zurechtfinden konnten, hatten uns die Wolken vollständig eingehüllt, und der Schnee wirbelte um unsere Köpfe. Zaudern durfte man nicht; entweder mußten wir sofort wieder heruntersteigen oder unser Zelt aufschlagen. Zwei Träger, Auguste Simond und Jean Cachat, erboten sich, mit den drei Führern bei uns zu bleiben. Die Andern warfen ihre Bürden auf den Schnee, stürzten eilig dem kleinen Plateau zu und verschwanden wie Schatten im Nebel, der immer dichter und dichter wurde. Allein geblieben, begannen wir den Schnee bis zu einer Tiefe von 30 Centimeter in einem rechtwinkligen Raume von 4 Metern Länge und 2 Metern Breite wegzuräumen, dann pflanzten wir, nach Anleitung eines zuvor aus Stricken hergestellten Rechteckes, dessen Schleifen jede einem der Zeltpflöcke entsprachen, im Schnee lange und starke hölzerne Bolzen auf, deren Kopf mit einem Haken versehen war. Nachdem dies geschehen, ward das Zelt auf der Querstange und den beiden Stützen, welche sie halten sollten, errichtet und die Ringe der Stricke um den Kopf der Bolzen gelegt. Nachdem das Zelt errichtet war, beeilten wir uns, erst unsere Instrumente, sodann die Lebensmittel darin zu bergen. Es war gut, daß wir uns gesputet hatten, denn mehre Flaschen Wein, welche draußen gelassen, waren nicht wieder zu finden, nach Verlauf einer Stunde hatte der Schnee, welcher fiel und der, welchen der Wind herzutrug, sie um die Wette zugedeckt. Unter dem Zelte hatten wir mit leichten Tannenbrettern, die auf den Schnee gelegt wurden, einen Fußboden improvisirt. Unsere Führer befanden sich am einen Ende und wir am andern. Der Raum war eng; man konnte sich nicht aufrecht halten, sondern mußte sitzen oder liegen. Die Küche befand sich in der Mitte. Unsere

Digitized by Google

erste Sorge war, den Schnee in einem durch die Flamme einer Weingeistlampe geheizten Gefäße schmelzen zu lassen, denn in diesen Höhen brennt die Kohle sehr schlecht. Bravais hatte die glückliche Idee, dieses Wasser auf die Zeltpflöcke zu gießen; das Wasser gefror, und statt in lockern Schnee eingerammt zu sein, saßen die Pflöcke jetzt in kompakten Eismassen fest. Ueberdies wurde ein Tau, welches an dem Bolzen, der die wagerechte Querstange mit einer der beiden senkrechten Stützen verband, geknüpft und wie ein Wandtau auf der Seite, wo der Wind herkam, befestigt war, an zwei in den Schnee eingerammten Stäben gehörig festgebunden. Nachdem diese Vorsichtsmaßregeln getroffen waren, mußten wir das Weitere abwarten. Jede Beobachtung war unmöglich, außer der des Barometers im Zelt und eines Thermometers draußen; dieses zeigte bei unserer Ankunft 2,7° unter Null und war um zwei Uhr auf — 4,0°, um fünf Uhr auf — 5°,8 gesunken. Indessen war die Nacht hereingebrochen; wir hatten eine Laterne angezündet, die, über unsern Köpfen aufgehängt, unser kleines Gemach erhellte. Die Führer, übereinander gelagert, plauderten mit leiser Stimme oder schliefen ruhig wie in ihrem Bette. Der Wind verdoppelte seine Heftigkeit, er blies in Stößen, welche von jenen Augenblicken tiefer Ruhe unterbrochen wurden, die Sauſſure so sehr in Erstaunen gesetzt hatten, als er sich auf dem Col du Géant in ganz ähnlichen Umständen befand. Der Sturm wirbelte in dem ungeheuren Schneeamphitheater, an dessen Rande unser kleines Zelt stand. Eine wahre Luftlawine schien sich der Wind von der Höhe des Montblanc auf uns herabzustürzen. Dann blähte sich die Leinwand des Zeltes wie ein von der Brise geschwelltes Segel, die Stützen bogen und schwangen wie Violinsaiten, und die wagrechte Querstange krümmte sich. Instinktmäßig unterstützten wir die Leinwand mit dem Rücken die ganze Zeit über, welche die Windstöße dauerten, denn unser Heil hing von der Festigkeit dieses

Digitized by Google

ſchützenden Obdaches ab; wenn wir ein paar Schritte draußen hinausthaten, ſo konnten wir uns eine Vorſtellung von dem machen, was aus uns geworden wäre, wenn es uns entriſſen wäre. Nie vorher hatte ich begriffen, wie Reiſende voll Kraft und Geſundheit einige Schritte von dem Orte, wo der Sturm ſie überraſcht, hatten umkommen können; an jenem Tage begriff ich es.

Unter dem Zelte war die Kälte erträglich. Das Thermometer ſchwankte zwiſchen 2 und 3 Graden unter Null. Unſere Kleider aus Ziegenfell und unſere Fußſäcke aus Schaffell ſchützten uns hinlänglich, obgleich die Haare des Pelzwerks durch das Eis an der Zeltleinwand kleben blieben. Während der Nacht ließ der Wind an Heftigkeit nach, unglücklicher Weiſe fuhr der Schnee fort zu fallen, die Temperatur ſank immer mehr, und um fünf und ein halb Uhr Morgens wies das Thermometer — 12°,1. Der friſche Schnee hatte 50 Centimeter Dicke, doch war die Leinwand des Zeltes nicht davon bedeckt, der Wind hatte ihn, ſobald er fiel, wieder weggefegt und fuhr fort, die Graupeln und den Schnee wagerecht vom großen Plateau zu vertreiben. Das Thermometer hielt ſich ebenſo niedrig wie den Tag vorher. In einem Blicke ſahen wir die Spitzen des Montblanc, der Monts Maudits und des Dromedaire, alle in einem weißen nach Nordoſt gerichteten Strahlenbüſchel endigend, es war der Schnee, welchen der Südweſtwind durch die Lüfte trieb.

Auf die Spitze zu ſteigen, wäre unmöglich geweſen, auf dem großen Plateau ſelbſt waren wir zum Stilliegen verurtheilt. Wir entſchloſſen uns alſo kurz; nachdem wir unſere Inſtrumente in dem Zelte bei Seite geräumt hatten, verſtopften wir den Eingang mit Schnee; es war ſieben Uhr Morgens, und das Thermometer zeigte noch 7 Grad unter Null. Da der jüngſt gefallene Schnee alle Ritzen und Spalten verdeckt

Digitized by Google

hatte, so befestigten wir uns an ein und demselben Stricke und stiegen schnell zu den Grands Mulets hinab. Nach einigen Augenblicken der Ruhe überschritten wir den Glacier des Bossons. Der schmale Fusssteig, welcher zu den Pierres Pointues führt, war, von dem frischen Schnee bedeckt, schlüpfrig und gefährlich geworden. Der Schnee war noch tiefer, bis zur Stelle der sogenannten Barmes-Dessous, nur 780 Meter über Chamouni, gefallen. Unsere Rückkehr beruhigte Jedermann, das Unwetter hatte im Thal so gut wie auf den Höhen gehaust und sich das Gerücht verbreitet, wir wären sämmtlich umgekommen. Diese Lärmbläser wußten nicht, daß wir das Lagerzelt mitgenommen hatten, welches uns während dieser schrecklichen Nacht vor Wind und Kälte geschützt hatte.

Wieder in Chamouni angekommen, machten wir Ausflüge im Thal, um die alten Moränen, mit denen es angefüllt ist, zu studiren; auch verschafften wir uns täglich vermittelst eines Fernglases die Gewißheit, daß das Zelt auf dem Grandplateau, welches unsere kostbaren Geräthe barg, noch stand. Den 6. August schien das Wetter sich wieder aufzuklären; das Barometer stand drei Millimeter höher, als vor der ersten Besteigung. Der Südwestwind herrschte noch immer auf den Höhen. Unser Vertrauen war nicht vollständig, doch fürchteten wir eine Reihe schöner Tage zu verfehlen. Wir brachen also den 7. August um sieben und ein halb Uhr Morgens wieder auf. Der Marsch auf dem Gletscher war schwieriger als bei der ersten Besteigung; bei jedem Schritte sank man in den frischen Schnee ein; der Führer, welcher die Spur bahnte, ermüdete bald, namentlich von den Grands Mulets ab. Um sechs und ein halb Uhr Abends langten wir auf dem großen Plateau an. Das Zelt stand, die Instrumente waren unversehrt, kaum aber hatten wir sie Revue passiren lassen, als der Schnee wieder wie das erste Mal zu fallen anfing; der Südwestwind

Digitized by Google

wurde stärker, der Donner rollte, und ein heftiger Gewittersturm brach über dem großen Plateau los. Wir konstruirten in der Eile einen Blitzableiter vermittelst einer mit Eisen beschlagenen Stange, an die wir eine Metallkette befestigten. Die Stange wurde mit der Spitze nach oben neben dem Zelte eingerammt und das Ende der Kette in den Schnee vergraben. Die Vorsicht war nicht unnütz; die Donnerschläge krachten fast zu gleicher Zeit mit dem Blitze. Aus den sehr kurzen Pausen, welche sie trennten, schlossen wir, daß der Blitz die benachbarten Höhenpunkte auf etwa einen Kilometer Entfernung treffen müsse. Zu unserer großen Verwunderung rollte der Donner nicht, es war ein Klappstoß wie beim Aufknallen einer Feuerwaffe. Diese Nacht verging wie die erste, die Windstöße waren vielleicht etwas weniger heftig, doch liefen wir Gefahr, vom Blitze erschlagen zu werden. Das Zelt, durch den Frost steif geworden, schloß schlecht, und ein feiner graupelartiger Schnee drang ins Innere. Das Thermometer sank auf — 6,3°. Der Tag erschien, aber das Unwetter hatte noch nicht aufgehört, der Schnee kam noch reichlicher, in einer Stunde fielen 33 Centimeter. Auf das Zelt beschränkt, beobachteten wir das Barometer und das Thermometer und stellten das Experiment des Wassersiedens an. Vergebens warteten wir darauf, daß das Wetter sich lege; unsere Leute schienen unruhig zu sein, und gegen 3 Uhr Nachmittags erklärte uns der Hauptführer Mugnier, daß der Schnee sich aufhäufe (es waren seit gestern 66 Centimeter gefallen), daß die Spuren von dreien unserer Träger, welche am Morgen wieder hinabgestiegen waren, nicht mehr zu sehen seien, und daß am folgenden Tage das Hinabsteigen vielleicht unmöglich wäre. Man mußte sich zum zweiten Male bescheiden. Die drei ersten Führer banden sich an ein Seil fest und tauchten in den Nebel, um denen, welche folgten, den Weg zu bahnen. Der Nebel war so dick, daß man zwanzig Schritte vor sich nichts zu er-

Digitized by Google

kennen vermochte, der Wind trieb uns einen feinen und eisigen Schnee, prickelnd wie Nadelspitzen, ins Gesicht. Es schien unmöglich zu sein, in diesem Nebel seinen Weg zu finden. Mugnier aber zauderte nicht. Wir stiegen weiter abwärts, bis wir plötzlich Felsen vor uns auftauchen sahen, die wir nicht kannten; durch den Nebel gesehen, schienen sie eine ungeheure Höhe zu besitzen. Wir hielten an, wähnend, uns verirrt zu haben; fast alsobald zerstreute sich der Nebel, und die Felsen nahmen ihre natürlichen Verhältnisse wieder an. Es waren die Grands Mulets, die trockene Steinmauer stand vor uns. Wir ruhten hier einige Augenblicke aus, und um neun Uhr Abends waren wir wieder in Chamouni.

Dieser zweite Fehlschlag entmuthigte uns keineswegs, man mußte Beharrlichkeit im Entschluß der Unbeständigkeit des Wetters entgegensetzen. Wir erachteten uns gleichsam gebunden, dem Publikum gegenüber, das durch indiscrete Aeußerungen von unsern Plänen in Kenntniß gesetzt war, dem Minister gegenüber, welcher sie begünstigt hatte. Die Besteigung des Montblanc bei zweifelhaftem Wetter zu wagen, in der Hoffnung auf ein paar schöne Tage, ist ein Wahn, welcher schon viele Reisende getäuscht hat. Derartiges Wetter gestattet Ausflüge ins Thal, aber um sich auf bedeutende Höhen zu erheben, sind schönes, beständiges, sicheres Wetter, eine ruhige und frische Luft, ein blauer, wolkenloser Himmel sowie Nordost- oder Nordwestwinde erforderlich. Das Barometer darf nicht unter 675 Millimeter zu Chamouni stehen, und der Hygrometer muß anzeigen, daß die Luft trocken ist. Dann kann man die Besteigung versuchen; wenn nicht, setzt man sich Täuschungen aus, wie die, welche wir erfuhren. Wir beschlossen zu warten, bis all' diese Bedingungen in Erfüllung gegangen wären, und entschieden uns dafür, den Umkreis des Montblanc zu durchstreifen. Ich wünschte mein Barometer un-

Digitized by Google

mittelbar mit dem des Hoſpiz des St. Bernhard und des Herrn Kanonikus Carrel zu Aoſta zu vergleichen. Auguſte Bravais wollte die horizontale Intenſität der Kräfte des Erdmagnetismus beobachten und die Anomalien feſtſtellen, welche Sauſſure um die Maſſe des Montblanc herum zu beobachten geglaubt hat. Unſer Unſtern verließ uns nicht, und während wir in Aoſta waren, gab es auf den Gebirgen in den Nächten vom 15. auf den 17. Auguſt reichlichen Schneefall. Am 19. waren wir wieder in Chamouni, das Wetter beſſerte ſich, und endlich am 25. ſetzte es ſich gänzlich auf ſchön; das Barometer ſtieg ſtetig, und der Nordweſt blies in den höheren Regionen der Atmoſphäre. Wir wußten, daß unſer Zelt auf dem großen Plateau noch ſtand, wir hatten es von der Höhe des Brevent bemerkt; doch ſchien es von der Südweſtſeite im Schnee vergraben, die entgegengeſetzte Seite aber vollſtändig entblößt zu ſein. Sicher, unſere Inſtrumente in gutem Zuſtande vorzufinden, brachen wir den 27. Auguſt um zwölf und ein halb Uhr Mitternachts zum dritten Male auf. Der Mond erhellte unſern Weg, um drei und ein halb Uhr langten wir bei den Pierres Pointues an. Der Himmel war von einer bewunderungswürdigen Reinheit, ein paar einzelne Nebelwolken ruhten auf dem Col de Balme und auf den Monts Vergy. Ein friſcher Bergwind ſowie das ſchwache Funkeln der Geſtirne verſprachen uns ſchönes Wetter. Caſtor und Pollux glänzten mit ruhigem Licht über den Aiguilles de Charmoz. Um vier und ein halb Uhr erreichten wir die Pierre de l'Echelle, nachdem wir taſtend zwiſchen den erratiſchen Blöcken der Moräne des Glacier des Boſſons weggekrochen waren. Der Tag begann anzubrechen, die gelbe Tinte, welche der Sonne vorangeht, erſchien im Morgen, ein leichter Dunſt erfüllte das Thal von Chamouni. Alsbald wurde die gelbe Tinte roſig oder violett, mit ſchwachem Widerſchein die von den Schatten der Nacht noch dunkeln Schnee-

Digitized by Google

flächen belebend. Um fünf Uhr betraten wir den Glacier des Boſſons. Er war mit Eisblöcken bedeckt, welche von der Aiguille du Midi herabgefallen waren. Die Seracs, welche wir ſo ſehr bewundert hatten, waren eingeſtürzt und hatten die bei der erſten Beſteigung zurückgelaſſene Leiter zertrümmert. Um auf die Grands Mulets zu gelangen, überſchritten wir eine ſchmale Schneebrücke und frühſtückten daſelbſt mit einem durch eine Steigung von 2000 Meter geſchärften Appetit. Um zehn und ein viertel Uhr hatten wir das kleine Plateau erreicht, wir überſchritten es raſch; den Abhang erklimmend, welcher zum großen Plateau führt, ſahen wir voll Freude die langen Linien des Jura mit jenen rundlichen Wölkchen, cumulus genannt, bedeckt, welche ſchönes Wetter verkündeten. 150 Meter unter dem Grand Plateau zeigte ſich uns der Genfer See im Nordweſten über dem Col d'Anterne. Es war elf Uhr im Augenblicke, wo diejenigen, welche voranmarſchirten, beim Anlangen auf dem großen Plateau das Zelt bemerkten. Es ſtand, nur erhob ſich der Schnee um daſſelbe herum bis zu 1,20 M. Höhe. Im Nordoſten laſtete er auf der Leinwand, im Südweſten war der Schneewall noch höher, aber von dem Zelte durch einen Zwiſchenraum getrennt. Uebrigens war nichts zerbrochen noch zerriſſen. Als man den Schnee weggeräumt hatte, nahm das Zelt ſeine urſprüngliche Form wieder an. Das große Plateau erſchien uns zum erſten Male in ſeiner ganzen Erhabenheit. Es iſt ein ungeheurer nach Norden geöffneter und von einem Amphitheater von Bergen beherrſchter Cirkus. Dieſelben ſind, von Oſten beginnend, die Monts Maudits, die Aiguille de Sauſſure*), die obern und untern Rochers Rouges,

*) So haben wir das namenloſe, der Montblancſpitze zunächſt liegende Horn genannt; es trägt die Nr. 55 auf der Zeichnung der vom Brevent aus geſehenen Montblanckette, welche das Itinéraire en Suisse von Herrn Adolphe Joanne giebt.

Digitized by Google

die Montblancspitze, die Bosse du Dromedaire und der Dôme du Gouté. Selten ist der nackte Fels sichtbar, mächtige Eisbekleidungen hüllen ihn fast beständig ein, und das Eis war wieder mit mehren Schichten jüngstgefallenen Schnees bedeckt. Der Boden des Grand Plateau selbst ist ein von langen und breiten Bergschründen durchschnittener Gletscher, wo das Auge die Dicke des Eises in dem Cirkus messen kann, dessen mächtige Abflüsse die Glaciers des Bossons und de Taconnay sind. Der jüngstgefallene Schnee war fein, staubartig und von bewunderungswürdiger Weiße, in den Schründen aber beobachtete man alle zwischen dem Mattweiß und dem Tiefblau liegenden Tinten. Nachdem wir dieses großartige Schauspiel bewundert und mit Entzücken die tiefe Azurbläue des Himmels über unsern Häuptern betrachtet hatten, während eine schwache Nordwestbrise unsere Wangen koste und die Hoffnungen bestätigte, welche der Anblick des Horizonts uns eingeflößt hatte, halfen wir unsern Führern beim Säubern des Zeltes. Diese Arbeit war mühsam; kaum hatte jeder von ihnen ein paar Schaufeln voll Schnee weggeräumt, als er innehielt, um Athem zu schöpfen, ein geheimes Unwohlsein gab sich in allen Mienen zu erkennen, der Appetit war null. Auguste Simond, der größte, stärkste und kräftigste unter den Führern, sank auf den Schnee nieder und wäre fast in Ohnmacht gefallen, während Doktor Lepileur ihm den Puls befühlte;*) es waren die Wirkungen der Luftverdünnung nebst der Ermüdung und Schläfrigkeit, womit Jeder von uns mehr oder weniger befallen war. Wir befanden uns damals nahe an 4000 Meter über dem Meere, und schon bei 3000 Meter giebt es nur wenig Menschen, die sich nicht unpaß fühlen. Es wundert mich

*) Siehe die Arbeit dieses Arztes über die physiologischen Erscheinungen, welche man beim Ersteigen der Alpen wahrnimmt. (Revue médicale 1845.)

Digitized by Google

nicht, daß wir bei dieser Besteigung die Wirkungen der Luftverdünnung spürten, welche bei den beiden erstern wenig hervorgetreten waren. Noch nie hatten wir uns so schnell von Chamouni auf das große Plateau erhoben; von 1040 Meter über dem Meere ausgehend, befanden wir uns nach zehn und einer halben Stunde Gehens in einer Höhe von 3930 Metern. Das macht einen Niveauunterschied von 2890 Meter, in weniger als einem Tagemarsche zurückgelegt. Alle Unbehaglichkeit verschwand, als wir uns zu rühren aufhörten. Das einzige wirkliche und anhaltende Leiden war der Frost an den Füßen. Bei jedem Schritt sanken wir bis an die Waden in den Schnee ein, und die Temperatur dieses Schnees betrug 10 Grad unter Null bei 2 Dezimeter Tiefe.

Nachdem wir unsere meteorologischen Instrumente aufgestellt, einen Psychrometer, zur Schätzung der Feuchtigkeit der Luft, Barometer und Thermometer im Freien aufgehängt oder in verschiedenen Tiefen in den Schnee eingesetzt, warfen wir einen Blick auf das Panorama, welches sich im Norden unseres Standpunktes ausdehnte. Unten bemerkten wir deutlich das Thal von Chamouni, die Arve zwischen den Wiesen sich hinschlängelnd, sowie die Häuser, unter denen wir das Hotel de l'Angleterre unterscheiden konnten, wo Herr Camille Bravais Beobachtungen anstellte, welche mit den unserigen correspondirten, wie dies früher Theodore de Saussure gethan hatte, während sein Vater sich auf dem Montblanc befand. In der Ferne entrollte sich vor uns ein prachtvolles Panorama, und schon diese Aussicht allein würde für die Beschwerden des Besteigens diejenigen entschädigen, welche keine Lust hätten, sich bis zum Gipfel zu erheben. Im Nordosten erkennt man die Gebirge, welche die Stadt Sitten beherrschen, dann die Dent de Morcles, das imposante Massiv der Dent du Midi, die Diablerets, die Tour-Saillière, den Buet, darunter und näher

Digitized by Google

heran die Kette der Aiguilles Rouges, den Brevent, die Rochers des Fiz, ähnlich zwei im rechten Winkel auf einander ſtoßenden Mauern, die Aiguilles de Varens, die Kette der Monts Vergy, von der die Aiguille du Repoſoir aufſteigt, weiterhin die Pyramide des Môle, den weſtlichen Theil des Genfer Sees in zwei Hälften theilend, jenſeits die parallelen Ketten des Jura, leichten Terrainvorſprüngen ähnlich, endlich in unbeſtimmter Ferne die Vogeſen und die Ebenen Frankreichs, mit dem Horizont ſich vermiſchend.

Wir verbrachten unter unſerm Zelt eine prächtige Nacht. Der Donner der Lauinen, welche um uns her auf das große oder das kleine Plateau niederfielen, und die Verpflichtung, unſere meteorologiſchen Beobachtungen von zwei zu zwei Stunden fortzuſetzen, unterbrachen allein unſern Schlummer. Um Mitternacht zeigte das Thermometer im Freien — 9,6°, und dasjenige, welches auf die Oberfläche des Schnees gelegt war, — 19,9°. Indeß hatten wir es unter dem Zelt, Dank unſern Kleidern aus Ziegenfell, unſern Fußſäcken aus Schaffell und den dünnen Brettern, welche uns vom Eiſe ſchieden, nicht kalt. Am folgenden Morgen wollten wir frühzeitig zur Montblancſpitze aufbrechen. Die Führer aber widerſetzten ſich dem, ſie fürchteten Unfälle vom Erfrieren der Füße und wollten warten, bis der Schnee ſich ein wenig erwärmt hätte. Um zehn Uhr verließen wir das Zelt mit Jean Mugnier, Michel Coutet, Auguſte Simond, Jean Cachat, Fraſſerand und Ambroiſe Coutet, indem wir uns dem Hintergrunde des Cirkus zuwandten. Am Fuß der Abhänge angekommen, ſetzten wir auf die Trümmer einer Lauine über, welche am Tage zuvor von dem obern Rocher Rouge herabgeſtürzt war, ſtatt uns aber durch den Corridor dieſem Felſen zuzuwenden, ſchlugen wir den Weg von Sauſſure ein, der ſeit dem Unfalle am 17. Auguſt 1820 bei einem vom Doctor Hamel und Oberſt Anderſon gemachten Verſuche, die

Digitized by Google

Montblancſpitze zu erſteigen, verlaſſen worden war. Wie wir, marſchirten ſie in dem friſchgefallenen Schnee und fingen an den la Côte genannten Abhang, den wir ebenfalls erklommen, hinanzuklettern. Dieſer Abhang iſt ſehr ſchroff, denn an einigen Punkten mißt er 43 Grad. Man kann nur emporſteigen, indem man Zickzacklinien beſchreibt. Die Tritte der engliſchen Reiſenden, welche ſich in einer Reihe folgten, ſchnitten ein Dreieck oberflächlichen Schnees ab, welches ſich loslöſte und auf der darunter liegenden Schicht zu rutſchen begann. Die Führer Pierre Balmat, Auguſte Tairraz und Pierre Carrier wurden langſam, aber unwiderſtehlich nach einer Spalte zugeriſſen, die ſie vor den Augen ihrer ſchreckengelähmten Gefährten verſchlang. Der Schnee, welcher mit ihnen herabſtürzte, rollte waſſerfallartig in die Spalte und begrub ſie lebendig im Gletſcher. Jede Hülfe war umſonſt, die Ueberlebenden ſtiegen verzweiflungsvoll wieder nach Chamouni hinunter. Mehre Gebeine, Kleiderfetzen, eine zerbrochene Laterne, ein Filzhut, welcher einem der drei Opfer gehörte, ſind am 15. Auguſt 1861 auf der Oberfläche des untern Theiles des Glacier des Boſſons gefunden worden; dieſe Ueberreſte hatten 41 Jahre gebraucht, um vom großen Plateau ins Chamounithal hinunter zu gelangen. Der Letztüberlebende dieſes ſchrecklichen Unfalles erkannte die Gegenſtände wieder, welche Pierre Balmat, einem der drei Opfer angehört hatten.

Wir trafen Vorſichtsmaßregeln, wie ſie die Klugheit gebietet. Ohne an ein und daſſelbe Tau gebunden zu ſein, folgten wir uns ganz dicht und trugen Sorge, daß die durch unſere Zickzacklinien gebildeten Winkel eine Oeffnung von wenigſtens 15 Grad hatten. Wir ſanken bis an die Waden in Schnee, deſſen Temperatur in einem Dezimeter Tiefe ſtets — 11,0° betrug. Die Verdünnung der Luft und die Dicke des Schnees, aus dem wir alle Augenblicke genöthigt waren unſere Beine herauszuziehen,

Digitized by Google

zwangen uns langsam zu marschiren; alle zwanzig Schritte hielten wir athemlos an; unsere Füße schmerzten vor Frost und waren dem Erfrieren nahe. Während unseres kurzen Haltes schlugen wir sie mit unsern Stöcken, um sie zu erwärmen. Dieser Theil der Besteigung war sehr ermüdend, doch begünstigten herrlicher Sonnenschein und ruhige Luft unsere Anstrengungen. An dem paßförmigen Abhange angelangt, der die Rochers Rouges von den Petits Mulets trennt, gewahrten wir plötzlich die im Süden des Montblanc liegenden Berge und jenseits die Ebenen Italiens. Nichts schützte uns mehr; der vorher unmerkliche Nordwestwind riß Mugnier plötzlich den Hut weg, und obgleich warm angezogen, glaubte ich mich doch plötzlich entkleidet, so kalt und durchdringend war dieser Wind. Uns schräg zur Rechten wendend, gelangten wir alsbald auf die Petits Mulets, Protoginfelsen, welche nur 130 Meter unter dem Gipfel liegen. Wir näherten uns dem Ziele, doch schritten wir langsam, mit gesenktem Haupt und keuchender Brust, einem Krankentransport ähnlich, vorwärts. Die Luftverdünnung befiel unsere Organe schmerzhaft; jeden Augenblick machte die Kolonne Halt. Bravais wollte wissen, wie lange er marschiren könnte, wenn er so rasch als möglich stiege; beim zweiunddreißigsten Schritte mußte er einhalten, ohne weiter zu können. Endlich, um ein und drei viertel Uhr erreichten wir den so lange ersehnten Gipfel. Er hatte die Form eines von Ostnordost nach Südsüdwest gerichteten Grates; aber dieser Grat war nicht scharf, wie ihn Sauſſure gefunden hatte, sondern 5 bis 6 Meter breit. Auf der Nordseite lief er in eine ungeheure Schneefläche von 40 bis 45 Grad Neigung aus, die auf dem Grand Plateau endet, auf der Südseite setzte er sich mit einer kleinen, mit dem Grate parallel laufenden, an zehn Grad geneigten und etwa 100 Meter breiten Fläche fort. Diese Fläche verlängerte sich nach Süden, wo sie sich mit einem jähen

Digitized by Google

Abhange verband, der plötzlich an den großen Felsmauern, welche die Allée Blanche beherrschen, endete. Im Osten tritt der Grat mit einem zweiten Gipfel, der Montblanc de Courmayeur genannt, und 50 bis 60 Meter weniger hoch als die Spitze, in Verbindung. In der Mitte dieses Grates befindet sich die Tourette, nur 80 Meter unter dem Hauptgipfel liegend und unstreitig der höchste Felsen Europas. Im Westen verbindet sich die Spitze durch einen dünnen Schneekamm mit der Bosse du Dromedaire.

Wissenschaftliche Resultate.

Nachdem wir Athem geschöpft hatten, galt unser erster Blick dem ungeheuren Panorama, das uns umringte; ich werde es nach Sanssure nicht beschreiben. Der Leser nehme eine Karte von Europa und einen Zirkel zur Hand, setze die eine Spitze desselben auf den Montblancgipfel, die andere auf die Stadt Dijon und ziehe einen Kreis, dessen Mittelpunkt der Montblanc ist. Dieser Kreis, dessen Durchmesser 420 Kilometer beträgt, wird den Theil der Erdoberfläche umfassen, den das Auge von der Höhe des Montblanc umspannen kann, doch ist nicht Alles deutlich, und über 100 Kilometer hinaus sind die Gegenstände, durch die Schwülhitze verschleiert, verschwommen und verloschen. Bis auf 60 Kilometer ist Alles deutlich und erkennbar. Die nähern Punkte fielen mir zuerst auf. Unter uns schien Chamouni in die Tiefe eines Brunnens versenkt. Der Jardin des Mer de Glace, der Col du Géant, die prachtvolle Aiguille du Midi lagen zu unsern Füßen. Es schien, als hätte man einen Stein auf den Col de la Seigne werfen können. Der Cramont, die Glaciers de Ruitor thürmten sich wie Nebenbuhler des Montblanc auf, und darüber hinaus zeigten sich eine hinter der andern kahle Zacken ohne Ordnung, ohne Richtung, den

Digitized by Google

Bäumen eines ungepflanzten Waldes vergleichbar; das war das ungeheure Massiv der piemontesischen und französischen, zwischen Aosta und Briançon liegenden Alpen. Der Theodolit ward auf dem Gipfel aufgestellt, und Bravais begab sich daran, die Winkel aufzunehmen, welche die hervorragendsten Berge unter sich bilden; man nennt dies einen Horizontkreis oder ein geodätisches Panorama.*) Man begreift, von welcher Bedeutung es für die mathematische Geographie ist, den Winkel messen zu können, welchen zwei von der Höhe eines dritten gesehene Gipfel unter sich bilden. Vermittelst dieser Winkel konstruirt man ein trigonometrisches Netz, die Basis jeder guten geographischen Karte. Ein hochragender Gipfel, wie der des Montblanc, gestattet unmittelbar den Winkelabstand von zwei gleichzeitig von jedem andern Punkte der Erdoberfläche nicht sichtbaren Berge zu schätzen. Wenn der Monte Rosa nicht unglücklicher Weise von Wolken versteckt gewesen wäre, so würde Bravais z. B. den Winkelabstand dieses Berges vom Mont Pelvoux erhalten haben, wie er den des Pic de Belledonne bei Grenoble, von der Roche-Melon bei Turin und des Becco di Nouna, welcher die Stadt Aosta beherrscht, vom Pelvoux bei Briançon maß. Ja mehr, der Depressionswinkel dieser Gipfel unter der horizontalen den Gipfel des Montblanc berührenden Linie, verbunden mit dem Abstand und der Krümmung der Erde, gestattete ihm später in seinem Kabinet, die bezügliche Höhe dieser Gipfel zu berechnen. So beträgt der Winkelbestand des Mont Tabor über Modane und des Grand-Som, des höchsten Punktes der großen Chartreuse bei Grenoble, 41°,46′. Der Depressionswinkel des Tabor beträgt 1°,27′, eine Zahl, die diesem Berge eine Höhe von 3180 Meter anweist. Für den Grand-Som beträgt derselbe Depres-

*) Siehe A. Bravais, le Mont-Blanc ou description de la vue et des phénomènes qu'on peut apercevoir sur son sommet. In-12°.

Digitized by Google

sionswinkel 2°,21', was in Ansehung des Abstandes auf eine Höhe von nur 2033 Meter zu schließen erlaubt.

Gleich Saussure wurden wir von der Regellosigkeit der Berge, welche sich im Süden des Montblanc erheben, überrascht, der Ausdruck Kette ist auf sie nicht anwendbar, der von Gruppen aber paßt vollkommen auf sie; man erkennt sehr gut die der Oisans oder des Pelvour, der Rousses, der zwischen dem Drac und der Arve liegenden Westalpen, der Aiguilles Rouges über Chamouni und endlich des Wallis. Alle diese Massive gehören den krystallinischen Gesteinen Granit, Protogin, Gneiß oder den alten Gesteinen, den metamorphischen, kohlenhaltigen Schiefern u. s. w., an. Dreht man sich nach Norden, so ist der Anblick ein ganz verschiedener; man verfolgt die Ketten, welche sich parallel mit dem Genfersee verlängern, die des Jura, welche in Westen mit den Profilen der großen Chartreuse enden, und deren Horizontalität gegen die spitzen und zerrissenen Gipfel der französischen Alpen absticht. Bevor der Jura in das Becken des Genfer Sees eintritt, doppelt er sich zu parallelen Kettengliedern ab, welche den Neuenburger See entlang ziehen und am Fuße des Schwarzwaldgebirges auslaufen. In Savoyen, südlich vom Genfer See, zählten wir fünf Kettenglieder, deren letztes die Montagne des Voirons umfaßt. Wenn man einen Blick auf die schöne geologische Karte von Obersavoyen wirft, welche Herr Alphonse Favre im Jahre 1862 herausgegeben hat, so erkennt man, daß diese Ketten den jurassischen, Kreide- und Tertiärgebirgen angehören. Wir bemerkten noch die Ketten der Diablerets und des Simmenthals, welche, wie die des Chablais, den Flötzgebirgen angehören, sie sind gleichfalls parallel unter sich, laufen aber nach Osten.

Wir konnten nicht unsere ganze Zeit dem Panorama widmen, es mußten die physikalischen Experimente, welche sieben-

Digitized by Google

undfünfzig Jahre zuvor von Sauſſure angeſtellt waren, namentlich die des Waſſerſiedens, wiederholt werden. Wie er, hatten wir Mühe, das aus dem geſchmolzenen Schnee ſich ergebende Waſſer zum Sieden zu bringen; die Temperatur der Luft, welche 8 Grad unter Null betrug, ſowie die Briſe, welche unſer Blechgefäß abkühlte, verhinderten die Flüſſigkeit, zur Kochtemperatur zu gelangen. Bravais faßte einen heroiſchen Entſchluß: den Alkohol auf die angezündete Lampe gießend, rief er eine vorübergehende, aber hinlänglich ſtarke Flamme hervor, um das Waſſer zum Sieden zu bringen. Das Thermometer zeigte 84,40°. Die Queckſilberſäule des Barometers, der Maßſtab für den atmoſphäriſchen Druck, hatte im ſelben Augenblick eine Länge von 423,74 Mm.

Der Phyſiker, welcher in ſeinem Kabinet die Geſetze ſtudirt, welche die Naturkräfte leiten, ſtellt mit komplizirten Apparaten die erforderlichen Bedingungen her, um dieſe Geſetze hervortreten zu laſſen; doch kann man ſie als endgültig für die Wiſſenſchaft erworben erſt von dem Tage an betrachten, wo ihre Genauigkeit auf experimentalem Wege außerhalb der nothwendig künſtlichen Bedingungen des Laboratoriums feſtgeſtellt iſt. Hierher gehört die Spannung der Dämpfe; man hat ſie ſtudirt, indem man den Druck, unter welchem ſie ſich erzeugt, abwechſeln ließ; auch waren wir bei unſerer Rückkehr nach Paris ſo glücklich, zu conſtatiren, daß der von uns auf der Montblancſpitze beobachtete Siedegrad nur um ein Zwanzigſtel eines hunderttheiligen Grades von dem von Herrn Regnault mit den ſchönen Apparaten des Collège de France feſtgeſtellten abwich. Für das große Plateau betrug die Abweichung auf den Grands Mulets ein Hundertſtel und in Chamouni ein Fünfundzwanzigſtel. So geringe Unterſchiede beweiſen eine vollſtändige Uebereinſtimmung und zeigen, daß die Tabellen der Dampfſpannungen von Herrn Regnault der genaue

Digitized by Google

Ausdruck des Verhältniſſes ſind, welches die Temperatur mit dem Druck verbindet. Im ſelben Jahre erhielt Herr Jzarn in den Pyrenäen in der Umgegend der Eaux-Bonnes bei geringen Höhen Reſultate, die wie die unſrigen durchſchnittlich nur um ein Fünfundzwanzigſtel eines Grades von den auf dem Collège de France beobachteten Temperaturen abweichen.

Ein Sonnenſtrahl, der auf einen Hochgipfel fällt, muß wärmer ſein als derjenige, welcher die niedrigſten und folglich dichteſten Schichten der Atmoſphäre durchſchneidend bis zur Ebene hinabdringt, da dieſe untern Schichten nothwendig eine beträchtliche Menge von der Wärme dieſes Strahles abſorbiren. Was das Nachdenken vorausſehen ließ, die einfache Beobachtung beſtätigt es bereits. Alle Reiſenden, welche ſich auf die Hochgebirge erheben, ſind überraſcht von der außerordentlichen Wärme der Sonne und des Bodens, verglichen mit der niedrigen Temperatur der Luft im Schatten. Auf den Petits Mulets bei 4680 Meter Höhe war der Schnee bei der Berührung mit den Felſen geſchmolzen und hatte ſich in feſtes und glattes Eis verwandelt. Jch konnte bei meinen Experimenten auf dem Gipfel des Montblanc die von Herſchel und Pouillet erfundenen phyſikaliſchen Jnſtrumente nicht verwenden; ich hatte ſie auf dem Grand Plateau gelaſſen; doch bewies mir ein ſehr einfacher Verſuch, wie ſehr die Eigenwärme der Sonnenſtrahlen der der Luft überlegen iſt. Jch hatte eine mit Kiesſand gefüllte Büchſe von Fontainebleau mitgenommen; ein auf dieſen Sand gelegtes und leicht damit bedecktes Thermometer ſtieg in der Sonne auf 5 Grad über Null, während das im Freien aufgehängte 8 darunter zeigte, alſo ein Unterſchied von 13 Grad zwiſchen der Erwärmung des Sandes und der der Luft.*) Die auf dem Grand Plateau und zu Chamouni mit dem Linſen-Pyrheliometer

*) Siehe Band I. Seite 41.

Digitized by Google

von Herrn Pouillet angeſtellten korreſpondirenden Experimente zeigten, daß die Wärme der Sonnenſtrahlen um 0,13° bis 0,31° ſtärker war bei 3930 als bei 1040 Meter über dem Meere, obgleich zu Chamouni die Temperatur der Luft im Schatten um 19,1° größer war als auf dem großen Plateau.

Bravais maß die horizontale Intenſität des Erdmagnetismus mit derſelben Nadel, welche er zu Paris, Orleans, Dijon, Lyon, Beſançon, Bern, Baſel, Solothurn, Thun, Brienz, auf dem Faulhorn und auf zehn um den Montblanc herumliegenden Punkten hatte oszilliren laſſen; nachdem er dieſe Meſſungen aber den genaueſten und ſorgfältigſten Berechnungen unterworfen, gab ſich der Einfluß der Höhe auf die Intenſität des Erdmagnetismus nicht in deutlicher Weiſe kund. Kein Geſetz ergab ſich aus den erlangten Ziffern, man kann nur behaupten, daß die Abnahme der horizontalen Kraft des Magnetismus geringer iſt, als der Bruch von $^1/_{1000}$ auf ein Kilometer vertikaler Höhe. Dieſelbe Mißhelligkeit beſteht bei den von einem ſchottiſchen Gelehrten, J. D. Forbes, abgeleiteten Reſultaten einer langen Reihe in den Alpen und in den Pyrenäen angeſtellter Beobachtungen. Was ſoll man aus dieſen Ungewißheiten ſchließen? Nichts, außer daß man die Mittel, die magnetiſchen Kräfte zu unterſuchen, vervollkommnen muß. Sobald dieſe Bedingung erfüllt iſt, wird das Geſetz ſich kundgeben; ſo belehrt die Wiſſenſchaft ſelbſt uns über die Natur der noch auszufüllenden Lücken und zeigt uns die Art von Vervollkommnung an, welche ſie erfordern.

Während der fünf Stunden, welche wir auf dem Gipfel des Montblanc zubrachten, beobachteten wir viermal die Höhe des Barometers. Die mittlere Höhe, auf die Temperatur des ſchmelzenden Eiſes zurückgeführt, betrug 424,2 Mm. Die Temperatur des Queckſilbers war unter Null, ja um ſechs Uhr war ſie ſogar auf — 11,0° gefallen, während die der Luft — 11,8° betrug.

Digitized by Google

Das Pſychrometer, ein Inſtrument, welches dazu beſtimmt iſt, den Grad der Feuchtigkeit der Luft zu meſſen, belehrte uns, daß ſie trocken ſei, denn ſie enthielt nur $^{57}/_{100}$ jener Waſſerdampfmenge, welche erforderlich geweſen ſein würde, um ſie bei dieſer niedrigen Temperatur zu ſättigen und in Nebel den unſichtbaren wäſſerigen Dunſt zu verwandeln, welcher ſtets in gewiſſem Verhältniß in der Atmoſphäre vorhanden iſt.

Unſere barometriſchen und thermometriſchen Beobachtungen ſollten dazu dienen, die Sauſſure's ſowie die geodätiſchen Meſſungen des Montblanc, welche früher von Schuckburgh im Jahre 1776, von Pictet und Tralles, Carlini und Planta im Jahre 1822, von Oberſt Coraboeuf und Kommandant Delcros im Jahre 1823, endlich von Herrn Roger von Nyon im Jahre 1828 angeſtellt waren, zu kontroliren. Verſuchen wir es, die Bedeutung dieſer Unterſuchungen klar zu machen. Um die Höhe eines Berges zu meſſen, hat der Beobachter die Wahl zwiſchen zwei Methoden, der geometriſchen und der barometriſchen. Erſtere, auf ihre Grundlagen zurückgeführt, beſteht darin, eine Baſis, d. h. eine gerade Linie von angemeſſener Länge auf einem möglichſt horizontalen Terrain zu meſſen. Nachdem dieſe Baſis gemeſſen iſt, ſtellt ſich der Geometer abwechſelnd auf die beiden Endpunkte derſelben mit einem Theodolit genannten Inſtrument, welches geeignet iſt, in Graden, Minuten und Sekunden den Werth der Winkel zu beſtimmen, welche der Berggipfel mit der gemeſſenen Baſis bildet. Hundert und aber hundert Mal dieſe Operation vornehmend, erhält er ein Dreieck, deſſen Baſis und anſtoßende Winkel bekannt ſind; das Dreieck iſt alſo ſelbſt auch bekannt und folglich die Höhe des Berges. Eine andere Methode beſteht darin, ſich auf einen Berg von ſtreng beſtimmter Höhe zu ſtellen und mit großer Genauigkeit den Unterſchied der Winkelhöhe zwiſchen dieſem Standpunkte und dem Berge zu erhalten, deſſen Höhe man kennen lernen will.

Digitized by Google

Dies ist die von Bravais auf dem Montblancgipfel angewandte Methode, um gleichzeitig die Höhe der von dieser Warte herab sichtbaren Hauptgipfel zu messen. Anscheinend sind diese beiden Methoden haarscharf, wie die Wissenschaft selbst, der sie entlehnt sind. Diese Schärfe ist aber nur scheinbar. Die Linie, welche vom Auge des Beobachters durch das Fernrohr des Theodoliten geht und auf dem Gipfel, dessen Höhe man schätzen will, ausläuft, ist keineswegs eine gerade, sondern eine krumme Linie, eine Fluglinie. Die Krümmung dieser Fluglinie wechselt je nach der Entfernung, der Temperatur, der Feuchtigkeit und der Durchsichtigkeit der Luft nicht nur alle Tage, sondern zu allen Stunden des Tages. Die scheinbare Lage des Gipfels, den man visirt, ändert sich mit jedem Augenblick; je nach der Beschaffenheit der Atmosphäre scheint dieser Gipfel sich zu erheben, zu erniedrigen oder seitwärts zu verrücken. Ohne Geometer zu sein, kann sich Jedermann hiervon leicht überzeugen.

Man richte auf einen fernen Gipfel ein Fernrohr, dessen Objektiv mit zwei in der Mitte der Linse sich im rechten Winkel schneidenden Spinnenfäden versehen sei, der Art, daß die Spitze des Gipfels genau mit dem Kreuzungspunkte der Fäden zusammenfällt; befestigt man das Instrument nun in dieser Lage und legt nach einer oder zwei Stunden das Auge wieder an das Fernrohr, so wird man bemerken, daß die Spitze des beobachteten Gipfels nicht mehr mit dem Schneidepunkte der Fäden zusammenfällt, sondern verrückt sein wird. Dieser Eigenschaft unserer Atmosphäre, unaufhörlich die Krümmung des Sehstrahls, welcher, von unserm Auge ausgehend, auf fernen Gegenständen mündet, zu verändern, belegt man mit dem Ausdrucke terrestrische Strahlenbrechung. Um eine Ausgleichung zwischen diesen Fehlern herzustellen, wiederholt der Geometer hunderte von Malen seine Winkelmessungen. Die größten Mathematiker haben sich bemüht, in die Formeln, welche dazu dienen, die

Höhe der geodätiſch gemeſſenen Gebirge zu berechnen, Verbeſſerungen einzuführen, welche geeignet ſind, die von der terreſtriſchen Strahlenbrechung herrührenden Fehler auszumerzen; da dieſe Strahlenbrechung aber je nach dem Zuſtande der Atmoſphäre abweicht, und dieſer Zuſtand gewöhnlich nur auf dem untern Standpunkte bekannt iſt, ſo weiß man nicht, welches im Augenblicke, wo man die Spitze viſirt, die atmoſphäriſchen Bedingungen der dazwiſchen liegenden Luft und derjenigen ſind, von der ſie umgeben iſt. Man iſt alſo auf mehr oder minder wahrſcheinliche Hypotheſen angewieſen, daher die Ungenauigkeiten, welche den geodätiſchen Methoden den Vorrang benehmen, welchen ſie von dem ſtrengen Verfahren, deſſen ſie ſich bedienen, entlehnen. Dieſer Vorrang hat ſich lange Zeit geltend gemacht, und die Meſſungen von Gebirgshöhen mit dem Barometer ſind als nothwendig ungenau betrachtet worden, während die geodätiſchen Methoden für unfehlbar galten. Sie ſind es in der That, wenn wiederholte Meſſungen, nach verſchiedenen Methoden angeſtellt, unter ſich übereinſtimmen. So ergeben die geodätiſchen Meſſungen des Montblanc durchſchnittlich für die Höhe deſſelben über dem Meeresſpiegel 4809,6 M., eine Höhe, welche man als völlig genau betrachten kann; eine einzige Meſſung aber, mag man noch ſo viel Sorgfalt darauf verwandt haben, beſitzt keinen Grad von Sicherheit mehr, als die des Barometers.

Man begreift das Intereſſe, welches wir an unſere vier barometriſchen Beobachtungen knüpften, wir wollten ein Element mehr, dem höchſten Gipfel Europas entnommen, jenem großen Kampfe zwiſchen dem Barometer und dem Theodolit zuführen. Man kann aber die Höhe eines Berges, mit dem Barometer gemeſſen, nicht anders berechnen, als vermittelſt korreſpondirender barometriſcher Beobachtungen, d. h. ſolcher, welche zur ſelben Stunde auf einer nicht weit entfernten Sta-

Digitized by Google

tion angestellt wurden; überdies muß die Höhe dieser verschiedenen Stationen über dem Meere vollkommen bekannt sein. In dieser Beziehung liegt der Montblanc sehr glücklich. Wir hatten die korrespondirenden Stationen Chamouni, wo sich Herr Camille Bravais befand, den großen St. Bernhard, wo die Mönche die meteorologischen Instrumente fünfmal am Tage beobachten, die Genfer Sternwarte, Chougny bei Genf, wo der ehrwürdige Astronom Gautier wohnte, Aosta, wo der Kanonikus Carrel ununterbrochen eine Reihe meteorologischer Beobachtungen fortsetzte, endlich die Observatorien von Lyon, Mailand und Marseille. Eine andere unerläßliche Bedingung, um zu einem guten Resultate zu gelangen, besteht in der unmittelbaren Vergleichung des Bergthermometers mit allen korrespondirenden Barometern. Wir hatten diese Vorsicht gebraucht und konnten den oft beträchtlichen Unterschieden, welche auch die besten Instrumente unter sich darbieten, Rechnung tragen. Herr Delcros, einer der ausgezeichnetsten Offiziere des ehemaligen Kartographenkorps, hatte die Güte, die erforderlichen Berechnungen anzustellen, deren Endresultat für den Gipfel des Montblanc eine Höhe von 4810,0 M. über dem Mittelländischen Meere ergiebt.*) Die aus unsern vier barometrischen Beobachtungen abgeleitete Ziffer wich demnach nur um 0,4 M. von dem mittlern Resultat der Geodäsie ab. Die meteorologischen Umstände sowie die gewählten Stunden waren sehr günstig gewesen, um eine gute Höhe zu erhalten. Herr Plantamour, Direktor der Genfer Sternwarte, hat nämlich, nachdem er die Höhe des Hospiz auf dem St. Bernhard über dem Genfer See durch zwei direkte, vom See ausgehende und

*) Delcros, sur les hauteurs du Mont-Blanc et du Mont-Rose. (Annuaire météorologique de la France. 1851. t. III. p. 215.)

Digitized by Google

auf der Schwelle des Kloſters auslaufende Nivellements beſtimmt hatte, dieſelben nachmals durch achtzehnjährige barometriſche Beobachtungen, welche mit denen der Genfer Sternwarte korreſpondirten, errechnet. Das Reſultat dieſer ungeheuern Arbeit iſt, daß die korreſpondirenden, zwiſchen zwei und vier Uhr Nachmittags aufgenommenen barometriſchen Beobachtungen im Auguſt und September nur einen wahrſcheinlichen Fehler von $\frac{1}{1256}$ der Höhe, rund 1 Meter auf etwa 1300 Meter, ergeben. Noch zahlreichere barometriſche Beobachtungen, als die von uns auf dem Gipfel des Montblanc angeſtellten, müſſen noch mehr Vertrauen einflößen. Vom 15. Juli bis zum 7. Auguſt 1841 ſtellten Bravais und ich auf dem Faulhorngipfel hundertzweiundfünfzig[1], Tag und Nacht von drei zu drei Stunden fortgeſetzte barometriſche Beobachtungen an. Das Mittel dieſer Beobachtungen ergiebt 2682 Meter für die Höhe dieſes Berges; die Ziffer der Geodäſie iſt 2683 Meter; ſo kommt alſo auch in dieſem Falle das Barometer an Genauigkeit dem Theodolit gleich, und zahlreiche barometriſche Beobachtungen wiegen die Wiederholung der auf dem Meßring des geodätiſchen Inſtruments gemeſſenen Winkel auf.

Die Höhe des Montblanc ſcheint ſeit der erſten im Jahre 1775 von Schuckburgh angeſtellten Meſſung bis auf die neueſte Zeit nicht merklich geſchwankt zu haben. Dieſe Beſtändigkeit iſt wohl geeignet Wunder zu nehmen, da der Gipfel einzig und allein aus Schnee und Eis gebildet iſt, deſſen Dicke Sauſſure auf etwa 65 Meter ſchätzte. Offenbar ſcheint der Montblanc eine ſeiner Nachbarin, der Aiguille du Midi, ähnliche Pyramide zu ſein. Die Rochers Rouges, die Petits Mulets, die Tourette ſind noch vorſpringende Punkte dieſer Pyramide, der Reſt iſt beſtändig mit einer Schneehaube bedeckt, die der Höhe des Berges wegen nicht mehr ſchmilzt, auf deſſen Gipfel

Digitized by Google

die Temperatur der Luft ſelten auf Null und faſt beſtändig bedeutend unter Null ſteht. Man fragt ſich alſo, wie es kommt, daß die Dicke dieſer Schneehaube unveränderlich iſt und daß die Höhe des Berges nicht nach den Jahreszeiten, ja nicht einmal nach den Jahren wechſelt. Es ſchwanken nämlich die Menge des Schnees, welche fällt, die Winde, welche ihn wegfegen, die Verdunſtung, welche die Dicke deſſelben vermindert, die Verdichtung der Wolken, welche ihn vermehrt, von Jahr zu Jahr; auch iſt die Form des Gipfels nie dieſelbe. Man vergleiche die Beſchreibungen von Sauſſure, Cliffold, Marckham-Sherwill, Henri de Tilly, welche nach einander in den Jahren 1787, 1822, 1825, 1834 und 1844 gegeben wurden, mit der von Bravais, und man wird ſehen, daß jeder dieſer Reiſenden eine verſchiedene Form vorgefunden hat, den Grundzug eines von Oſt nach Weſt gerichteten oben ſpitz zulaufenden Kammes ausgenommen. Wie könnte es auch anders ſein? Aus allen Strichen der Windroſe herbeigeführt, fällt der Schnee auf den Montblanc; kaum gefallen, wird er weggefegt, verſetzt, verführt, dermaßen, daß die Oberfläche dieſes Schnees der eines beackerten Feldes gleicht. Selbſt beim ſchönſten Wetter, wenn die vollkommenſte Ruhe in den Ebenen herrſcht, ſcheint ein leichter Rauch dem Gipfel zu entſteigen, der durch einen heftigen Wind in horizontaler Richtung weggeblaſen wird; es iſt, wie die Savoyarden ſich ausdrücken, der Montblanc, *der ſeine Pfeife raucht*, und ein Vorzeichen ſchönen Wetters, wenn der Rauch nach der Südſeite gezogen wird. Trotzdem wiegen ſich ſchließlich alle dieſe verſchiedenen Urſachen der Ab- und Zunahme auf, und die Höhe des Gipfels bleibt dieſelbe. Die Natur geht niemals anders zu Werke; nichts iſt abſolut beſtändig, Alles ſchwankt, das Atom wie der Ozean. Dieſes Schwanken um einen Mittel-

Digitized by Google

zustand herum ist Lebensbeständigkeit, Stillstand ist Tod, und die Grundkräfte der Natur, welche die unorganische wie die organische Welt beherrschen, ruhen nie.

Die Operationen, deren hauptsächlichste Resultate ich soeben aufgezählt habe, waren kaum beendet, als die Sonne sich den Linien des Jura in der Richtung von Genf näherte; es war sechs und ein viertel Uhr; das Thermometer zeigte für die Temperatur der Luft — 11,8°, für die des Schnees an der Oberfläche — 17,6° und bei 2 Dezimeter Tiefe — 14,0°. Die Berührung mit diesem Schnee, selbst durch unserer dicken Fußbekleidungen hindurch, war ein wahres Leiden. Doch wollten wir noch bleiben, um Feuersignale zu machen, welche zugleich von Genf, von Lyon und von Dijon aus sichtbar gewesen wären, wo sich Astronomen befanden, welche von unsern Absichten in Kenntniß gesetzt waren. Diese Signale, gleichzeitig von diesen drei Städten aus gesehen, hätten gestattet, genau ihre Längenunterschiede festzustellen, allein die Kälte war bereits so stark, daß wir fühlten, es würde unmöglich gewesen sein, noch länger zu verweilen, ohne unser Leben und das unserer Führer zu gefährden. Auguste Simond allein wollte bleiben, um die verabredeten Signale zu machen, doch lehnten wir es ab und thaten wohl daran. Seitdem hat die elektrische Telegraphie gestattet, ohne Ortsveränderung und ohne Mühe ein Resultat zu erreichen, welches vielleicht mit dem Leben oder der Gesundheit eines Familienvaters erkauft worden wäre. Der Aufbruch wurde beschlossen, und wir fingen schon an hinabzusteigen, als wir plötzlich vor dem staunenswerthesten Schauspiele, dessen Betrachtung dem Menschen vergönnt ist, inne hielten. Der Schatten des Montblanc, einen ungeheuern Kegel bildend, breitete sich über die weißen Gebirge Piemonts aus; langsam rückte er nach dem Horizont zu, wo wir ihn in die

Digitized by Google

Lüfte über den Becco di Nonna ſich erheben ſahen; nun aber vermiſchten ſich die Schatten der übrigen Berge allmälig immer mehr mit ihm, je tiefer die Sonne vor ihren Gipfeln niederſank, und bildeten ſo ein Gefolge für den Schatten des Herrſchers der Alpen. Durch eine Wirkung der Perſpektive liefen ſie alle nach ihm zuſammen. Dieſe Schatten, gegen ihre Baſis grünlichblau, waren von einer äußerſt lebhaften Purpurtinte eingefaßt, welche in das Roſa des Himmels zerfloß. Es war ein prachtvolles Schauſpiel. Ein Dichter hätte vielleicht geſagt, daß Engel mit Flammenfittichen ſich vor dem Throne eines unſichtbaren Jehova verneigten. Die Schatten waren am Himmel verſchwunden, wir aber ſtanden noch regungslos, doch nicht ſtumm vor Staunen an denſelben Fleck gebannt, denn unſere Bewunderung machte ſich in den mannichfachſten Ausrufungen Luft. Nur die Nordlichter des Nordens von Europa vermögen ein Schauſpiel zu bieten, das ſich an Pracht mit dem unerwarteten Phänomen, das vor uns noch Niemand vom Gipfel des Montblanc beobachtet hatte, vergleichen läßt.

Die Sonne ging unter, man mußte aufbrechen. Wir banden uns Alle an ein und daſſelbe Tau feſt und eilten dem Großen Plateau zu. An den Petits Mulets vorbeikommend, raffte ich zwei Steine auf dem Schnee auf. An den Glastropfen, welche ſie bedeckten, erkannte ich ſpäter, daß es Felstrümmer waren, welche vom Blitz, der ſo oft auf dieſe Höhen niederfährt, herabgeſchleudert waren. Von den Petits Mulets ab hielten wir nicht mehr an, ſondern fuhren wie eine Lawine, ohne uns einen Pfad zu ſuchen, geradeswegs hinab. Jeder ward von ſeinem Vordermanne nachgezogen, und Mugnier, welcher den Vortrab bildete, ſprang über den Abhang hinab, bei jedem Schritt in den Schnee einſinkend, der die Wucht dieſes wandelnden Roſenkranzes hinlänglich mäßigte. Auf dem Grand Plateau ange-

Digitized by Google

kommen, mußten wir einen Augenblick innehalten, um Athem zu ſchöpfen, darauf gelangten wir ſchnellen Schrittes um ſieben und drei viertel Uhr bei unſerm Zelte an. In fünfundfünfzig Minuten waren wir vom Gipfel, 800 Meter über dem Grand Plateau erhaben, hinabgeſtiegen. Als wir unſer Zelt betraten, glaubten wir den häuslichen Herd wiederzuſehen und genoſſen daſelbſt eine wohlverdiente Ruhe. Trotzdem wurden die meteorologiſchen Beobachtungen heroiſch von zwei zu zwei Stunden während der Nacht fortgeſetzt. Um Mitternacht zeigte das Thermometer — 6,9°; die Temperatur des Schnees betrug — 18,5° an der Oberfläche und — 10,4° bei 2 Dezimeter Tiefe. Dieſe Ziffern, beredter als alle Gründe, zeigten uns, daß wir weiſe gehandelt, indem wir unſer Verweilen auf dem Gipfel des Montblanc nicht verlängerten; doch blieben wir noch drei Tage auf dem Grand Plateau, um die Beobachtungen und Experimente anzuſtellen, welche wir auf dem Gipfel zu unterlaſſen gezwungen worden waren. Wir ahmten darin unſerm Meiſter und Vorgänger Sauſſure nach, der nach ſeiner Beſteigung des Montblanc im Jahre 1788 vierzehn Tage auf dem Col du Géant, 3400 Meter über dem Meere, zubrachte. Auf dem Grand Plateau befanden wir uns 530 Meter höher; allein Umſtände, die nicht in unſerer Macht lagen, hinderten uns, eben ſo lange dort zu bleiben.

Während unſeres Aufenthaltes ſtörte nur der Donner der Lawinen die erhabene Stille dieſer Hochregionen. Wir ſahen außer Bienen und Schmetterlingen, welche, durch die aufſteigenden Luftſtrömungen fortgeriſſen, alsbald auf dem Schnee ſtarben, keine Spur eines lebenden Weſens. Am Tage vor unſerer Abreiſe flogen Alpendohlen mit gelbem Schnabel (Corvus pyrrhocorax), ohne Zweifel durch einige Reſte gefrorenen Brotes oder durch Hammel- und Hühnerknochen,

Digitized by Google

welche in der Nähe unseres Zeltes umherlagen, angezogen, um uns herum. Unsere drei Tage wurden gut angewandt, und vielleicht versuche ich später einmal die hauptsächlichsten Resultate darzulegen, welche in den Alpen, während des Aufenthalts auf Höhen über 2000 Meter, von Saussure, Agassiz und Desor, Bravais und mir, den Gebrüdern Schlagintweit und Dollfus-Ausset gewonnen wurden; es ist dies eine lange Analyse, die nicht gut einen bloßen Anhang zu dem Bericht von zwei wissenschaftlichen Besteigungen bilden kann. Die Schwankungen des Barometers und des Thermometers, die relative Feuchtigkeit der Luft zu den verschiedenen Tagesstunden, die Temperaturen des Bodens bei verschiedenen Tiefen, die nächtliche Strahlung der Schneeoberfläche, der Pflanzen und sonstiger Naturkörper, die Messung der Eigenwärme der Sonnenstrahlen, die relative Intensität und die Geschwindigkeit des auf- und absteigenden Schalles, die so verwickelten und belangreichen Phänomene der Gletscher, die Pflanzenwelt und das Thierleben in diesen Hochregionen, endlich die sich am Menschen kundgebenden physiologischen Erscheinungen: das sind die Hauptgegenstände der Untersuchungen, welche diese Forscher beschäftigt haben; sie vervollständigen diejenigen, welche vor ihnen während der Besteigungen der Hochgipfel gemacht worden sind. Die Endresultate dieser Experimente und Beobachtungen bilden eben so viele interessante Kapitel, welche in den Lehrbüchern über Physik, Meteorologie, physische, botanische und zoologische Geographie hinfort ihren Platz einnehmen werden. Mit den in den Polarregionen unternommenen Nachforschungen verglichen, gestatten uns diese Untersuchungen, die nur durch das Sinken der Temperatur hervorgerufenen Erscheinungen von denjenigen zu unterscheiden, welche sich besonders durch eine bedeutende Erhebung über dem Meeresspiegel erklären. Mit einem Wort, sie

Digitized by Google

führen uns zu einer ſtrengen Parallele der Einflüſſe der Breite und der Höhe, und in Folge deſſen zu den verſchiedenartigſten und fruchtbarſten Anwendungen dieſer Angaben auf den Ackerbau, den Geſundheitszuſtand und folglich auf das Wohl derjenigen Völkerſchaften, deren Loos es iſt, in bergigen Ländern zu leben.

Ende des erſten Bandes.

Druck von G. Pätz in Naumburg a. d. S.

Digitized by Google

Im Verlage von **Hermann Costenoble** in **Jena** erschienen ferner folgende neue Werke:

Heuglin, M. Th. von, Reise nach Abessinien, den Gala-Ländern, Ost-Sudan und Chartum in den Jahren 1861 und 1862. Nebst 10 Illustrationen in Farbendruck und Holzschnitt, ausgeführt von J. M. Bernatz, einer lith. Tafel und Originalkarte. Groß-Lex.-8. eleganter Ausstattung. 5 Thlr.

Andree, Dr. Richard, Vom Tweed zur Pentlandföhrde. Reisen in Schottland. Mitteloctav-Format. eleg. broch. 1 Thlr. 22½ Ngr.

Baker, Samuel White, Der Albert-Nyanza, das große Becken des Nil und die Erforschung der Nilquellen. Deutsch von J. E. A. Martin. Autorisirte Ausgabe. Nebst 33 Illustrationen in Holzschnitt, 1 Chromolithographie und 2 Karten. Zwei starke Bände. Eleg. broch. 5½ Thlr.

Berlepsch, A. H., Die Alpen in Natur- und Lebensbildern. Dritte Auflage. **Für den Reisegebrauch redigirt.** Mit 6 Illustrationen in Holzschnitt. 8. eleg. geb. 1 Thlr.

Berlepsch, A. H., Die Alpen in Natur- und Lebensbildern. Mit 16 Illustrationen von E. Rittmeyer. **Pracht-Ausgabe.** Lex.-Oct. Ein starker Band. Eleg. broch. 3 Thlr. 26 Ngr. Eleg. geb. mit vergoldeten Deckenverzierungen 4⅓ Thlr. Mit Goldschnitt 4⅔ Thlr. **Wohlfeile Volks-Ausgabe.** gr. 8. Eleg. geb. 2 Thlr. 5 Ngr.

Gerstäcker, Friedrich, Achtzehn Monate in Süd-Amerika und dessen deutschen Colonien. 6 Thle. in 3 Bänden. 8. broch. 5⅓ Thlr.

Gerstäcker, Friedrich, Nach Amerika! Ein Volksbuch. Illustrirt von Th. Hosemann und Karl Reinhardt. 6 Bde. 8. broch. 6 Thlr. 12 Ngr.

Livingstone, David und Charles, Neue Missionsreisen in Süd-Afrika, unternommen im Auftrage der englischen Regierung. Forschungen am Zambesi und seinen Nebenflüssen, nebst Entdeckung der Seen Schirwa und Nyassa in den Jahren 1858 bis 1864. Autorisirte vollständige Ausgabe für Deutschland. Aus dem Englischen von J. E. A. Martin. Nebst 1 Karte und 40 Illustrationen in Holzschnitt. Zwei Bände. gr. 8. broch. 5¾ Thlr.

Digitized by Google

Kleinſtenber, Hermann, Schach dem König. Hiſtoriſcher Roman. 2 Bde. 8. broch. 3 Thlr.

Libra, Ernſt Freiherr von, Die Schatzgräber. Roman. 3 Bde. 8. broch. 4 Thlr.

Höcker, Guſtav, Geld und Frauen. Erzählungen. 3 Bde. 8. broch. 3½ Thlr.

Möllhauſen, Baldwin, Der Meerkönig. Eine Erzählung. 6 Bde. 8. broch. 6½ Thlr.

Wickede, Jul. von, Eine deutſche Bürgerfamilie. Nach einer Familienchronik bearbeitet. 3 Bde. 8. broch. 4½ Thlr.

Sacher-Maſoch, Leopold von, Der letzte König der Magyaren. Hiſtoriſcher Roman. 3 Bde. 8. broch. 4 Thlr.

Mühlbach, Louiſe, Deutſchland in Sturm und Drang. (Erſte Abtheilung: Der alte Fritz und die neue Zeit.) Hiſtoriſcher Roman. 4 Bde. 8. eleg. broch. 5½ Thlr.

Mühlbach, Louiſe, Deutſchland in Sturm und Drang. (Zweite Abtheilung: Fürſten und Dichter.) Hiſtoriſcher Roman. 4 Bde. 8. broch. 5½ Thlr.

Libra, Ernſt Freiherr von, Erlebtes und Geträumtes. Novellen und Erzählungen. 3 Bde. 8. broch. 3¾ Thlr.

Breuſing, Hermann, Ein Geächteter. Lebensbild. Dritte Abtheilung. 2 Bde. 8. broch. 2½ Thlr.

Robiano, L. Gräfin von, Anna Boleyn. Hiſtoriſcher Roman. Zwei ſtarke Bände. 8. eleg. broch. 3 Thlr.

Ewald, Adolph, Nach fünfzehn Jahren. Ein Strauß Geſchichten. 2 Bde. 8. broch. 3 Thlr.

Deutſche Schützen, Turner- und Liederbrüder oder: Was will das Volk? Zeitgeſchichtlicher Roman vom Verfaſſer der Romane: „Die Ritter der Induſtrie", „Herren vom Kleeblatt" ꝛc. ꝛc. 4 Bde. 8. eleg. broch. 5 Thlr.

Gerſtäcker, Friedrich, Unter den Penchuenchen. Chileniſcher Roman. 3 Bde. 8. broch. 4½ Thlr.

Marr, A. B., Das Ideal und die Gegenwart. 8. eleg. broch. 1½ Thlr.

Mühlbach, Louiſe, Marie Antoinette und ihr Sohn. Hiſtoriſcher Roman. 6 Bde. 8. eleg. broch. 6½ Thlr.

Uechtritz, Friedrich von, Eleazar. Eine Erzählung aus der Zeit des großen jüdiſchen Krieges im erſten Jahrhunderte nach Chriſto. 3 Bde. 8. broch. 4 Thlr.

Druck von G. Pätz in Naumburg a. d. S.

Digitized by Google

Von Spitzbergen zur Sahara.

Zweiter Band.

Digitized by Google

Digitized by Google